



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

~~B.V. 34~~

~~E. 111~~

The Gift of  
**WILLIAM H. BUTTS, Ph.D.**  
A.B. 1878 A.M. 1879  
Teacher of Mathematics  
1898 to 1922  
Assistant Dean, College of Engineering  
1908 to 1922  
Professor Emeritus  
1922

QA

35

.099


1697

~~REV 2~~

**NON  
CIRCULATING**

11 E






DES

COQUE,  
GRAND

plus utiles  
de Guerre,  
Chonner

des  
CORRIGEE



Augustins.

Cours  
O Z A-  
Traitté  
nprimé  
quelque  
la dé-  
acheté;  
pour-  
mplet.

1810  
1811  
1812  
1813  
1814  
1815  
1816  
1817  
1818  
1819  
1820  
1821  
1822  
1823  
1824  
1825  
1826  
1827  
1828  
1829  
1830  
1831  
1832  
1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  
1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

ce  
au  
pay  
tant  
, &  
pen-  
par-  
né en  
alles,  
, &  
confi-  
me  
la-  
ri-  
Par-  
le  
du  
de  
ont  
ges,  
le,  
les  
me

## P R E F A C E.

Comme les Gentils-hommes n'apprennent ordinairement la Geometrie que pour entendre mieux la Fortification , je fais pour cela succeder à la Geometrie l'Art de la Guerre ou des Fortifications, qui a toujours été le plus noble , qui est le métier des Heros , & qui fleurit à present le plus. Il n'y a pas beaucoup de choses curieuses à dire sur l'origine de la Geometrie , mais il y en a beaucoup sur celle des Fortifications & sur leur progres, dont presque tous ceux qui ont écrit de cet Art , ont suffisamment parlé : c'est pourquoy pour ne me pas rendre ennuyeux par une trop longue Preface, je me contenteray de dire quelque chose de la Geometrie.

Je diray donc à l'égard de la Geometrie , qu'il a toujours été si nécessaire de connoître les distances, que les hommes n'ont pû vivre sans les considerer & sans les marquer, soit dans leur memoire, soit par quelque signe extérieur : de sorte que bien qu'on prétende que les Egyptiens ont été les inventeurs de la Geometrie, parce que l'on voit qu'ils ont été les premiers dans la nécessité de conserver les limites , & l'étendue de leurs Terres & Possessions, ou par des figures tracées, ou par des états & des memoires couchez par écrit , à cause que les inondations de leurs Terres par les débordemens du Nil, effaçoient toutes les autres marques ; néanmoins comme l'on avoit eu la même nécessité avant que la partie inondée de l'Egypte fût habitée, parce qu'on n'a pû faire aucune division sans prendre les mesures du tout & de chaque partie, ni bâtir des Maisons & des Villes sans s'appercevoir de leurs figures , & sans les regler par des mesures, il est à presumer que la science des mesures est aussi ancienne que le Monde. C'est sur luy-même que

## P R E F A C E.

que l'homme a pris les mesures de toutes les autres choses, il n'a pas emprunté d'ailleurs les noms de Brasses, de Coudées, de Pieds, & de Pouces, il a d'abord appliqué son pied, sa main, ses bras, & ses doigts aux sujets qu'il vouloit mesurer, & il a pris sur son corps les mesures de toutes les autres choses sans avoir besoin de Livres, ni de Maîtres, & sans charger sa memoire de noms & de figures. Ainsi la necessité qui a contraint les hommes à faire des partages, & à se servir des mesures qu'ils prenoient sur eux-mêmes, les a obligez de chercher les égalitez pour parvenir aux partages, & cette égalité ne se pouvoit connoître qu'en rapportant ou les Pieces divisées, ou les mesures qu'on a dû appliquer & compter, pour proceder avec justesse dans les divisions : ce qui a donné commencement à la Geometrie.

J'ajoute que Vitruve, de qui nous tenons ce qu'il y a de plus beau dans l'Architecture, dit que les Grecs par un excès de délicatesse en matiere de Bâtimens, ne prirent pas seulement les parties du corps humain pour les mesures communes des Plans & des Elevations, mais la beauté même des corps des hommes & des femmes pour mesure de celle de l'Architecture : que par cette délicate invention l'on forma l'Ordre Corintien sur la belle proportion d'une femme parfaitement bien taillée, l'Ordre Ionique sur celle d'un homme bien fait, & bien proportionné, & l'Ordre Dorique sur celle d'un homme de travail, fort & robuste. Enfin l'homme s'est idolâtré jusques-là qu'il s'est crû le plus parfait des Etres créés, & s'est fait le modele & la mesure de tous les autres.

Voilà ce qui regarde l'origine de la Geometrie;

## P R E F A C E.

quant à son utilité l'on peut dire que si les Grecs ont passé pour plus spirituels que les autres Peuples, ce n'est peut-être qu'à cause que par le moyen de cette science ils ont trouvé le chemin le plus court & le plus assuré pour devenir raisonnables & spirituels. Socrate qui a été le plus industrieux de leurs Maîtres, faisoit voir que tous les hommes avoient de l'esprit, en les interrogeant d'une certaine maniere, & en tournant leurs esprits d'un côté plutôt que d'un autre. Nous sçavons d'ailleurs que luy & les autres Grecs ont commencé par la Geometrie, ce qui donne lieu de croire que c'est par cette Science que leurs esprits se sont tant élevez au dessus des autres. Les Grecs d'aujourd'huy sont aussi grossiers que les autres Peuples, sans doute parce qu'ils n'ont plus la même methode d'enseigner leurs enfans. Que si en France l'on s'applique plus à la Geometrie, & de meilleure heure, il y a lieu d'esperer que les esprits prendront un plus grand vol, & qu'ils se perfectionneront davantage. La France doit déjà à cette Methode l'honneur qu'elle a d'avoir donné à tout le Nord, & à une grande partie de l'Europe, une nouvelle Philosophie, dont Monsieur Descartes est l'inventeur.

Quand la Geometrie n'auroit pas cet avantage, & qu'elle laisseroit toujours les esprits dans la poussiere, on ne laisseroit pas d'en avoir besoin en toutes sortes de professions, elle est même plus necessaire aux hommes qui se contentent d'un état mediocre, qu'à ceux qui ont l'ambition de s'élever. On ne peut vivre dans l'état le plus commun, qu'on ne mette en usage des mesures de toutes les façons, c'est l'ame de tous les métiers. Tous les Arts qui s'occupent à nourrir & à vêtir  
les

## P R E F A C E

les hommes, ne subsistent que par les mesures des Longueurs, des Largeurs, des Cercles, & des Quarrez. Ceux qui s'occupent à faire commerce de provisions, doivent connoître les mesures des choses sèches & des liquides, & de leurs reductions. Les Laboureurs sçavent l'Arpentage par nécessité, ou par usage, les Vignerons le Jaugeage, les Maçons les alignemens, & les mesures des Angles & des Quarrez, & même le Toisé. Ceux qui travaillent sur le bois; sur le fer, & sur les pierres, ne peuvent ignorer ces mesures. Mais sur tous les autres, ceux qui s'appliquent aux Arts liberaux, ne doivent jamais être sans Regle & sans Compas, à moins que d'abandonner leurs desseins, & de passer pour aussi mal-habiles que ceux qui composeroient des discours sans raisonnement. Les mesures sont pour ainsi dire, la raison de tous les Arts & de tous leurs Ouvrages: ôter la Geometrie à tous les Arts, soit liberaux, soit mécaniques, c'est en ôter l'esprit & la raison, c'est les détruire.

Quand il seroit libre à chacun des hommes en particulier de mépriser les Arts & la Geometrie, il ne le seroit pas aux Princes, & à ceux qui ont intérêt de maintenir les Societez & les Etats. Si les hommes n'étoient attaquez que par la faim, la soif, le froid, le chaud, les vents, les pluyes, ou par les Bêtes, ils pourroient vivre en Cyniques, & choisir une vie semblable à celle des bêtes, mangeant des fruits, buvant de l'eau, se chauffant au Soleil: & ils ne chercheroient que des antres pour se mettre à couvert contre les incommoditez de l'air, ou contre l'insulte des Bêtes. Mais quand ils se font la guerre les uns aux autres, pour conserver leurs biens, leur liberté, &



## P R E F A C E.

leur vie , il faut de nécessité quitter cette vie sauvage & paresseuse , il faut se faire des armes , se fortifier de la compagnie des autres hommes , & s'associer pour éviter le commun peril , il faut opposer la force à la force , & l'artifice à l'artifice. C'est ce qui a fait bâtir des Villes , & les fortifier , afin de résister aux Etrangers qui voudroient attentat sur nôtre liberté & sur nôtre vie.

L'Art de la Fortification est donc le premier où l'on ait employé la Géometrie , & il est à présent dans un tel degré de perfection , qu'il n'y a pas apparence qu'on y puisse ajouter rien d'essentiel , parce qu'il semble impossible de trouver pour attaquer les Places autre chose que ce qu'on a inventé. On a employé la Terre pour les Tranchées , pour les Diguees , & pour les Retranchemens : l'Eau pour les Ecluses , & pour les Inondations : & le Feu en tant de manieres , qu'on le fait passer par dessous avec les Mines & les Fourneaux , par dessus avec les Grenades , les Bombes , & les Carcasses , & directement avec les Canons , & les autres piéces d'Artillerie. On a trouvé des manieres de se défendre contre tout cela ; il n'y a qu'à les perfectionner , & à moins qu'on ne trouve d'autres Elements , il n'y a gueres d'apparence qu'on puisse inventer d'autres attaques , ni d'autres defences.

Je sçay bien que ce n'est que depuis peu qu'on a fait des Fortifications bien regulieres , & que par conséquent la Géometrie n'étoit pas si nécessaire aux anciens Ingenieurs qu'à ceux d'apresent , qui employent la Géometrie avec un soin extraordinaire , pour atteindre à la perfection de  
l'Art

que  
nsa  
Art  
ça  
um

que  
nsa  
Art  
ça  
um





... la

# TIE.

## PREMIERE I.

... autant de  
... lignes droites  
23  
... de parties  
... tirées d'un  
24  
... parties éga-  
... angles du  
25  
... parties éga-  
... deux côtés,  
& par

## DES TITRES.

- & par une troisième ligne tirée de l'angle des deux mêmes côtez.* 26
- PROBL. V. *Diviser un Triangle donné en trois parties égales par deux lignes droites, dont l'une soit parallèle, & l'autre perpendiculaire à un même côté.* 27
- PROBL. VI. *Diviser un Triangle donné en trois parties égales par trois lignes droites tirées d'un<sup>e</sup> point donné au dedans du Triangle.* 28
- PROBL. VII. *Diviser un Triangle en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites parallèles à un côté donné.* 28
- PROBL. VIII. *Diviser un Triangle en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites perpendiculaires à un côté donné.* 29
- PROBL. IX. *Retrancher d'un Triangle un Triangle égal à un Triangle donné.* 30
- PROBL. X. *Retrancher d'un Triangle un Triangle égal à un Triangle donné, par une ligne droite parallèle à un côté donné.* 32
- PROBL. XI. *Partager un Triangle isoscèle en quatre parties égales, par deux lignes droites perpendiculaires entre elles.* 33
- PROBL. XII. *Trouver sur le côté donné d'un Triangle un point, duquel ce Triangle se puisse diviser en autant de parties égales qu'on voudra.* 34

## CHAPITRE II.

### De la Division des Quadrilatères.

- P**ROBLEME I. *Diviser un Parallélogramme en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes parallèles à un côté donné.* 35
- PROBL. II. *Diviser un Parallélogramme en quatre par-*

# T A B L E

- parties égales par deux lignes droites parallèles à deux côtés.* 36
- PROBL. III.** Diviser un Parallelogramme en un nombre pair de parties égales tel que l'on voudra, par des lignes droites tirées d'un angle donné. 36
- PROBL. IV.** Diviser un Parallelogramme en trois parties égales, par des lignes droites tirées d'un point donné sur un côté. 37
- PROBL. V.** Diviser un Parallelogramme en quatre parties égales par des lignes droites tirées d'un point au dedans du Parallelogramme. 38
- PROBL. VI.** Diviser un Parallelogramme en deux parties égales, par une ligne droite tirée d'un point donné en dedans. 39
- PROBL. VII.** Diviser un Trapezoïde en autant de parties égales qu'on voudra. 40
- LEMME.** La ligne  $AB$  étant compée en  $C$ , la couper de rechef au point  $D$ , entre  $B$  &  $C$ , en sorte que les trois quarrés  $AC$ ,  $AD$ ,  $AB$ , soient en Proportion Arithmetique. 40
- PROBL. VIII.** Diviser un Trapezoïde isoscèle en quatre parties égales, par deux lignes perpendiculaires entre elles. 41
- PROBL. IX.** Diviser un Trapezoïde en deux parties égales, par une ligne droite tirée de l'un de ses angles. 42
- PROBL. X.** Diviser un Trapezoïde en deux également, par une ligne droite tirée d'un point donné sur sa base. 42
- PROBL. XI.** Diviser un Trapeze en deux également, par une ligne droite tirée d'un angle donné. 42
- LEMME.** Etant donné le Triangle  $ABC$  rectangle en  $A$ , trouver sur le côté  $AB$  prolongé le point  $D$ , auquel tirant à l'autre côté  $AC$ , la parallele  $DE$  terminée en  $E$  par l'hypoténuse  $BC$  prolongée, le Trapeze  $ACED$  43

## DES TITRES.

*ACED* soit égal au quarré de la ligne donnée  
AF. 44

PROBL. XII. Diviser un Trapeze qui a deux angles égaux, en deux également par une ligne perpendiculaire au côté d'entre les deux angles égaux. 45

PROBL. XIII. Diviser un Trapezoïde en deux également, par une ligne droite perpendiculaire aux deux côtes parallèles. 46

PROBL. XIV. Diviser un Trapeze en deux parties égales, par une ligne droite tirée d'un point donné sur un côté. 46

LEMME. Reduire un Trapeze donné en un Trapezoïde. 48

PROBL. XV. Reduire un Trapezoïde en deux parties égales par une ligne droite parallele aux deux côtes parallèles. 50

PROBL. XVI. Diviser un Trapeze en deux également, par une ligne droite parallele à un côté donné. 50

PROBL. XVII. Diviser un Trapeze en trois parties égales, par des lignes droites tirées de deux points donnés sur un côté. 52

PROBL. XVIII. Diviser un Trapezoïde en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes parallèles à l'un des deux côtes qui ne sont pas parallèles. 53

PROBL. XIX. Diviser un Trapeze en deux parties, dont la Raïson soit donnée. 54

PROBL. XX. Retrancher d'un Trapeze donné une figure égale à une figure donnée. 55

# TABLE

## CHAPITRE III.

### De la Division des Polygones.

- L**EMME. *Reduire un Polygone proposé en Triangle.* 55
- PROBL. I.** *Diviser un Polygone donné en trois parties égales, par des lignes droites tirées d'un angle donné.* 56
- PROBL. II.** *Diviser un Polygone donné en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites tirées d'un angle donné.* 57
- PROBL. III.** *Diviser un Polygone donné en deux également par des lignes droites parallèles à ses côtez.* 58
- PROBL. IV.** *Diviser un Polygone donné en deux également, par une ligne droite tirée au milieu de l'un de ses côtez.* 58
- PROBL. V.** *Diviser en deux également un Polygone donné, par une ligne droite parallèle à un côté donné.* 60
- PROBL. VI.** *Diviser un Polygone en deux également, par une ligne droite tirée d'un point donné sur un côté.* 61
- PROBL. VII.** *Diviser un Polygone en trois parties égales, par deux lignes droites tirées de deux points donnez sur un côté.* 63
- PROBL. VIII.** *Diviser un Pentagone regulier en trois parties égales, par autant de lignes droites tirées de son centre.* 63
- PROBL. IX.** *Diviser un Polygone en deux parties, dont la Raison soit donnée, par une ligne droite tirée d'un angle donné.* 64

S E C O N.

# DES TITRES.

## SECONDE PARTIE.

### *De la Longimetrie.*

- P**ROBLEME I. *Mesurer une Ligne horizontale accessible par ses deux extremittez.* 66
- PROBL. II. *Mesurer une Ligne horizontale accessible seulement par l'une de ses deux extremittez.* 67
- PROBL. III. *Mesurer une ligne horizontale inaccessible.* 69
- PROBL. IV. *Mesurer d'en haut une ligne horizontale.* 72
- PROBL. V. *Mesurer d'en haut une ligne inclinée.* 74
- PROBL. VI. *Mesurer d'en bas une ligne parallele & élevée au dessus de l'Horizon.* 75
- PROBL. VII. *Mesurer une hauteur accessible.* 76
- PROBL. VIII. *Mesurer une hauteur inaccessible.* 78
- PROBL. IX. *Mesurer d'une petite hauteur une plus grande, dont la base est visible.* 81
- PROBL. X. *Mesurer d'une grande hauteur une plus petite, dont la base est visible.* 82
- PROBL. XI. *Mesurer la hauteur d'une Tour située sur une Montagne.* 82
- PROBL. XII. *Mesurer une profondeur.* 84
- PROBL. XIII. *Mesurer la hauteur d'une Nuée.* 86



# TABLE

## TROISIEME PARTIE.

### De la Planimetrie.

#### CHAPITRE I.

##### Des Theorèmes.

**T**HEOREME I. *L'Aire d'un Triangle rectiligne est quatrième proportionnelle au Sinus Total, à la Tangente de la moitié de l'un des trois angles, & au Rectangle sous la moitié du contour du Triangle, & l'excès de cette moitié sur le côté opposé au même angle.* 90

**T**HEOR. II. *L'Aire d'un Triangle rectiligne est moyenne proportionnelle entre le Rectangle sous la moitié de son contour & l'excès de cette moitié sur un côté, & le Rectangle sous les deux excès de la même moitié sur chacun des deux autres côtés.* 91

**T**HEOR. III. *L'aire d'un Triangle rectiligne rectangle est égale au Rectangle sous la moitié de son contour & l'excès de cette moitié sur l'hypoténuse: ou bien au Rectangle sous les deux excès de la même moitié sur chacun des deux côtés.* 93

**T**HEOR. IV. *L'aire d'un Trapezoïde est la moitié d'un Rectangle sous la somme des deux côtés parallèles, & la perpendiculaire tirée entre ces deux côtés.* 95

**T**HEOR. V. *L'aire d'un Polygone regulier est la moitié du Rectangle sous son contour, & la perpendiculaire tirée du centre sur un côté.* 96

**T**HEOR. VI. *Si par un point de la circonférence d'une Para-*

## DES TITRES.

*Parabole quarrée, il passe en dedans une ordonnée à un Diametre, & en dehors une ligne droite qui coupe ce Diametre en un point aussi éloigné du sommet que l'ordonnée : cette ligne droite touchera la circonférence de la Parabole en ce point.* 96

**THEOR. VII.** Si par un point de la circonférence d'une Parabole cubique, il passe en dedans une ordonnée à un Diametre, & en dehors une ligne droite qui coupe ce Diametre en un point, dont la distance au sommet soit double de celle de l'ordonnée, cette ligne droite touchera la circonférence de la Parabole au même point.

98

THEOR. VIII. Si de la ligne courbe  $ABCD$ , dont un Diametre est  $AE$ , & la Touchante au sommet  $A$ , est  $AS$ , parallèle à l'ordonnée  $DE$ , l'on forme sur le même Diametre  $AE$ , la courbe  $AIOM$ , dont une ordonnée, comme  $HI$ , soit égale à la partie  $AF$  de la Touchante au sommet  $AS$ , terminée en  $F$  par la touchante correspondante  $BF$ , & pareillement l'ordonnée  $KO$  égale à la partie  $AG$  de la même Touchante au sommet  $AS$ , terminée en  $G$  par la touchante correspondante  $DG$ , & ainsi des autres, & que l'on tire la droite  $AD$ , cette droite  $AD$  retranchera le Segment  $ADCB$  égal à la moitié de l'espace correspondant  $AEMOIA$ .

**THEOR. IX.** *La Parabole quarrée est à un Parallelogramme de même base & de même hauteur, comme 2 est à 3.* 102

THEOR. X. La somme des Quantitez infinies en Progression arithmetique en commençant depuis 0, est égale à la moitié du produit sous la plus grande & le nombre qui exprime la multitude de toutes ces Quantitez.

**THEOR. XI.** La somme des quarréz des quantitez  
infinies en Progreſſion arithmetique, en commençant  
*Tom. III.*                      \*\* depuis

# T A B L E

- depuis 0, est égale au tiers du produit sous le plus grand Carré, & le nombre qui exprime la multitude de toutes ces Quantitez. 104
- THEOR. XII. La somme des Cubes des Quantitez infinies en Progression arithmetique, en commençant depuis 0, est égale au quart du produit sous le plus grand cube, & le nombre qui exprime la multitude de toutes ces Quantitez. 107
- THEOR. XIII. Un Cercle est égal à la moitié du Rectangle sous sa circonference & son Rayon. 110
- THEOR. XIV. Le Diametre d'un Cercle est à sa circonference, environ comme 100 est à 314. 111
- THEOR. XV. L'Aire d'un Cercle est au Carré de son Diametre, environ comme 785 est à 1000. 120
- THEOR. XVI. Une Ellipse est égale à un Cercle, dont le Diametre est moyen proportionnel entre les deux Axes de l'Ellipse. 121
- THEOR. XVII. L'Aire d'une Ellipse est au Rectangle de ses deux Axes, environ comme 785 est à 1000. 122
- THEOR. XVIII. Si l'on coupe un Cylindre droit par un Plan incliné à sa base, la section sera une Ellipse, dont le petit Axe sera égal au Diametre de la base du Cylindre. 123
- THEOR. XIX. L'Espace terminé par la Cycloïde, & par la circonference du Cercle generateur, qui luy sert de base, est triple du même Cercle generateur. 125
- THEOR. XX. La Surface convexe d'un Cylindre droit est égale au Rectangle sous sa hauteur & la circonference de sa base. 127
- THEOR. XXI. La Surface convexe d'un Cylindre droit est au Rectangle sous sa hauteur & le Diametre de sa base, environ comme 314 est à 100. 128
- THEOR. XXII. La Surface convexe d'un Cone droit est

## DES TITRES.

*est égale à la moitié du Rectangle sous le côté du Cone & la circonférence de sa base.* 128

**THEOR. XXIII.** *La Surface convexe d'un Cone droit est au Rectangle sous son côté & le Diametre de sa base, environ comme 157 est à 100.* 129

**THEOR. XXIV.** *La Surface convexe d'un Cone droit tronqué est égale à la moitié du Rectangle sous son côté & la somme des circonférences des deux bases opposées & paralleles.* 130

**THEOR. XXV.** *La Surface convexe d'un Cone droit tronqué est au Rectangle sous son côté & la somme des Diametres de ses deux bases opposées, environ comme 157 est à 100.* 130

**THEOR. XXVI.** *Si l'on décrit un Cercle qui touche les deux côtes égaux d'un Triangle isoscèle, les divise en deux également aux points d'attouchement, la Surface du Cone droit qui a pour côté l'un des deux côtes égaux du Triangle, & pour base un Cercle, dont le Diametre soit égal à la base du même Triangle, est égale au Rectangle sous la hauteur du Triangle & la circonférence du Cercle qui touche les deux côtes.* 131

**THEOR. XXVII.** *Si l'on décrit un Cercle, qui touchant les deux côtes égaux & le plus petit des deux autres côtes paralleles d'un Trapezoïde isoscèle, divise chacun de ces trois côtes en deux également aux points d'attouchement; la Surface du Cone droit tronqué qui a pour côté l'un des deux côtes égaux du Trapezoïde, & pour base un Cercle, dont le Diametre est égal au plus grand des deux côtes paralleles, est égale au Rectangle sous la ligne perpendiculaire tirée entre les deux côtes paralleles, & la circonférence du Cercle qui touche les trois côtes.* 132

**THEOR. XXVIII.** *Si autour d'un Cercle on circonscrit un Polygone regulier d'un nombre pair de cô-*

## T A B L E

tez, & que l'on fasse tourner ce Cercle avec son Polygone autour d'un Diametre qui passe par deux angles oppoz, le Cercle formera par cette circonvolution entiere une Sphere, & le Polygone un corps terminé par plusieurs Surfaces convexes, dont la somme sera égale au Rectanglè sous la circonférence du Cercle, & la ligne droite, ou Axe tiré par les deux angles oppoz du Polygone.

134

THEOR. XXIX. La Surface d'une Sphere est égale au Rectanglè sous son Diametre, & la circonférence du Cercle de ce Diametre.

135

THEOR. XXX. La Surface d'un Segment de Sphere est égale à un Cercle, dont le Rayon est égal à la corde de la moitié de l'arc de ce Segment.

136

THEOR. XXXI. La Surface d'une Zone est égale à celle d'un Cylindre de même hauteur, & ayant pour base le grand Cercle de la Sphere.

138

## C H A P I T R E II.

### Des Problèmes.

PROBLEME I. Mesurer un Triangle. 139

PROBL. II. Mesurer un Parallelogramme. 143

PROBL. III. Mesurer un Trapeze. 146

PROBL. IV. Mesurer un Polygone regulier. 148

PROBL. V. Mesurer un Polygone irregulier. 150

PROBL. VI. Mesurer la circonférence d'un Cercle par son Diametre connu. 151

PROBL. VII. Mesurer le Diametre d'un Cercle par sa circonférence connue. 152

PROBL. VIII. Mesurer l'aire d'un Cercle par son Diametre connu. 152

PROBL.

## DES TITRES.

PROBL. IX. Mesurer l'aire d'un Cercle par sa circonférence connue.	156
PROBL. X. Mesurer le Diametre d'un Cercle par son Arc connu.	157
PROBL. XI. Mesurer la circonférence d'un Cercle par son Arc connue.	160
PROBL. XII. Mesurer un Secteur de Cercle, moindre qu'un Demi-cercle.	160
PROBL. XIII. Mesurer un Secteur de Cercle, plus grand qu'un Demi-cercle.	162
PROBL. XIV. Mesurer un Segment de Cercle, moindre qu'un Demi-cercle.	163
PROBL. XV. Mesurer un Segment de Cercle, plus grand qu'un Demi-cercle.	164
PROBL. XVI. Mesurer un espace terminé par une Cycloïde.	165
PROBL. XVII. Mesurer une Couronne.	166
PROBL. XVIII. Mesurer une Ellipse.	166
PROBL. XIX. Mesurer une Hyperbole.	167
PROBL. XX. Mesurer une Parabole quarrée.	169
PROBL. XXI. Mesurer la Surface convexe d'un Cylindre droit.	171
PROBL. XXII. Mesurer la Surface convexe d'un Cone droit.	171
PROBL. XXIII. Mesurer la Surface d'un Cone droit tronqué.	172
PROBL. XXIV. Mesurer la Surface d'une Sphere.	173
PROBL. XXV. Mesurer la Surface d'une Portion de Sphere.	174
PROBL. XXVI. Mesurer la Surface d'une Zone.	175
PROBL. XXVII. Mesurer la Surface d'un Sphéroïde.	176
PROBL. XXVIII. Mesurer un espace terminé par une Ligne spirale.	177

# TABLE

## QUATRIÈME PARTIE.

### *De la Stereometrie.*

## CHAPITRE I.

### Des Theorèmes.

**T**HEOREME I. *La solidité d'une Sphere est le tiers de celle d'un Prisme qui a pour base un Plan égal à la Surface de la Sphere, & dont la hauteur est égale au Rayon de la même Sphere.* 180

THEOR. II. *La solidité d'une Sphere est à celle du Cube de son Diametre, environ comme 157 est à 300.* 181

THEOR. III. *Si un Plan coupe une Sphere en deux parties inégales, l'une de ces deux Portions sera égale à un Cone, dont la base est la même que celle de la Portion, & dont la hauteur est composée de celle de la même Portion, & d'une ligne qui est quatrième proportionnelle à trois autres, dont la première est le Rayon de la Sphere, la deuxième est la hauteur de la même Portion, & la troisième est la hauteur de l'autre Portion.* 182

THEOR. IV. *Un Sphéroïde est à une Sphere, dont le Diametre est égal à l'Axe de circonvolution, comme le Quarré de l'autre Axe, au Quarré du même Axe de circonvolution.* 183

THEOR. V. *Un Sphéroïde est au Solide sous l'Axe de circonvolution & le Quarré de l'autre Axe, environ comme 157 est à 300.* 184

THEOR. VI. *Un Segment de Sphéroïde, dont la hauteur*

## DES TITRES.

- teur est une partie de l'Axe de circonvolution, est au Segment de Sphere correspondans, comme le Cone inscrit dans le Segment de Spheroïde, est au Cone inscrit dans le Segment de Sphere. 184
- THEOR. VII. Un Conoïde Parabolique est égal à la moitié d'un Cylindre de même base & de même hauteur. 186
- THEOR. VIII. Un Conoïde Hyperbolique produit par la circonvolution d'une Hyperbole autour de son Axe, est égal à l'excès d'un Cone tronqué ayant pour base celle du Cone Asymptotique, & pour hauteur celle du Conoïde, sur le Cylindre inscrit dans le Cone Asymptotique, & de même hauteur que le Conoïde. 187

## CHAPITRE II.

### Des Problèmes.

- P**ROBLEME I. Mesurer un Prisme. 188
- PROBL. II. Mesurer une Pyramide. 191
- PROBL. III. Mesurer une Pyramide tronquée. 192
- PROBL. IV. Mesurer un Cone tronqué. 194
- PROBL. V. Mesurer un Corps taludé. 195
- PROBL. VI. Mesurer une Sphere par son Diametre connu. 202
- PROBL. VII. Mesurer une Sphere par sa circonférence connue. 202
- PROBL. VIII. Mesurer un Secteur de Sphere. 203
- PROBL. IX. Mesurer un Segment de Sphere. 203
- PROBL. X. Mesurer un Spheroïde. 204
- PROBL. XI. Mesurer un Segment de Spheroïde. 205
- PROBL. XII. Mesurer un Conoïde Parabolique. 205
- PROBL. XIII. Mesurer un Conoïde Hyperbolique. 206
- PROBL.**




## TABLE DES TITRES.

PROBL. XIV. <i>Mesurer un Orbe.</i>	207
PROBL. XV. <i>Mesurer les cinq Corps reguliers.</i>	207
PROBL. XVI. <i>Mesurer un Corps irregulier.</i>	210
PROBL. XVII. <i>Mesurer un Corps vide.</i>	211
PROBL. XVIII. <i>Mesurer un Tonneau.</i>	212

Fin de la Table des Titres.

TRAITE



DEFINITIONS.

I.

Plan-  
che 1.  
n. Fig.


Le Corps, ou Solide, est une quantité qui a de l'étendue en longueur, en largeur, & en profondeur, comme ABCDEFG, qui a la figure d'un Dé à jouer, dont la Longueur est AB, ou FG, ou DE, la Largeur qui se conçoit plus petite que la Longueur est BC, ou DG, ou EF, & la Hauteur, ou Profondeur, ou Epaisseur, est AF, ou BG, ou CD. Il a aussi un Dessus, comme DEFG, & un Dessous, comme ABC, qu'on appelle Base, à l'égard de sa Hauteur BG, qui lui doit être perpendiculaire pour être la véritable hauteur. Il a encore un Devant, comme ABGF, & un Derrière, comme CDE. Enfin il a des côtes, comme BCDG, AFE. Mais en termes de Geometrie, on appelle Côtes d'une Figure, les lignes qui la bornent, comme la longueur, la largeur, & la profondeur : & Figure en general, ce qui renferme un espace, & qui est borné de tous côtes, d'où il est aisé de conclure qu'un Angle n'est pas une Figure.


II.

La Surface, ou Superficie, est l'extrémité d'un Corps, laquelle a deux dimensions, sçavoir une Longueur & une Largeur, sans y considerer aucune Epaisseur, ou Profondeur : comme DEFG, dont la Longueur est DE, & la Largeur est EF, que l'on conçoit toujours plus petite que la Longueur. Il est évident qu'un Corps est composé d'une infinité de Surfaces, & que plusieurs Surfaces étant mises l'une sur l'autre ne sçauroient produire qu'une Surface. Ainsi afin qu'une Surface puisse produire un Corps, il la faut faire mouvoir par pensée d'un lieu à un autre.

III.

La Ligne est l'extrémité d'un Corps, ou d'une Surface, qui a une seule dimension, sçavoir une Longueur, sans y considerer aucune largeur, ni aucune profondeur : comme EF, ou FG. Il est évident qu'un Corps & une Surface sont composés d'une infinité de Lignes, & que plusieurs Lignes étant ajustées l'une contre l'autre, ne sçauroient produire qu'une Ligne. Ainsi afin qu'une Ligne puisse produire une Surface, il la faut faire mouvoir d'un lieu à un autre : & comme ce mouvement ne se peut faire que par une Ligne, cela fait dire que deux Lignes étant multipliées ensemble produisent une surface, dont ces Lignes représentent les deux dimen-





## D E F I N I T I O N É .

dimensions: & comme aussi la Surface ne peut se mouvoir Fig. 1.  
que par une Ligne, cela fait aussi dire que le Produit de che 1.  
trois Lignes est un Solide, dont ces Lignes sont les trois 1. Fig.  
dimensions.

### I V .

Le *Point* est l'extrémité d'un Corps, ou d'une Surface, ou bien d'une Ligne, que l'on conçoit comme indivisible, ou sans dimension, c'est à dire auquel on n'attribue aucune Longueur, aucune Largeur, ni aucune Profondeur, n'ayant par conséquent aucunes parties: comme A, ou B. Il est évident que la Ligne, aussi-bien que la Surface, & le Solide, est composée d'une infinité de Points, & que plusieurs Points étant placez les uns contre les autres, ne sauraient produire qu'un Point. Ainsi afin qu'un Point puisse produire une Ligne, il le faut faire mouvoir d'un lieu à un autre.

Quoique les points ne puissent pas subsister séparément des Lignes, ou des Surfaces, ou des Corps, ni les Lignes des Surfaces, ou des Solides, ni les Surfaces des Solides: Néanmoins les Mathématiciens les séparent par pensée, lorsqu'ils cherchent les mesures des Lignes, ou des Surfaces, en considérant une Ligne comme réellement distinguée de la Surface, comme quand on mesure la longueur d'un chemin, sans en considérer la largeur: & la surface comme effectivement séparée du Corps, comme quand on mesure la superficie d'une muraille sans considérer la solidité.

### V .

La *Ligne droite* est celle, dont tous les Points sont placez également, comme AB. Quand on dit simplement *Ligne*, cela se doit entendre de la Ligne droite. Il est évident qu'il n'y a point de Lignes droites de différentes especes.

### V I .

La *Ligne courbe* est celle, dont tous les Points ne sont pas également placez, comme ABC. Il est évident qu'il y a une infinité de Lignes courbes de diverse espee, & de different genre: & comme il seroit trop long, & même inutile, d'en faire le dénombrement, nous parlerons seulement dans la suite de celles qui peuvent convenir à notre sujet. 1. Fig.

### V I I .

La *Touchante d'une ligne courbe*, est une Ligne qui rencontre la courbe en un seul point sans la couper, c'est à dire

# TRAITE DE GEOMETRIE.

Plan- sans entrer au dedans: comme EF, qui rencontre la courbe  
che 1. ABC au seul point G, sans entrer en dedans.  
2. Fig.

## V I I I.

Les Lignes paralleles sont celles qui étant prolongées comme l'on voudra, sont toujours également éloignées entre elles: comme AC, GH.

## I X.

3. Fig. Les Lignes perpendiculaires sont celles qui se coupent de telle maniere, que l'une à l'égard de l'autre ne panche pas plus d'un côté que d'autre. Ainsi on connoît que la ligne AB est perpendiculaire à la ligne CD, & que reciproquement la ligne CD est perpendiculaire à la ligne AB, parce que la ligne AB à l'égard de la ligne CD ne panche pas plus vers C que vers D, & que pareillement la ligne CD à l'égard de la ligne AB, ne panche pas plus vers A que vers B.

## X.

2. Fig. Le Diametre d'une Ligne courbe, est une ligne droite tirée au dedans de cette courbe, qui divise en deux également toutes les lignes droites paralleles tirées au dedans de la même ligne courbe. Ainsi on connoît que la ligne BD est le Diametre de la courbe ABC, parce qu'elle divise en deux également aux points D, I, les deux paralleles AC, GH, qu'on appelle Ordonnées au Diametre BD, lequel on appelle Axe, quand il est perpendiculaire à ses Ordonnées.

## X I.

Le Sommet d'une Ligne courbe est le point où cette Ligne courbe se trouve coupée par son Diametre, comme B. Il est évident que comme une Ligne courbe peut avoir une infinité de Diametres differens, elle peut aussi avoir une infinité de sommets differens, parce qu'on y peut tirer en diverses manieres plusieurs lignes droites paralleles entre elles, & faire passer par leurs points de milieu autant de Diametres differens.

## X I I.

La Perpendiculaire d'une Ligne courbe est celle qui passant par le point d'atouchement est perpendiculaire à la Touchante: comme GK, que je suppose perpendiculaire à la Touchante, EF, qui touche la courbe ABC au point G.

## X I I I.

XIII.

Plan-  
che 1.  
2. Fig.

L'Angle est un espace indéfini causé par l'inclinaison de deux lignes qui se coupent, lequel on appelle *Angle rectiligne*, quand ses deux lignes sont droites, comme IKG: *Angle mixtiligne*, quand l'une de ses deux lignes est droite, & l'autre est courbe; comme IGB: & *Angle curviligne*, quand les deux lignes qui le forment, sont courbes, comme LGC, qu'on nomme *Angle Spherique*, quand ses deux lignes sont sur une Superficie Spherique, & tout Angle, dont les deux lignes sont sur un Plan, s'appelle *Angle plan*.

L'Angle Plan Mixtiligne & le Curviligne se réduisent à un Rectiligne, par des lignes droites, qui touchent les lignes courbes de l'Angle au point où elles se coupent, qu'on appelle *Pointe de l'Angle*, ou *Sommet de l'Angle*. Ainsi l'Angle Mixtiligne KGL se réduit au Rectiligne KGM, en supposant que la droite GM touche la courbe GL au point G: & l'Angle Curviligne LGC se réduit au Rectiligne MGF, en supposant que les deux lignes courbes GL, GC, soient touchées au point G, par les droites GM, GF.

XIV.

L'Angle droit est celui, dont les deux lignes sont perpendiculaires entre elles: comme KGE, ou KGF, en supposant que la ligne KG soit perpendiculaire à la ligne EF. D'où il est aisé de conclure par la définition des lignes perpendiculaires, que tous les angles droits sont égaux entre eux, ce qui fait dire que quand deux lignes sont perpendiculaires entre elles, elles se coupent à *Angles droits*, comme AB, CD, 3. Fig. qui se coupant au point E, y forment quatre Angles droits, qui sont égaux entre eux.

XV.

L'Angle oblique est celui qui se fait par la rencontre de deux Lignes obliques, c'est à dire de deux lignes qui ne sont pas perpendiculaires entre elles, ou qui se coupent à angles inégaux. Ou bien c'est celui qui est plus grand, ou plus petit qu'un droit: & alors on l'appelle *Angle aigu*, quand il est plus petit qu'un droit, comme IGE, qui est plus petit que le droit KGE: & *Angle obtus*, quand il est plus grand qu'un droit, comme IGF, qui est plus grand que le droit KGF.

XVI.



XVI.

La *Bafe d'une Ligne courbe* est la dernière des Ordonnées, qui en termine le Diamètre & la courbe. Ainsi on connoît que la bafe de la courbe ABC est la droite AC, qui termine le Diamètre BD, lequel est icy perpendiculaire à la Bafe AC, & alors cette perpendiculaire ou Axe BD, se nomme *Hauteur de la courbe ABC*, par rapport à la bafe AC.

XVII.

La *Surface Plane*, qu'on nomme simplement *Plan*, est celle dont toutes les lignes sont droites, de quelque manière qu'on les tire, quoy qu'on y puisse tirer des lignes courbes, mais toutes ces lignes courbes seront également placées, c'est à dire que l'une ne s'abaîssera & ne s'élèvera point plus que l'autre. Telle est le Plan ABGF, ou BCDG, ou DEFG.

XVIII.

La *Surface courbe*, est celle dont toutes les lignes sont courbes, étant impossible qu'il y ait aucune ligne droite, les unes étant plus élevées, ou plus abaîssées que les autres: comme la Surface d'une Sphere, qu'on appelle *Superficie Spherique*, laquelle étant considérée par le dehors, se nomme *Surface convexe*, & étant considérée par le dedans est appelée *Surface concave*.

XIX.

Le *Cercle* est une Surface plane bordée par une seule ligne courbe, qu'on appelle *Circonférence du Cercle*, au dedans de laquelle il y a un point appelé *Centre du Cercle*, duquel toutes lignes droites tirées jusqu'à la circonférence, lesquelles on appelle *Rayons du Cercle*, sont égales entre elles. Ainsi on connoîtra que ABCD est la circonférence d'un Cercle, dont le centre est O, & les Rayons, ou *Demi-diamètres* sont les lignes droites égales OA, OB, OC, &c.

XX.

Le *Diamètre d'un Cercle* est une ligne droite tirée comme l'on voudra par le centre du Cercle, & terminée de part & d'autre par la circonférence du même Cercle: comme AC, qui divise le Cercle & sa circonférence en deux parties égales, qu'on appelle indifféremment *Demi-cercle*, dont la moitié se nomme par consequent *Quart de Cercle*.

XXI.

# DEFINITIONS.

## XXI.

Plan-  
che 1.  
4. Fig.

L'*Arc de cercle* est une partie de la circonférence du cercle, plus petite, ou plus grande qu'un Demi-cercle, ou que la moitié de la circonférence: comme l'arc AB, qui est plus petit que la Demi-circonférence ABC, ou bien l'arc ADCB, qui est plus grand que la Demi-circonférence ADC.

Les Mathématiciens ont divisé la circonférence du cercle en 360 parties égales, ou petits arcs égaux, qu'ils ont appellez *Degrez*: & chaque Degré en 60 autres parties égales plus petites, qu'on appelle *Minutes*: dont chacune a été divisée en 60 parties égales appellees *Secondes*, & ainsi ensuite, cela ayant été fait principalement pour déterminer la quantité d'un angle rectiligne, ou sphérique: car

## XXII.

La *Mesure d'un Angle* est un Arc de cercle décrit à volonté de sa Pointe, & terminé par ses deux lignes. Ainsi on connoît que la mesure de l'angle rectiligne AOB est l'arc de cercle AB, de sorte qu'autant de Degrez & de Minutes que contiendra cet Arc AB, aussi d'autant de Degrez & de Minutes sera l'angle AOB, qu'il mesure.

## XXIII.

Le *Secteur de cercle* est la partie d'un cercle terminée par deux Rayons, & par une partie de la circonférence, moindre ou plus grande que la moitié de la même circonférence, qu'on appelle *Base du Secteur*: comme le Secteur BOCE, dont la Base est l'arc BEC: ou le Secteur BOGDA, dont la base est l'arc BADC.

## XXIV.

Le *Segment de cercle* est une partie du cercle terminée par un Arc de cercle moindre ou plus grand que la moitié de la circonférence du cercle, de laquelle il est une partie, & par une ligne droite, qui joint les extremitéz de cet arc, & qu'on appelle *Corde*: comme le Segment BCE, qui est moindre que le Demi-cercle ACE, ou le Segment BCDA, qui est plus grand que le Demi-cercle ACD.

## XXV.

Le *Rectiligne* est une Surface plane terminée par des lignes droites

Plan-  
che 1.  
5. Fig.

## TRAITS DE GEOMETRIE.

droites appellées *côtés*, qu'on nomme *Triangle*, quand il est borné par trois lignes droites: *Quadrilatere*, ou *Quadrangle*, quand il est borné par quatre lignes droites: & enfin *Polygone*, quand il est terminé par plus de quatre lignes droites.

### XXVI.

Le *Triangle* est donc un Plan terminé par trois lignes droites, comme ABC, qu'on nomme *Triangle Equilateral*, quand ses trois *côtés* sont égaux: *Triangle Isocele*, quand il a seulement deux *côtés* égaux: & *Triangle Scaléne*, quand tous ses *côtés* sont inégaux. Mais quand il a un angle droit, on le nomme *Triangle Rectangle*: & quand tous ses angles sont aigus, on l'appelle *Triangle Oxygone*: & enfin quand il a un angle obtus, il est appelé *Triangle Amblygone*.

### XXVII.

La *Base* d'un *Triangle* est le *côté* sur lequel on luy a tiré de son angle opposé une perpendiculaire, qu'on appelle *Hauteur* du *Triangle* par rapport à sa *Base*. Ainsi on connoît que la *Base* du *Triangle* ABC est le *côté* AB, à l'égard de sa *Hauteur* ou perpendiculaire CD, qui divise la *Base* AB en deux parties AD, BD, qu'on appelle *Segmens* de la *Base*, quand même la perpendiculaire CD tomberoit en dehors, ce qui arrivera lorsque l'un des deux angles à la *Base* AB, sera obtus.

On appelle aussi *Base* le plus grand *côté* d'un *Triangle* rectangle, sçavoir celui qui est opposé à l'angle droit: mais ce *côté* est appelé plus ordinairement *Hypotenuse*, & nous nous servirons toujours de ce terme dans la suite; comme nous avons déjà fait dans les deux *Traitez* precedens.

### XXVIII.

5. Fig. Le *Quadrilatere* est donc aussi un Plan terminé par quatre lignes droites, qu'on appelle *Tetragone*, & plus ordinairement *Quarré*, quand il a tous ses *côtés* égaux, & ses quatre angles droits, comme ABCD: *Quarré long*, & *Barlong*, quand il a tous ses angles droits, mais non pas tous ses *côtés* égaux, comme EFGH: *Rhombe*, & *Loxange*, en termes de *Blason*, quand il a tous ses *côtés* égaux, & ses angles obliques, comme IKLM: *Rhomboidé*, quand il a ses angles obliques, & les deux *côtés* opposés seulement égaux, comme NOPQ: & *Trapeze*, quand il n'a pas les deux *côtés* opposés égaux, comme ABCD, que nous appellerons *Trapezoidé*, quand il aura deux

7. Fig.

# DEFINITIONS.

deux côtez oppozez paralleles entre eux, comm EFGH, dont les deux côtez oppozez EF, GH, sont parallele

Planf.  
che 11  
7. Fig.

## XXIX.

Le *Parallelogramme* est une Figure de quatre côtez, dont les deux oppozez sont paralleles entre eux : comme le *Quarré*, le *Quarré-long*, le *Rhombe*, & le *Rhombôide*. Quand les angles d'un *Parallelogramme* sont droitz, on l'appelle *Parallelogramme rectangle*, ou simplement *Rectangle* : comme le *Quarré* ABCD, & le *Quarré-long* EFGH, où les quatre angles sont droitz.

## XXX.

La *Base* d'un *Parallelogramme* est le côté sur lequel on luy a tiré de l'un de ses deux Angles oppozez une perpendiculaire, qu'on appelle *Hauteur du Parallelogramme* par rapport à sa Base. Ainsi on connoît que la Base du *Parallelogramme* NOPQ, est le côté NO, à l'égard de sa Hauteur ou perpendiculaire PR, qui tombe icy en dehors, & elle auroit tombé en dedans, si on l'avoit tiré de l'angle Q.

## XXXI.

Le *Polygone* est donc une Figure de plus de quatre côtez, 8. Fig. comme ABCDE, qu'on appelle *Pentagone*, quand il a cinq côtez, *Exagone* quand il a six côtez, *Eptagone* quand il a sept côtez, *Octogone* quand il a huit côtez, *Enneagone* quand il a neuf côtez, *Decagone* quand il a dix côtez, *Endecagone* quand il a onze côtez, & *Dodecagone* quand il a douze côtez.

## XXXII.

Quand tous les angles d'un *Polygone* sont égaux, on le nomme *Polygone regulier* : comme l'*Exagone* FGHKL, dont le Centre O est le même que le Centre du Cercle circonscris; & quand tous les angles d'un *Polygone* ne sont pas égaux entre eux, il s'appelle *Polygone irregulier* : comme le *Pentagone* ABCDE.

## XXXIII.

On appelle *Angle du Centre* celuy qui se forme au centre d'un *Polygone regulier* par deux lignes droites tirées du centre du *Polygone* par les deux extremittez de l'un de ses côtez, comme FOG : & *Angle du Polygone*, celuy qui est formé par deux côtez d'un *Polygone regulier*, comme FGH.

## XXXIV.

XXXIV.

La *Diagonale* est une ligne droite tirée dans le Plan d'un Rectiligne d'un angle à un autre. Ainsi on connoît que la droite AC, ou BD, est la *Diagonale* du *Quarré* ABCD; que la droite EG est la *Diagonale* du *Quarré-long* EFGH; que la droite IL est la *Diagonale* du *Rhombé* IKLM, & que la droite NP est la *Diagonale* du *Rhombé* NOPQ.

La *Diagonale* d'un *Parallélogramme* se nomme plus ordinairement *Diametre du Parallélogramme*: & le point où les deux *Diametres* d'un *Quarré* s'entre-coupent, s'appelle *Centre du Quarré*, comme O. Il est évident qu'un *Polygone* est divisé par des *Diagonales* tirées d'un même angle en autant de *Triangles* qu'il y a de côtés, moins deux. Ainsi on voit que le *Pentagone* ABCDE est divisé en trois *Triangles* par les *Diagonales* DA, DB.


XXXV.






L'*Ovale Mathématique*, qu'on appelle plus ordinairement *Ellipse*, est un Plan terminé par une seule ligne courbe appelée *Circonférence de l'Ellipse*, comme ABCD, au dedans de laquelle tirant autant d'*Ordonnées* que l'on voudra à un *Diametre* quelconque AC, comme FG, HI, les *Quarrés* de ces *Ordonnées* FG, HI, ou seulement de leurs moitiés FK, HL, que l'on prend ordinairement pour les *Ordonnées* dans toute sorte de lignes courbes, sont proportionnels aux *Rectangles* sous les parties correspondantes du même *Diametre* AC; c'est à dire que le *Quarré* de l'*Ordonnée* FK est au *Rectangle* sous les parties correspondantes AK, KC, comme le *Quarré* de l'*Ordonnée* HL, est au *Rectangle* sous les parties correspondantes AL, CL.

Nous avons dit dans la *Déf. 11.* qu'une Ligne courbe peut avoir une infinité de *Diametres* différents, & nous dirons icy que quand ces *Diametres* ne sont point parallèles entre eux, le point où ils se coupent, se nomme *Centre de la Ligne courbe*: de sorte que le *Centre de l'Ellipse* sera le point E, où les deux *Diametres* AC, BD, se coupent en deux également: & quand ils s'entre-coupent à angles droits, comme icy, le plus grand AC, qui représente la longueur de l'*Ellipse*, se nomme *Grand Axe*, & le plus petit BD, qui représente la largeur de l'*Ellipse*, s'appelle *Petit Axe*.

XXXVI.

La *Parabole* est un Plan indéfini terminé par une ligne courbe, qu'on appelle *Ligne Paraboliq*ue, & que l'on confond ordi-





# DEFINITIONS.

TH

ordinairement avec la Parabole même ; comme ABC, au de-  
dans de laquelle tirant à un Diametre quelconque BD, autant  
d'Ordonnées que l'on voudra, comme FG, HI, les Quarrés  
de ces Ordonnées FG, HI, sont entre eux comme les parties  
correspondantes du Diametre BG, BI, ou bien, ce qui revient  
au même, le Quarré de chaque Ordonnée est égal au Rectan-  
gle sous la partie correspondante du Diametre & une certaine  
ligne BE d'une grandeur déterminée, qu'on appelle *Parametre*  
de la Parabole, c'est à dire que le Quarré FG est égal au  
Rectangle sous la partie correspondante BG, & le Parametre  
BE, & pareillement le Quarré HI est égal au Rectangle sous  
la partie correspondante BI, & le même Parametre BE.

Cette Parabole est appelée *Quarrée*, pour la distinguer de  
la Parabole cubique, ou le Cube d'une Ordonnée, comme FG;  
est égal au Solide sous la partie correspondante BG, & le  
Quarré du Parametre BE : & de la Parabole *Quarrée-quarrée* ;  
ou le Quarré-quarré d'une Ordonnée, comme FG est égal  
au Plan-plan sous la partie correspondante BG, & le Cube du  
Parametre BG : & ainsi des autres Paraboles infinies.

## XXXVII.

L'*Hyperbole* est une Surface plane indéfinie, terminée par  
une Ligne courbe qu'on appelle *Diamètre Hyperbolique*, & que  
l'on confond ordinairement avec l'*Hyperbole* même, comme  
ABC, au dedans de laquelle tirant à un Diametre quelconque  
BD, autant d'Ordonnées que l'on voudra, comme FG, HI,  
& prolongeant le même Diametre en dehors vers E, à une dis-  
tance BE d'une certaine longueur, qu'on appelle *Diamètre dé-  
terminé*, & que les Anciens ont appelé *Diametre transversé* ;  
le Quarré de l'Ordonnée FG est au Rectangle correspondant  
sous toute la ligne EG, & la partie BG, comme le Quarré  
de l'Ordonnée HI, est au Rectangle correspondant sous toute  
la ligne EI, & la partie BI.

Le point O, milieu du Diametre déterminé BE, se nomme  
Centre de l'*Hyperbole*, parce que c'est à ce point O, que con-  
courent tous les Diametres infinis de l'*Hyperbole*, quand on  
les prolonge en dehors, dont chacun a son Diametre déter-  
miné, entre lesquels celui qui appartient à l'*Axe* de l'*Hyper-  
bole*, se peut appeler *Axe déterminé*, comme BE, dont l'ex-  
tremité B est le sommet de l'*Hyperbole* ABC, & l'autre ex-  
tremité E est le sommet d'une autre *Hyperbole* semblable à  
la précédente ABC, qui ayant la même ligne BE pour *Axe*  
déterminé, est appelée *Hyperbole opposée*.

## XXXVIII.

Les *Asymptotes* d'une *Hyperbole* sont deux lignes droites  
indé-



Plan-  
che 2.  
14. Fig.

# TRAITE DE GEOMETRIE.

indéfinies tirées du Centre de l'Hyperbole, vers laquelle elles s'approchent toujours sans jamais la rencontrer., comme  $OR$ ,  $OS$ , dont la propriété est telle que si à l'une des deux Asymptotes, comme  $OS$ , on tire les parallèles  $BN$ ,  $KP$ ,  $LQ$ ,  $MR$ , terminées par l'autre Asymptote  $OR$ , & l'Hyperbole  $ABC$ , tous les Rectangles  $ONB$ ,  $OPK$ ,  $OQL$ ,  $ORM$ , sont égaux entre eux.

## XXXIX.

Plan-  
che 1.  
2. Fig.

La *Cycloïde* est une Ligne courbe causée par le mouvement d'un point de la circonférence d'un Cercle, qui étant perpendiculaire sur un Plan, roule le long d'une ligne droite du même Plan. Comme si le long de la ligne droite  $AC$  tracée sur un Plan, on fait rouler par pensée un Cercle perpendiculaire à ce Plan, comme  $BND$ , en sorte que le point  $B$  de sa circonférence étant en  $A$ , vienne jusques en  $C$ , auquel cas la droite  $AC$  sera égale à la circonférence de ce Cercle qu'on appelle *Cercle generateur*; ce point  $B$  décrira par son mouvement la courbe  $ABC$ , qu'on a appelée *Cycloïde*, & aussi *Roulette*.

## XL.

La *Spirale*, ou *Melice*, est une ligne courbe causée par le mouvement d'un point, qui se meut également sur une ligne droite, pendant que cette ligne droite se meut aussi également sur la circonférence d'un Cercle autour de son centre, où est le commencement de la Spirale, en sorte que quand le point aura parcouru toute sa ligne, en commençant depuis le Centre du Cercle, cette ligne aura aussi parcouru toute la circonférence de son Cercle.

Plan-  
che 2.  
18. Fig.

Comme si la ligne  $AB$  indéfinie vers  $B$  se meut autour du centre  $A$  par un mouvement uniforme, en parcourant en temps égaux des parties égales de la circonférence  $BCDE$ , & qu'un point se meuve aussi depuis  $A$  vers  $B$ , par un mouvement uniforme, en sorte que du Rayon  $AB$  il parcoure des parties semblables à celles que ce Rayon  $AB$  parcourt de sa circonférence, auquel cas ce point sera parvenu en  $B$ , lorsque le Rayon  $AB$  aura parcouru toute sa circonférence; ce même point décrira par son mouvement composé la Spirale  $A$ , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  $B$ , qu'on appelle *Première Spirale*, pour la distinguer de la *Seconde Spirale*, que l'on auroit en faisant mouvoir par pensée la ligne  $AB$  prolongée autour du même centre  $A$  par tous les points de la circonférence  $BCDE$ , pendant que le point continueroit à se mouvoir en même temps au-delà de  $B$ , par un mouvement uniforme & semblable à celui de la ligne  $AB$ , &c.

## XLI.

XLI.

La *Couronne* est un Plan terminé par deux circonferences de Cercle paralleles entre elles, c'est à dire par les circonferences de deux cercles décrits sur un Plan d'un même centre, lesquels à cause de cela on appelle *Cercles concentriques*. Comme si du centre A, l'on décrit les deux circonferences de cercle BCDE, FGHI, ces deux circonferences enfermeront un espace qu'on appelle *Couronne*. Plan-  
che 2.  
19. Fig.

XLII.

La *Zone* est la partie de la Surface d'une Sphere, terminée par les circonferences de deux cercles de la même Sphere, qui sont paralleles entre elles, c'est à dire qui ont deux mêmes points pour Poles, qui sont deux points de la Surface de la Sphere, diametralement opposez, & également éloignez des circonferences des cercles, dont ils sont les Poles. Comme si des deux Poles A, B, on décrit sur la Surface de la Sphere ADBC, les deux cercles paralleles CD, EF, ils enfermeront un espace qu'on appelle *Zone*. 16. Fig.

XLIII.

La *Sphere* est un Solide terminé par une seule Surface courbe, qu'on appelle *Superficie Spherique*, comme ADBC, au dedans de laquelle il y a un point comme O, qu'on appelle *Centre de la Sphere*, duquel toutes les lignes droites tirées jusqu'à la Surface, comme OC, OG, OD, qu'on appelle *Rayons de la Sphere*, ou *Demi-diametres de la Sphere*, sont égales entre elles. Le double de l'un de ces Rayons, comme CD, se nomme *Diametre de la Sphere*, laquelle est aussi appelée *Boule*, & *Globe*.

XLIV.

Le *Segment de Sphere*, qu'on appelle aussi *Section de Sphere*, & *Portion de Sphere*, c'est l'une des deux parties inégales d'une Sphere coupée par un Plan qui ne passe pas par son centre, autrement au lieu d'une Portion de Sphere, on auroit la moitié d'une Sphere qu'on nomme *Hémisphère*.

Comme si l'on coupe la Sphere ADBC, par le Plan CG, qui ne passe pas par son centre O, on aura le Segment de Sphere CGH, qui est plus petit que l'Hémisphère CDB : & le Segment de Sphere CGDA, qui est plus grand que l'Hémisphère CDA. Parce que la Section d'une Sphere & d'un Plan est

## TRAITE' DE GEOMETRIE.

Plan-  
che 2.  
16. Fig.

est un Cercle, comme nous avons démontré dans notre *Trigonometrie Spherique* L. 3. Chap. 1. Theor. 1. il est aisé de juger que la Base d'un Hemisphere est un Grand Cercle de la Sphere, savoir un Cercle, dont le Diametre, est égal à celui de la Sphere ; & que la Base d'une Section de Sphere est un Petit Cercle de la Sphere, savoir un cercle dont le Diametre, comme CG, est moindre que le Diametre CD de la même Sphere. On entend pour Cercle de la Sphere celui, dont la circonference se rencontre dans la Surface de la même Sphere, qui est la Section du Plan coupant & de la Surface de la Sphere, cette Section étant nécessairement la circonference d'un Cercle, dont le Plan est la Section du Plan coupant & de la Sphere.

### XLV.

L'Angle d'un Segment de Sphere est celui qui se forme au centre de la Sphere par deux Rayons tirez aux extremittez d'un des Diametres de la Base du Segment de Sphere plus petit qu'un Hemisphere. Ainsi on connoît que l'Angle du Segment de Sphere CGH, qui est moindre que l'Hemisphere CDB, est COG.

Plan-  
che 1.  
4. Fig.

Nous appellerons aussi Angle d'un Segment de Cercle, celui qui se fait au centre du cercle par deux Rayons tirez aux extremittez de l'arc du Segment moindre qu'un Demi-cercle. Ainsi on connoît que l'angle du Segment de cercle CBE, qui est moindre que le Demi-cercle ACEB, est COB, qu'on appelle aussi Angle du Secteur de cercle.

14. Fig.

Mais on appelle Angle dans un Segment de cercle, celui qui a sa pointe dans l'arc de ce Segment, & dont les deux lignes passent par les extremittez du même arc, ou de la corde de cet arc, qu'on nomme Base du Segment. Ainsi on connoît que l'Angle CEB est dans le Segment de cercle BCE, dont la Base est la corde BC de l'arc BEC. Cet Angle BEC est aussi appelé Angle à la circonference, parce que sa pointe E touche la circonference du cercle.

### XLVI.

Plan-  
che 2.  
26. Fig.

Le Secteur de Sphere est un Solide terminé en pointe au centre de la Sphere, & ayant pour Base la Surface d'un Segment de Sphere : comme COGH. Il est évident qu'un Secteur de Sphere est nécessairement moindre qu'un Hemisphere, comme le precedent COGH, ou bien plus grand qu'un Hemisphere, comme GOGDAÇ.

XLVII.

L'Angle d'un Secteur de Sphere est le même que celui qui appartient au Segment de Sphere qu'il comprend. Ainsi on connoît que l'Angle du Secteur de Sphere COGH, qui est moindre que l'Hémisphère CDB, est l'Angle COG de son Segment CGH. Planche 2. 16. Fig.

XLVIII.

Le Sphéroïde est un Solide causé par la circonvolution entiere d'une Demie-Ellipse autour de l'un de ses deux Axes, lequel dans ce cas est appelé *Axe du Sphéroïde* : & quand cet Axe est égal au plus grand Axe de l'Ellipse, ce Solide se nomme *Sphéroïde long*, comme ABCD, dont l'Axe est BD : & *Sphéroïde plat*, lorsque cet Axe est égal au plus petit Axe de l'Ellipse, c'est à dire lorsque la circonvolution se fait autour du plus petit Axe de l'Ellipse. 17. Fig.

Le Point O, milieu de l'Axe BD, se nomme *Centre du Sphéroïde*, & la droite AC, qui coupe à Angles droits au même centre O, l'Axe DB, s'appelle *Diametre du Sphéroïde*, pour le distinguer de l'Axe. Enfin on appelle *Sphéroïdes semblables*, ceux dont les Axes sont proportionnels à leurs Diametres : & *Segment de Sphéroïde* l'une des deux parties inégales d'un Sphéroïde, qu'on a coupé par un Plan qui ne passe pas par son centre, comme EED, ou EFB.

XLIX.

Le *Paraboloïde*, qu'on appelle aussi *Conoïde Parabolique*, c'est un Solide, qui est produit par la circonvolution entiere d'une Demi-Parabole autour de son Axe, lequel à cause de cela est appelé *Axe du Paraboloïde*, qui passe par le centre de sa Base, qui est un cercle. Comme ACBE, dont l'Axe est CD, qui passe par le Centre D de la Base AEBF, qui est un cercle, dont le Diametre est AB.

Si au lieu d'une Parabole, on fait tourner une Hyperbole autour de son Axe, le Solide qui se produira par cette circonvolution, sera appelé *Conoïde Hyperbolique*, dont l'Axe sera le même que celui de l'Hyperbole, & dont la Base sera pareillement un Cercle.

Que si l'on fait mouvoir en même temps autour du même Axe de l'Hyperbole l'une de ses deux Asymptotes, il se produira par la circonvolution entiere un autre Solide plus grand, que nous appellerons *Cone Asymptotique*, dont la Base sera pareillement un Cercle, dont le Sommet sera au Centre de l'Hyperbole.

Plan-  
che 2.  
22. Fig.

On pourroit aussi appeller un Sphéroïde, *Conoïde Elliptique*, parce qu'un *Conoïde* generalement parlant, est un Solide qui est produit par la circonvolution entiere d'une *Section Conique*, c'est à dire de la Section d'un Cone par un Plan, autour de son Axe : & que l'Ellipse, aussi bien que la Parabole & l'Hyperbole sont des Sections Coniques. Voyez le *Traité des Sections Coniques*, que nous avons autrefois publié, sous le nom des *Lignes du premier genre*.

Comme le Cercle est aussi une Section Conique, & que la Sphere se produit par la circonvolution entiere d'un Demi-cercle autour de son Diametre, la Sphere se pourroit aussi appeller *Conoïde circulaire* : & toutes les lignes courbes qui bornent ces quatre Sections Coniques se peuvent appeller *Lignes Coniques*, comme étant les Sections d'un Plan & d'une *Superficie Conique*, c'est à dire de la Surface d'un Cone.

### L.


Le Cone est un Solide terminé en pointe, qu'on appelle *Sommet du Cone*, qui est produit par la circonvolution entiere d'un Triangle autour de l'un de ses côtez, lequel à cause de cela est appellé *Axe du Cone*, qui passe par le Centre de sa *Base*, qui est un Cercle. Comme si autour du côté immobile CD on fait mouvoir par pensée le Triangle CDB, ce Triangle décrira le Cone ACBE, dont l'Axe est le côté immobile CD, & le côté BC qu'on appelle *Côté du Cone*, décrira la *Superficie Conique*, & enfin l'autre côté DB décrira le Cercle AEBF, qui sert de *Base* au Cone, & dont le Centre est le point immobile D, & le Diametre est AB double de ce côté DB.


Lorsque l'Angle D, du Triangle generateur CDB est droit, le Solide qui est produit par son mouvement, se nomme *Cone droit*, parce que son Axe est perpendiculaire à sa *Base* : & aussi *Cone Isoscèle*, parce que tous ses côtez sont égaux. Mais quand du même Triangle CDB, l'angle D est oblique, le Solide qui se produit par sa circonvolution, s'appelle *Cone incliné*, parce que son Axe est incliné à sa *Base* : & aussi *Cone Scaléne*, parce qu'il n'a pas tous ses côtez égaux.

On dit que deux Cones sont *semblablement inclinez*, lorsque leurs Axes font avec leurs Bases des angles égaux : & que deux Cones sont *semblables*, lorsqu'ils sont semblablement inclinez, & que leurs Axes sont proportionnels aux Diametres de leurs Bases.

### LI.

Le Cone tronqué est un Solide qui est produit par la circonvolution entiere d'un Trapezoïde autour de l'un de ses deux





(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

# D É F I N I T I O N S.

17

deux côtes qui ne sont pas parallèles, lequel à cause de cela est appelé *Axe du Cone tronqué*, qui joint les centres des deux Bases opposées & parallèles, qui sont deux Cercles inégaux décrits par le mouvement des deux côtes opposés parallèles & inégaux du Trapezoïde generateur. Plan. che 2. 12. Fig.

Comme si autour du côté immobile IK du Trapezoïde IKBC, dont les deux côtes opposés IC, KB, sont parallèles entre eux, on fait rouler par pensée ce Trapezoïde IKBC, on aura par cette circonvolution le Cone tronqué ABCD, dont l'Axe est le côté immobile IK. & dont les deux Bases opposées & parallèles sont les deux Cercles AEBF, DGCH, dont les Centres sont K, I, & les Diamètres sont AB, CD. Il est évident que ces deux Cercles sont décrits par le mouvement des deux côtes opposés & parallèles IC, KB, & que l'autre côté mobile BC, qui est le *Côté du Cone tronqué*, décrit par son mouvement la Surface de ce Cone tronqué. Plan. che 31. 23. Fig.

## L I I.

Le Cylindre est un Solide qui est produit par la circonvolution entiere d'un Parallelogramme autour de l'un de ses côtes, lequel à cause de cela est appelé *Axe du Cylindre*, qui passe par les centres des deux Bases opposées & parallèles qui sont deux Cercles égaux décrits par le mouvement des deux autres côtes opposés égaux & parallèles du Parallelogramme generateur.

Comme si autour du côté immobile EF du Parallelogramme EFBC, on fait rouler par pensée ce Parallelogramme EFBC, on aura le Cylindre, ou Colonne ABCD, dont l'Axe est le côté immobile EF, & son côté opposé & parallèle BC, qu'on appelle *Côté du Cylindre*, décrira la Surface Cylindrique, & enfin les deux autres côtes opposés égaux & parallèles FB, EC, décriront deux Cercles égaux, qui servent de Bases au Cylindre, & qui ont pour centre les deux points E, F, & pour Diamètres les deux lignes AB, CD. Plan. che 2. 13. Fig.

Lorsque l'angle E du Parallelogramme generateur EFBC, est droit, c'est à dire lorsque ce Parallelogramme est rectangle, le Solide qui est décrit par son mouvement, se nomme *Cylindre droit*, parce que son Axe est perpendiculaire à ses deux Bases: mais quand du même Parallelogramme EFBC, les angles sont obliques, le Solide que sa circonvolution produit, s'appelle *Cylindre oblique*.

On dit que deux Cylindres sont semblablement inclinés, lorsque leurs Axes font avec leurs Bases des angles égaux: & que deux Cylindres sont semblables, quand ils sont semblablement inclinés, & que leurs Axes sont proportionnels aux Diamètres de leurs Bases.



Plan-  
che 2.  
13. Fig.

On appelle *Cylindre Cube* celui dont la hauteur est égale au Diamètre de la Base.

## L I I I.

19. Fig.

L'Orbe est un Corps Spherique terminé par deux Surfaces Spheriques, l'une concave, & l'autre convexe: comme le corps qui est borné par les deux Surfaces Spheriques BCDE, qui est convexe, & FGHI, qui est concave, où vous voyez que l'Orbe est ce qui reste, lorsque d'une grande Sphere, comme BCDE, on en retranche une plus petite qui est en dedans, comme FGHI. Ces deux Spheres ont icy un même centre A, mais elles peuvent être *Excentriques*, c'est à dire que leurs centres peuvent être differens, & alors cet Orbe ne sera pas par tout d'une égale épaisseur.

## L I V.

11. Fig.

L'Angle Solide est un espace indéfini terminé par plus de deux Plans, qui se coupent en un point: comme D, qui est compris par trois Plans triangulaires, dont on en voit deux dans la Figure, sçavoir ADB, BDC. Le sommet d'un Cone est aussi un Angle Solide, quel'on peut concevoir comme compris d'une infinité de Plans Triangulaires.

## L V.

La Pyramide est un corps terminé en pointe, & borné au moins par quatre Plans qui sont tous triangulaires excepté celui qui est opposé à cette pointe ou Angle Solide, & qu'on appelle *Base de la Pyramide*, qui peut avoir plus de trois côtes, à l'égard de laquelle l'angle solide opposé se nomme *Sommet de la Pyramide*, duquel toutes les lignes droites tirées aux angles de la Base, se nomment *Côtes de la Pyramide*, qui est icy représenté par la Figure ABCD, dont la Base ABC est de quatre côtes, & le sommet est l'angle solide D, & enfin dont les côtes sont DA, DB, DC, &c.

Une Pyramide peut aussi être *Droite*, & *Oblique*: on connoît qu'elle est *Droite*, lorsque son *Axe*, qui est une ligne droite tirée de son sommet par le centre de la Base que je suppose reguliere, est perpendiculaire au Plan de la Base: & qu'elle est *Oblique*, lorsque son *Axe* est oblique au Plan de la Base, c'est à dire lorsqu'à l'égard de ce Plan, il panche plus d'un côté que d'autre. Quand la Base est un Triangle, on l'appelle *Pyramide triangulaire*, comme ABCD, qu'on nomme *Tetraëdre*, quand les quatre Triangles sont égaux & égaux entre eux.

20. Fig.

## L V I.

LVI.

La *Pyramide tronquée* est le reste d'une Pyramide, de laquelle on a retranché vers son Sommet une Pyramide plus petite, par un Plan parallèle à sa Base, ce qui donne à ce reste, ou Pyramide tronquée deux Bases semblables & parallèles, une Grande, qui est la même que celle de la Pyramide totale, & une Petite, qui est la même que celle de la Pyramide retranchée, où la Section du Plan coupant & de la Pyramide totale.

Comme si l'on coupe la Pyramide ABCO par le Plan FGDE <sup>Plan- che 3.</sup> parallèle à la Base ABCH, ce Plan retranche la petite Pyramide FGDO, & laisse la Pyramide tronquée ABCDEFG, dont la grande Base est le Plan ABCH, & la petite est le Plan DEFG, qui est parallèle au précédent ABCH. <sup>24. Fig.</sup>

LVII.

Le *Prisme* est un Solide terminé par plus de quatre Plans qui sont tous des Parallelogrammes, excepté deux opposés qu'on appelle *Bases du Prisme*, & qui peuvent être autres que des Parallelogrammes, mais quelque figure qu'ils puissent avoir, ils sont toujours semblables, égaux & parallèles entre eux : quand ils sont des Triangles, le Solide s'appelle *Prisme triangulaire*, comme ABCDE, & quand ils sont des Parallelogrammes, le Prisme se nomme *Parallelepipede*, qui prend le nom de *Parallelepipede Rectanglé*, quand les six Plans qui le bornent, sont des Rectangles, comme ABCDE, qu'on appelle *Cube*, & *Enaïme*, quand ces six Plans sont des Quatrez égaux, comme un Dé à jouer. <sup>Plan- che 2. 15. Fig. 21. Fig.</sup>

LVIII.

Le *Rhombé Solide* est un corps composé de deux Cones droits, dont les Bases sont égales entre elles, & jointes ensemble, & dont par conséquent les deux Axes font une même ligne droite : comme ABCD. <sup>Plan- che 3. 25. Fig.</sup>

LIX.

Le *Polyedre* est un Solide terminé par plusieurs Redoublés réguliers, qu'on appelle *Face du Polyedre*, & *inscriptible*, dans une Sphère ; c'est à dire que tous les angles solides peuvent toucher la Surface d'une Sphère qui lui seroit circonscrite, duquel par conséquent le Centre est le même que celui de cette Sphère : comme ABCD, qui est terminé par quatre Faces, savoir de huit Hexagones réguliers, & égaux entre eux, & de six Quatrez pareillement égaux entre eux. <sup>Plan- che 3. 29. Fig.</sup>

Un Polyedre peut comme le Polygone, être *Reglier* & *Irreglier*.

- Plan- e. 10 3. Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. Fig.
- Regulier** : l'irregulier étant celui qui n'a pas toutes ses Faces égales & semblables entre elles, comme le precedent ABCD: & le **Regulier** celui qui a toutes ses Faces semblables & égales entre elles, & par conséquent tous les angles solides égaux, or quoy qu'il y ait une infinité de Polygones reguliers, parce que l'on peut diviser la circonference d'un Cercle en autant de parties égales qu'on voudra: neanmoins on ne compte que cinq Corps reguliers, sçavoir le **Tetraëdre**, dont nous avons déjà parlé: le **Cube**, ou l'**Hexaëdre**, dont nous avons aussi parlé: l'**Octaëdre**, qui est terminé par huit Triangles égaux, & équilatéraux, comme ABCDEF: le **Dodecaëdre**, qui est borné par douze Pentagones reguliers & égaux, comme ABCD: & l'**Icosaëdre**, qui est compris par vingt Triangles égaux & équilatéraux, comme ABCDEF.

L X.

La *Mesure* est une quantité continuë, dont on se sert pour mesurer une autre quantité continuë homogene & plus grande, c'est à dire pour sçavoir combien de petites mesures contient une quantité plus grande, & en déterminer le contenu, qu'on appelle *Longueur*, quand on mesure une Ligne: *Aire*, quand on mesure une Superficie: & *Solidité*, quand on mesure un Solide.

Cette mesure est toujours une Ligne droite, quand elle exprime la longueur d'une Ligne: un Rectangle qui est ordinairement un Quarré, & alors on l'appelle *Mesure quarrée*, quand elle exprime l'Aire d'une Superficie: & un Parallelepipede rectangle, qui est ordinairement un Cube, & alors on la nomme *Mesure cubique*, quand elle represente la Solidité d'un Corps.

Les Mesures sont différentes selon les païs differens: mais parmi les Mathematiciens la mesure ordinaire, qui est comme le fondement de toutes les autres, est le *Pied*, dont la longueur est d'une certaine grandeur déterminée dans tout le Royaume par l'autorité du Prince, & qu'à cause de cela on appelle communément *Pied de Roy*, pour le différencier du *Pied de Ville*, qui n'est pas le même dans toutes les Villes du Royaume, au lieu que le *Pied de Roy* est le même parmi tous les Mathematiciens.

C'est donc de ce *Pied* que nous parlerons dans la suite, & nous dirons premicrement qu'on le nomme *Pied courant*, & *Pied de long*, étant considéré selon sa longueur, ce qui arrive lorsqu'on s'en sert pour mesurer une ligne plus grande: *Pied quarré*, que l'on considère comme un Quarré, dont chaque côté est d'un *Pied de long*, quand on s'en sert pour mesurer une Superficie plus grande, dont l'Aire s'exprime par de petits quarrés ayant un *Pied* dans chacun de leurs côtés: & *Pied cube*, que

que l'on considère comme un cube, dont chaque côté est d'un Pied courant, lorsqu'on s'en sert pour mesurer un Solide plus grand, dont la Solidité s'exprime par de petits-Cubes, ayant un Pied en chacun de leurs côtés.

On connoîtra de la même façon, qu'un Pouce quarré est un Quarré, dont chaque côté est d'un Pouce de long, ou Pouce courant, qui est la douzième partie d'un Pied courant, & qu'un Ponce cubique est un Cube, dont chaque côté est aussi d'un Pouce courant, & pareillement qu'une Toise quarrée, est un Quarré, dont chaque côté est d'une Toise de long, ou Toise courante, qui vaut six Pieds courans: & qu'une Toise cubique, ou Toiserube, est un Cube, dont chaque côté est aussi d'une Toise courante.

On connoîtra aussi qu'une Ligne quarrée, est un Quarré, dont chaque côté est d'une Ligne de long, ou Ligne courante, qui est la douzième partie d'un Pouce courant, & qu'une Ligne cubique est un Cube, dont chaque côté est aussi d'une Ligne de long: & que pareillement une Perche quarrée est un Quarré, dont chaque côté est d'une Perche de long, ou Perche courante, qui est de 22 pieds, selon l'Ordonnance, quoique dans la Prevôté de Paris elle ne soit que de 18 Pieds, ou de trois Toises: & qu'une Perche cubique, qui n'est pas en usage, est un Cube, dont chaque côté est aussi d'une Perche courante.

On proportionne les Mesures aux Grandeurs que l'on veut mesurer. Ainsi les Artisans se servent de petites mesures, comme du Pied, du Pouce, & de la Ligne pour la mesure des tables des Miroirs, &c. Les Architectes & les Ingenieurs se servent du Pied & de la Toise pour la mesure des Edifices & des terres remuées. Les Arpenteurs se servent dans les grands terrains de la Perche, & de l'Arpent, qui contient dix Perches en longueur, & cent Perches quarrées en quarré, ce qui fait l'Arpent quarré, duquel on entend toujours parler, quand on dit qu'une Vigne, qu'un Pré, ou quelque terre labourable est de tant d'Arpons, ce qui a donné le nom d'Arpenteurs à ceux qui font profession de mesurer les terres, & d'Arpentage à cette Partie de la Geometrie Pratique, qu'on appelle Planimetrie.

Enfin les Astronomes mesurent les grandes distances dans le Ciel, comme la distance d'une Planette à la Terre par des Demi-diametres de la Terre; & les grandes distances sur la Terre, comme l'éloignement d'une Ville à une autre par Lieues, qui sont différentes selon les Pais differens, non seulement en longueur, mais aussi en noms, qui sont tous compris sous ce terme general de Mesures itineraires, qui sont différentes en longueur dans un même Royaume, car il y en a de Grandes, de Moyennes, & de Petites; la Grande Lieue de France est ordinairement de 3000 Pas Geometriques.

& en quelques endroits de 3400 la *Moyenne*, ou la *Lieu Com-mune de France*, est de 2400 Pas Geometriques, & la *Petite Lieue de France* de 2000 Pas Geometriques, sçavoir le double d'un *Mille d'Italie*, ainsi appelé, parce qu'il contient mille Pas Geometriques, ou huit *Stades*, parce que la *Stade*, qui est une mesure particuliere aux Grecs, est de 125 Pas Geometriques, ou de 625 Pieds, car un Pas Geometrique est de cinq Pieds, le Pas commun n'étant que de deux Pieds & demy.

Un Pas Geometrique mis en Pendule, c'est à dire un Pendule long de cinq Pieds, en prenant cette longueur depuis le centre du mouvement jusqu'au centre du poids Spherique qui est suspendu à l'extrémité du Pendule, fait en demi-heure de temps 1252 Vibrations simples, ce qui peut servir pour recouvrer la longueur du Pas Geometrique, si elle étoit perdue, ou altérée, par l'experience, qui nous apprend que les quarrés des nombres des Vibrations de deux Pendules, sont en temps égal reciproquement proportionnels aux longueurs des mêmes Pendules, sçavoir en faisant un second Pendule d'une longueur connue, & dont le poids Spherique soit le même que celui du premier Pendule, & en comptant le nombre de ses Vibrations simples pendant une demi-heure de temps: car si ce nombre est égal à celui des Vibrations simples du premier, sa longueur sera aussi égale à celle du premier, c'est à dire du Pas Geometrique, laquelle par consequent sera connue, autrement on trouvera cette longueur, par le moyen de l'Analogie suivante,

*Comme le quarré du nombre des Vibrations du premier Pendule,*

*Est au quarré du nombre des Vibrations du second Pendule,*

*Ainsi la longueur du second Pendule,*

*Est à la longueur du premier Pendule.*

Les termes qui manquent icy, se trouveront expliquez dans la suite, ou bien dans les Elements d'Euclide.



# PREMIERE PARTIE.

## DE LA GEODESIE.

**L**A *Geodesie* est une partie de la *Geometrie Pratique*, qui enseigne à faire le partage d'une Terre, ou d'un Champ, qui contient des terres labourables, des Prez, des Vignes, & des Bois, entre deux ou plusieurs Heritiers, & c'est à cause de cela que cette partie se nomme aussi *Division des Champs*, que nous diviserons en trois Chapitres, dont le premier enseignera la Division des Triangles, le second enseignera la Division des Quadrilateres, & le dernier enseignera la maniere de diviser une piece de terre qui aura plus de quatre côtez, c'est à dire la Division des Polygones.

### CHAPITRE I.

#### *De la Division des Triangles.*

**N**ous commençons par le Triangle qui est la premiere & la plus simple des Figures rectilignes, que l'on considère seulement dans la pratique: & quoique toutes les Figures qui se rencontrent sur la terre, ne soient pas toujours rectilignes, néanmoins on ne laisse pas de les concevoir comme rectilignes, quand il y a peu de difference, autrement on les reduira en rectilignes, en divisant les côtez qui seront des lignes courbes, en plusieurs petites patties, qui pourroient passer pour des lignes droites.

### PROBLEME I.

*Diviser un Triangle en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites tirées d'un angle donné.*

**P**our diviser le Triangle ABC, par exemple en trois parties égales, par des lignes droites tirées de l'angle donné C, divisez le côté opposé AB en trois parties égales aux

B 4 points

points D, E, & menez de l'angle donné A, par les points de division D, E, les droites CD, CE, qui partageront le Triangle proposé ABC en trois également, dont la démonstration est évidente, par 38. 1.

## S C O L I E.

Si au lieu de diviser le Triangle proposé ABC, en parties égales, on les vouloir partager en des parties qui fussent en Raison donnée, par des lignes droites tirées de l'angle donné C; il est évident par 1. 6. qu'il n'y auroit qu'à diviser le côté opposé AB, selon la Raison donnée, par 9. 6. ou par 10. 6. & achever le reste comme auparavant.

## P R O B L E M E II.


*Diviser un Triangle en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites tirées d'un point donné sur un côté.*

Pour diviser le Triangle ABC, par exemple en trois parties égales par des lignes droites tirées du point D donné sur le côté AB, divisez ce côté AB, en trois parties égales aux points E, F, & ayant joint la droite CD, tirez luy par les points de division E, F, les parallèles EG, FH, qui donneront sur les côtés AC, BC, les points G, H, par où & par le point donné D, vous tirerez les droites DG, DH, qui partageront le Triangle proposé ABC en trois également, de sorte que chacun des deux Triangles ADG, BDH, sera égal à la troisième partie du proposé ABC, c'est à dire que si l'on joint les droites CE, CF, le Triangle ADG est égal au Triangle AEC, qui est la troisième partie du proposé ABC, par 1. 6. & que pareillement le Triangle BDH est égal au Triangle BFC, qui est aussi le tiers du proposé ABC.


## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que les deux lignes CD, EG, sont parallèles, par *constr.* les deux Triangles GCE, GDE, qui ont la même ligne GE pour base, seront égaux entre eux, par 37. 1. c'est pourquoy si de chacun on retranche le Triangle commun GIE, il restera le Triangle GIC, égal au Triangle DIE, & si à chacun de ces deux Triangles égaux DIE, GIC, on ajoute le Trapeze AEIG, on aura le Triangle AGD égal au Triangle ACE : & l'on connoitra de la même façon que le Triangle BHD est égal au Triangle BCF, à cause des deux parallèles FH, CD. Ce qu'il falloit démontrer.

Ou







On bien parce que les deux lignes EG, CD, sont parallèles, par constr. les deux Triangles AGE, AGD, qui ont l'angle commun A, seront équiangles, par 29. 1. & par 4. 6. les quatre côtez AG, AE, AC, AD, seront proportionnels, c'est pourquoy les deux Triangles AGD, ACE, seront égaux, par 15. 6. & l'on connoitra de la même façon, que les deux Triangles BHD, BCF, sont aussi égaux. Ce qu'il falloit démontrer.

Planche 4.  
31. Fig.

## S C O L I E.

Lorsque le point D sera donné au milieu du côté AB, auquel cas le Triangle proposé ABC se trouvera divisé en deux également par la droite CD, par 38. 1. on pourra partager ce Triangle ABC en six parties égales, en le divisant premièrement en trois également, comme auparavant, & en divisant en deux également chacune des deux lignes AG, BH, aux points L, M, pour tirer les droites DL, DM. Ou bien en divisant chacun des deux côtez AC, BC, en trois parties égales aux points L, G, M, H, & en joignant les droites DL, DG, DH, DM, &c.

32. Fig.

## P R O B L E M E III.

*Diviser un Triangle en trois parties égales par des lignes droites tirées des trois angles du Triangle proposé.*

Pour diviser le Triangle ABC en trois parties égales par trois lignes droites tirées des angles A, B, C, ayant pris sur l'un des côtez de ce Triangle, comme AB, la troisième partie AD, tirez par le point D, la ligne DE parallèle au côté adjacent AC, & par le point F, milieu du côté DE, tirez aux trois angles A, B, C, les droites FA, FB, FC, qui partageront le Triangle proposé ABC en trois Triangles égaux AFB, AFC, BFC, de sorte que chacun sera le tiers du Triangle ABC.

33. Fig.

## D E M O N S T R A T I O N.

En joignant la droite CD, on connoitra par 1. 6. que le Triangle ACD est la troisième partie du Triangle ABC, à cause de la Base AB triple de la Base AD, par constr. & que par conséquent le Triangle AFC, qui est égal au Triangle ADC, par 37. 1. est aussi la troisième partie du Triangle ABC. D'où il suit que les deux autres Triangles AFB, BFC, sont ensemble égaux aux deux tiers du même Triangle ABC, & que par conséquent chacun est le tiers du Triangle ABC, parce qu'ils sont égaux entre eux, à cause des deux Triangles égaux BFD, BFE, par 38. 1. & aussi des deux égaux AFD, CFE. Ce qu'il falloit démontrer.

P R O-

## PROBLEME IV.

*Diviser un Triangle donné en trois parties égales, par deux lignes droites parallèles à deux côtez, & par une troisième ligne tirée de l'angle des deux mêmes côtez.*

Plan-  
che 4.  
34. Fig.

Pour trouver un point au dedans du Triangle donné ABC, duquel tirant deux lignes droites parallèles aux deux côtez AC, BC, & une troisième ligne à l'angle C, le Triangle ABC, se trouve divisé en trois parties égales; ayant tiré de cet angle C, sur son côté opposé AB, la perpendiculaire CG, faites au même point C, avec la perpendiculaire CG, l'angle GCH de 30 degrez, ce qui se peut faire geometriquement, afin que le quarré de GH soit égal au tiers du quarré CG, comme il sera évident à celui qui considerera que l'angle G étant droit, & l'angle GCH de 30 degrez, l'angle H est de 60 degrez, qui est l'angle du Triangle équilatéral, dont le côté est CH, la perpendiculaire est CG, & la moitié de la base est GH. Prenez donc sur la perpendiculaire CG, la ligne GK égale à la ligne GH, & tirez par le point K, au côté AB, la parallèle LM; dont le point de milieu D fera celui qu'on cherche, de sorte que si de ce point D, on tire à l'angle C, la droite CD, & aux deux côtez AC, BC, les parallèles DE, DF, le Triangle proposé ABC se trouvera partagé en trois parties égales.

## DÉMONSTRATION.

Parce que le Triangle EDF est semblable au Triangle ABC, à cause des deux côtez DE, DF, parallèles aux deux AC, BC, par constr. & que le quarré de sa hauteur DI, ou GK, ou GH, est le tiers du quarré de la hauteur GC du Triangle ABC, il est aisé de conclure par 19. 6. que ce Triangle EDF est aussi le tiers du Triangle ABC. D'où il suit que les deux Trapezoïdes ACDE, BCDF, sont ensemble égaux aux deux tiers du Triangle ABC, & que par conséquent chacun est égal au tiers du même Triangle ABC, parce que ces deux Trapezoïdes sont égaux entre eux, à cause des deux Triangles égaux CDL, CDM, par 38. 1. & des deux Parallelogrammes égaux AEDL, BFDL, par 36. 1. Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E.

35. Fig.

Sil'on fait la hauteur DI du Triangle EDF égale à la moitié de la hauteur CG du Triangle ABC, auquel cas la ligne AL sera la moitié du côté AC, & pareillement la ligne BM la moitié du côté BC, le Triangle ABC se trouvera partagé

ca

en quatre parties égales, qui seront les deux Triangles EDF, Plan-  
CLM, & les deux Parallelogrammes AEDL, BFDL: & si che 4.  
l'on tire les deux Diagonales AD, BD, & la droite CDO, le 35. Fig.  
Triangle proposé ABC se trouvera divisé en huit Triangles  
égaux.

## PROBLEME V.

*Diviser un Triangle donné en trois parties égales, par deux  
lignes droites, dont l'une soit parallèle, & l'autre per-  
pendiculaire à un même côté.*

Pour diviser le Triangle ABC en trois parties égales, par 36. Fig.  
deux lignes droites, dont l'une soit parallèle, & l'autre soit  
perpendiculaire au côté AB, tirez à ce côté AB, du son angle  
opposé C, la perpendiculaire CG, & faites au point C, avec  
cette perpendiculaire CG, l'angle GCI de 30 degrés, com-  
me dans le Problème précédent, où nous avons remarqué  
que le carré de la ligne GI est le tiers du carré de la ligne  
CG: c'est pourquoi si sur cette ligne CG, on prend la partie  
CL égale à la ligne GI, & que par le point L on mène la  
droite EF parallèle au côté AB, on aura le Triangle CEF égal  
au tiers du proposé ACB, auquel il est semblable, com-  
me nous avons aussi reconnu au Problème précédent. Enfin  
ayant tiré des deux points E, F, les deux lignes EH, FK,  
perpendiculaires au côté AB, prenez sur le côté AB, la li-  
gne AO égale à la quatrième partie de la somme d'une fois  
BK, de deux fois HK, & de trois fois AH, & élevez du  
point O, sur AB, la perpendiculaire OD, laquelle avec la  
ligne EF parallèle à AB, partagera le Triangle proposé ABC  
en trois parties égales, qui sont le Triangle CEF, & les deux  
Trapezoïdes AOED, BODE.

## DEMONSTRATION:

Nous avons déjà reconnu, que le Triangle CEF est le  
tiers du Triangle ABC, d'où il est aisé de conclure, que le  
Trapezoïde ABFE est égal aux deux tiers du même Triangle  
ABC: & comme il est divisé en deux également par la per-  
pendiculaire DO, comme nous démontrerons au Probl. 13.  
Chap. 2. il s'ensuit que les deux Trapezoïdes égaux AOED,  
BODE, sont chacun le tiers du Triangle ABC, & qu'ainsi  
ce Triangle ABC est divisé en trois également par la ligne  
EF parallèle au côté AB, & par la ligne DO perpendiculaire  
au même côté AB. Ce qu'il falloit faire & démontrer.

## PROBLEME VI.

*Diviser un Triangle donné en trois parties égales ; par trois lignes droites tirées d'un point donné au dedans du Triangle.*

Plan-  
che 4.  
37. Fig.

**P**our diviser le Triangle ABC en trois parties égales, par trois lignes droites tirées du point D donné au dedans de ce Triangle, prenez sur l'un des côtez, comme AB, la troisième partie AE, & ayant joint la droite DE, tirez-luy par l'angle opposé C, la parallèle CF, que vous diviserez en deux également au point G, par lequel il faut tirer à la ligne DB, la parallèle GH. Enfin tirez les trois lignes DC, DF, DH, qui partageront le Triangle proposé ABC, en trois parties égales, qui seront le Triangle CDH, & les deux Trapezes ACDF, BFDH, de sorte que chacun de ces trois plans sera le tiers du Triangle ABC.

## DEMONSTRATION.

Si l'on joint la droite CE, on considerera que puisque la ligne AE est la troisième partie de la ligne AB, par consr. le Triangle ACE est aussi la troisième partie du Triangle ABC. par 1. 6. & l'on connoitra comme dans le Probl. 2. que le Trapeze ACDF est égal au Triangle ACE, & par conséquent au tiers du Triangle ABC. D'où il suit que le Trapeze CDFB est égal aux deux tiers du même Triangle ABC, & parce qu'il est divisé en deux également par la droite DH, comme nous démontrerons au Probl. 11. Chap. 2. il s'ensuit que ses moitez, sçavoir le Triangle CDH, & le Trapeze BFDH, sont aussi chacun le tiers du Triangle ABC. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROBLEME VII.

*Diviser un Triangle en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites paralleles à un côté donné.*

Fig.

**P**our diviser le Triangle ABC, par exemple en trois parties égales, par des lignes droites parallèles au côté AB, divisez l'un des deux autres côtez AC, BC, comme BC, en trois également aux points D, E, & prenez sur ce côté BC, la partie CF moyenne proportionnelle entre le côté BC & son

son tiers CE, & parceller la partie CG moyenne proportionnelle entre le même côté BC & ses deux tiers CD, pour tirer par les deux points F, G, au côté AB, les parallèles FH, GI, qui partageront le Triangle proposé ABC en trois parties égales, qui seront le Triangle CHF, & les deux Trapezoïdes AIGB, IHFG, de sorte que chacun de ses trois Plans sera le tiers du Triangle ABC. Plan che 4. 38. Fig.

D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les Triangles HFC, ABC, sont équiangles, à cause des deux parallèles AB, HF, par constr. ils seront entre eux comme les quarrés de leurs côtes homologues CF, BC, par 19. 6. & parce que le quarré CF est au quarré BC, comme CE à son triple BC, par Coroll. 20. 6. à cause des trois proportionnelles BC, CF, CE, par constr. il s'ensuit que le Triangle HFC est le tiers du Triangle ABC, & l'on démontrera de la même façon, que le Triangle IGC est égal aux deux tiers du même Triangle ABC, d'où il est aisé de conclure que chacun des deux Trapezoïdes IGFH, ABGI, est le tiers du Triangle ABC. Ce qu'il falloit démontrer.

P R O B L E M E V I I I .

*Diviser un Triangle en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites perpendiculaires à un côté donné.*

Pour diviser le Triangle ABC, par exemple en trois parties égales, par des lignes perpendiculaires au côté BC, tirez à ce côté BC, de son angle opposé A, la perpendiculaire AD, & divisez l'un des deux Segmens BD, CD, comme BD, en trois parties égales aux points E, F. Prenez sur le même côté BC, la partie BG moyenne proportionnelle entre le côté BC & le tiers BF du Segment BD, & la partie BH moyenne proportionnelle entre le même côté BC, & les deux tiers BE du même Segment BD, & tirez des deux points G, H, sur le côté BC, les perpendiculaires GI, HK, qui diviseront le Triangle proposé ABC en trois parties égales, qui sont le Triangle BIG, le Trapezoïde KIGH, & le Trapeze AKHC, de sorte que chacun de ces trois Plans sera égal au tiers du Triangle ABC. 39. Fig.

D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les Triangles ABD, IBG, sont équiangles, à cause des deux parallèles AD, IG, par constr. la Raison des deux lignes

Plan-  
che 4.  
39. Fig.

lignes BD, AD, sera égale à celle des deux BG, IG, par 4. 6. c'est pourquoy si aux deux premiers termes BD, AD, on donne la hauteur commune BC, & aux deux derniers BG, IG, la hauteur commune BG, on connoitra par 1. 6. que le Rectangle sous BC, BD, est au Rectangle sous BC, AD, comme le Carré BG, ou le Rectangle sous BC, BF, qui luy est égal par 17. 6. à cause des trois proportionnelles BC, BG, BF, par constr. est au Rectangle sous BG, IG: & comme le premier antecédent de cette Analogie, sçavoir le Rectangle sous BC, BD, est triple du second antecédent, c'est à dire du Rectangle sous BC, BF, par 1. 6. parce qu'ils ont une même hauteur BC, & que la base BD du premier est triple de la base BF du second, par constr. le premier conséquent, sçavoir le Rectangle sous BC, AD, ou par 41. 1. le double du Triangle ABC, sera aussi triple du second conséquent, c'est à dire du Rectangle sous BG, IG, ou du double du Triangle BGI. D'où il est aisé de conclure que le Triangle BGI est le tiers du Triangle ABC, & l'on connoitra de la même façon que le Triangle BHK est égal aux deux tiers du même Triangle ABC, & que par conséquent chacun des deux Trapezes KIGH, AKHC, est le tiers du Triangle ABC. Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E.

On peut diviser de la même façon le Triangle ABC en parties égales, par des lignes droites qui fassent un angle donné avec un côté, comme si ce côté est BC, on fera au point A, l'angle BAD égal au donné, & ayant trouvé comme auparavant les deux points G, H, on tirera par ces deux points G, H, les droites GI, HK, parallèles à la ligne AD: &c.

## P R O B L E M E IX.


*Retrancher d'un Triangle un Triangle égal à un Triangle donné.*

Plan-  
che 4.  
40. Fig.

Pour retrancher du Triangle ABC, un Triangle vers B, qui soit égal au Triangle donné BDE, faites au point D l'Angle BDF égal à l'angle ABC, par la ligne DF, qui sera terminée en F, par la droite EF, parallèle au côté BD, & prenez sur le côté BC, la partie BG égale à la ligne BF, & sur le côté AB, la partie BH, égale à la ligne BD, pour joindre la droite GH, qui retranchera le Triangle BGH égal au donné BDE.

[The text in this block is extremely faint and illegible, appearing as a series of horizontal lines and scattered characters across the page.]





## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les deux côtes  $BD$ ,  $DF$ , du Triangle  $BFD$ , sont aux deux côtes  $BH$ ,  $BG$ , du Triangle  $BGH$ , & l'angle compris  $BDF$  égal à l'angle compris  $HBC$ , *par constr.* il s'ensuit *par 4. 1.* que le Triangle  $BGH$  est égal au Triangle  $BFD$ , & par conséquent au Triangle  $BED$ , parce que *par 37. 1.* ces deux Triangles  $BED$ ,  $BFD$ , sont égaux entre eux, à cause des deux parallèles  $EF$ ,  $BD$ . Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E .

Ce Problème se peut résoudre autrement, parce que l'on peut trouver au dedans du Triangle proposé  $ABC$ , un autre Triangle que le Triangle  $BGH$ , qui soit égal au donné  $BED$ , savoir en tirant par le point  $H$ , la droite  $HI$ , parallèle à la ligne  $AG$ , & en joignant la droite  $AI$ , qui retranchera le Triangle  $AIB$  égal au Triangle  $BGH$ , & par conséquent au donné  $BED$ .

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les deux lignes  $AG$ ,  $HI$ , sont parallèles entre elles, *par constr.* les deux Triangles  $GIA$ ,  $GHA$ , seront égaux entre eux, *par 37. 1.* c'est pourquoy si de chacun on ôte le Triangle commun  $AKG$ , il restera les deux Triangles égaux  $AKH$ ,  $GKI$ , lesquels étant ajoutés au Trapeze  $BIKH$ , on connoitra que le Triangle  $ABI$  est égal au Triangle  $BGH$ . Ce qu'il falloit démontrer.

Ou bien ayant tiré des deux sommets  $C$ ,  $E$ , sur les bases  $AB$ ,  $BD$ , les perpendiculaires  $CG$ ,  $EF$ , cherchez aux trois ces lignes  $CG$ ,  $EF$ ,  $BD$ , une quatrième proportionnelle  $BH$ , *41. Fig.* & joignez la droite  $CH$ , qui retranchera le Triangle  $CHB$ , égal au donné  $BDE$ .

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les quatre lignes  $CG$ ,  $EF$ ,  $BD$ ,  $BH$ , sont proportionnelles, *par constr.* le Rectangle des deux extrêmes  $CG$ ,  $BH$ , sera, *par 16. 1.* égal au Rectangle des deux moyennes  $EF$ ,  $BD$ : c'est pourquoy les moitiés de ces deux Rectangles égaux, c'est à dire *par 41. 1.* les Triangles  $CHB$ ,  $BDE$ , sont aussi égaux. Ce qu'il falloit démontrer.

Ou bien prenez sur la perpendiculaire  $CG$ , la partie  $GI$  égale à la perpendiculaire  $EF$ , & tirez par le point  $I$ , la droite  $IK$  parallèle au côté  $AB$ , sur lequel vous prendrez la  
partie

# 38. TRAITE' DE GEOMETRIE. I. PARTIE.

partie BL égale à la base BD, & vous joindrez la droite KL, qui retranchera le Triangle LKB égal au donné BDE, parce que ces deux Triangles ont des bases égales, & des hauteurs aussi égales.

42. Fig. Ou bien encore ayant trouvé la ligne BH proportionnelle aux trois CG, EF, BD, & la ligne CL à discretion, tirez par le point H, à cette ligne CL, la parallèle HK, & joignez la droite KL, qui retranchera le Triangle LKB égal au Triangle BCH, & par conséquent au donné BDE.

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les deux lignes CL, KH, sont parallèles, par *constr.* les deux Triangles CKL, CHL, seront égaux entre eux, par 38. 1. c'est pourquoy si de chacun on ôte le Triangle CIL, il restera les deux Triangles égaux CIK, HIL, lesquels étant ajoutés séparément au Trapeze BHIK, on connoitra que le Triangle BKL est égal au Triangle ECH, qui est égal au donné BDE. Ce qu'il fallait démontrer.

Ce Problème se peut résoudre en plusieurs autres manieres, car on peut faire que le côté KL soit perpendiculaire au côté KB, par le moyen du Triangle BCH égal au donné BDE, comme il a été enseigné au *Probl.* 8. ou bien parallèle au côté AC, comme il a été enseigné au *Probl.* 7. & comme nous allons enseigner encore autrement dans le

## P R O B L E M E X.

*Retrancher d'un Triangle un Triangle égal à un Triangle donné, par une ligne droite parallèle à un côté donné.*

43. Fig. Pour retrancher du Triangle ABC, un Triangle égal au donné BDE, par une ligne parallèle au côté AB, cherchez entre ce côté AB & la perpendiculaire CG, une moyenne proportionnelle HI, & pareillement entre le côté BD, & la perpendiculaire EF une moyenne proportionnelle KL, & aux trois lignes HI, KL, AC une quatrième proportionnelle CM, pour avoir le point M, par lequel vous tirez au côté AB, la parallèle MN, qui retranchera le Triangle CMN égal au donné BDE.

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les quatre lignes HI, KL, AC, CM, sont proportionnelles, par *constr.* leurs Quarrés seront aussi proportionnels, par 22. 6. c'est pourquoy si à la place du Quarré HI,

HI, on met le Rectangle sous AB, CG, qui luy est égal, par 17. 6. à cause des trois proportionnelles AB, HI, CG, par constr. & à la place du Quarré KL, le Rectangle sous BD, EF, qui luy est pareillement égal, à cause des trois proportionnelles BD, KL, EF, & qu'enfin à la place des deux autres Quarrez AC, CM, on mette les Triangles semblables ABC, MNC, qui sont en même Raison, par 19. 6. on connoitra que le Rectangle de AB, CG, ou par 41. 1. le double du Triangle ABC, est au Rectangle de BD, EF, ou le double du Triangle BDE, comme le Triangle ABC, est au Triangle CMN. D'où il est aisé de conclure que ce Triangle CMN est égal au Triangle BDE. Ce qu'il falloit démontrer.

Plan-  
che 5.  
43. Fig.

## S C O L I E.

La pratique de ce Problème se peut abréger, parce que l'on peut se passer des deux moyennes proportionnelles HI, KL, comme vous allez voir. Ayant tiré de l'angle B, sur son côté opposé AC, la perpendiculaire BP; cherchez aux trois lignes BP, BD, EF, une quatrième proportionnelle CO, & entre les lignes AC, CO, la moyenne proportionnelle CM, & tirez comme auparavant, par le point M, au côté AB, la parallèle MN, qui retranchera le Triangle CMN égal au donné BDE.

## D E M O N S T R A T I O N.

En joignant la droite BO, on connoitra comme dans le Problème precedent, que le Triangle BOC est égal au donné BDE, & parce que les Triangles semblables ABC, MNC, sont entre eux comme les Quarrez de leurs côtés homologues AC, CM, par 19. 6. ou comme les lignes AC, CO, par Coroll. 20. 6. à cause des trois proportionnelles AC, CM, CO, par constr. ou comme le Triangle ABC, au Triangle BOC, par 1. 6. il s'ensuit que le Triangle MNC est égal au Triangle BOC, & par conséquent au Triangle BDE. Ce qu'il falloit démontrer.

## P R O B L E M E X I.

*Partager un Triangle isoscèle en quatre parties égales, par deux lignes droites perpendiculaires entre elles.*

Pour diviser le Triangle ABC, dont les deux côtés AC, BC, sont égaux, en quatre parties égales, par deux lignes droites qui se coupent à angles droits, divisez premièrement

44. Fig.

Plan-  
che 5.  
44. Fig.

# 34. TRAITE' DE GEOMETRIE. I. PARTIE.

la base AB, en deux également au point D, & menez la droite CD, qui divisera le Triangle ABC en deux Triangles rectangles égaux CDA, CDB. Après cela, décrivez du point D, par le point C, le quart de cercle CK E, & joignez la corde CE, que vous diviserez en deux également au point F, par lequel vous décrirez du point C, l'arc de cercle FG, qui donnera sur la perpendiculaire CD, le point G, par lequel vous tirerez à la base AB, la parallèle HI, la quelle avec la perpendiculaire CD, divisera le Triangle proposé ABC, en quatre parties égales, qui seront les deux Triangles rectangles CGH, CGI, & les deux Trapezoïdes ADGH, BDGI.

## DEMONSTRATION.

Parce que les deux côtez CD, DE, du Triangle rectangle CDE, sont égaux, *par constr.* on connoît que le quarré CE étant égal aux deux quarréz égaux CD, DE, *par 47. 1.* est double du quarré CD : & parce que CF est la moitié de CE, *par constr.* on connoît *par 20. 6.* que le quarré CE est quadruple du quarré CF, ou CG : & comme il a été démontré double du quarré CD, il s'ensuit que ce quarré CD est double du quarré CG ; c'est pourquoy *par 19. 6.* le Triangle ADC sera aussi double du Triangle semblable HGC : & pareillement le Triangle CDB sera double du Triangle CGI. D'où il est aisé de conclure, que les deux Triangles rectangles CGH, CGI, & les deux Trapezoïdes ADGH, BDGI, sont égaux entre eux, & qu'ainsi le Triangle proposé ABC se trouve divisé en quatre parties égales par les deux perpendiculaires CD, HI. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROBLEME XII.

*Trouver sur le côté donné d'un Triangle un point, duquel ce Triangle se puisse diviser en autant de parties égales qu'on voudra.*

45. Fig. **P**Our trouver sur le côté donné AC du Triangle ABC, un point duquel on puisse diviser le Triangle ABC en quatre parties égales par exemple, prenez la ligne AD égale à la quatrième partie du côté AC, & le point D sera celui qu'on cherche : car si l'on joint la droite BD, le Triangle ADB sera le quart du Triangle ABC, *par 1. 6.* c'est pourquoy le Triangle BDC sera égal aux trois quarts du même Triangle ABC, Ainsi il n'y aura qu'à diviser en trois également le Triangle BDC, *par Probl. 1.* sçavoir en divisant le côté BC en trois parties égales aux points E, F, & en joignant les droites DE, DF, & le

& le Triangle proposé se trouvera divisé en quatre parties égales par les trois lignes  $DE$ ,  $DE$ ,  $DE$ .

Plan-  
che 5.  
45. Fig.

## S C O L I E.

Si vous voulez que le point qu'on cherche, soit au dedans 46. Fig. du Triangle  $ABC$ , ayant pris comme auparavant; la ligne  $AD$  égale à la quatrième partie du côté  $AC$ , & pareillement la ligne  $AE$  égale à la quatrième partie du côté  $AB$ , parce qu'il est proposé de diviser le Triangle  $ABC$  en quatre parties égales, tirez par les points  $D$ ,  $E$ , aux deux côtés  $AB$ ,  $AC$ , les parallèles  $DF$ ,  $EG$ , dont le point de Section  $H$  sera celui qu'on cherche: de sorte que si l'on joint les droites  $HA$ ,  $HB$ ,  $HC$ , chacun des deux Triangles  $AHB$ ,  $AHC$ , sera le quart du proposé  $ABC$ , & le Triangle  $BHC$ , en sera par conséquent la moitié; ainsi il n'y aura qu'à le diviser en deux également par la droite  $BI$ , qui divise le côté  $BC$  en deux parties égales au point  $I$ , & le Problème sera résolu.

## C H A P I T R E II.

*De la Division des Quadrilatères.*

**L**ES Quadrilatères seront faciles à être divisés par celui qui aura bien compris la Division des Triangles; quoique la Division des Triangles dépende dans plusieurs rencontres de la Division des Quadrilatères, & principalement des Trapezoïdes; pour le moins quand on veut diviser un Triangle en plus de deux parties égales, comme vous pouvez avoir remarqué dans plusieurs Problèmes du Chapitre précédent.

## P R O B L E M E I.

*Diviser un Parallelogramme en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes parallèles à un côté donné.*

**P**OUR diviser le Parallelogramme  $ABCD$ , par exemple en trois parties égales, par des lignes parallèles au côté donné 47. Fig.  $AD$ , divisez l'autre côté  $AB$  en trois parties égales aux deux points  $E$ ,  $F$ , & tirez par ces deux points  $E$ ,  $F$ , au côté  $AD$ , les parallèles  $EG$ ,  $FH$ , qui diviseront le Parallelogramme proposé  $ABCD$  en trois Parallelogrammes égaux, comme il est évident par 36. 1.

## PROBLEME II.

*Diviser un Parallelogramme en quatre parties égales, par deux lignes droites paralleles à deux côtez.*

Plan-  
che 5.  
48. Fig.

**P**OUR diviser le Parallelogramme ABCD, en quatre parties égales par deux lignes paralleles aux deux côtez AB, AD, divisez les deux côtez oppoiez AD, BC, chacun en deux également aux points E, F, que vous joindrez par la droite EF, & pareillement les deux côtez oppoiez AB, CD, chacun en deux également aux points G, H, que vous joindrez par la droite GH, laquelle avec la precedente EF divisera le Parallelogramme proposé ABCD, en quatre Parallelogrammes égaux, dont la démonstration est trop évidente pour en parler davantage.

## S C O L I E.

49. Fig.

On peut aussi tres-facilement diviser le Parallelogramme ABCD en quatre parties égales, qui seront quatre Triangles isoscèles par les deux Diagonales AC, BD, qui le divisent en quatre Triangles égaux, comme l'on connoitra en tirant par le centre I, les deux lignes EF, GH, paralleles aux deux côtez AB, AD, où vous voyez qu'elles divisent le Parallelogramme proposé ABCD en quatre petits Parallelogrammes égaux, & que chacun de ces quatre Parallelogrammes est divisé en deux également par les Diagonales, par 34. 1. Vous voyez aussi qu'en cette façon le Parallelogramme proposé ABCD, se trouve partagé en huit parties égales, qui sont huit Triangles égaux ayant leur sommet commun au centre I. Ce qui fait voir que de ce centre I, on peut diviser un Parallelogramme en un nombre parement pair de parties égales tel que l'on voudra. Nous entendons pour *Nombre parement pair* celui qui se peut diviser exactement par 4.

## PROBLEME III.

*Diviser un Parallelogramme en un nombre pair de parties égales tel que l'on voudra, par des lignes droites tirées d'un angle donné.*

50. Fig.

**P**OUR diviser le Parallelogramme ABCD, par exemple en six parties égales, par des lignes droites tirées de l'angle C, tirez par cet angle C, la Diagonale AC, qui par 34. 1. divi-

divisera le Parallelogramme proposé ABCD en deux Triangles égaux ACB, ACD : ainsi il n'y a plus qu'à diviser par Probl. 1. Chap. 1. chacun de ces deux Triangles égaux en trois parties égales, sçavoir en divisant les côtes AB, AD, chacun en trois également aux points E, F, G, H, & en joignant les droites DE, DF, DG, DH, & le Problème sera résolu.

Plan-  
che 1.  
50. Fig.

S C O L E R.

Il est évident que si on laisse la Diagonale AC, & les deux lignes CF, CH, le Parallelogramme ABCD, se trouvera divisé en trois parties égales par les deux lignes CE, CG, qui partent de l'angle donné C : mais on les peut faire partir de quel qu'autre point donné sur un côté, comme vous allez voir dans le Problème suivant.

P R O B L E M E IV.

*Diviser un Parallelogramme en trois parties égales, par deux lignes droites tirées d'un point donné sur un côté.*

Pour diviser le Parallelogramme ABCD, en trois parties égales, par deux lignes droites tirées du point E donné sur le côté AB, divisez ce côté AB en trois également aux points F, G, par lesquels vous tirerez à l'autre côté AD, les parallèles FH, GI, que vous diviserez en deux également aux points K, L, par où vous tirerez du point donné E, les droites EM, EN, qui partageront le Parallelogramme ABCD en trois parties égales, qui sont le Triangle MEN, & les deux Trapezoïdes AEMD, BENC, de sorte que chacun de ces trois Plans sera égal à la troisième partie du Parallelogramme proposé ABCD.

1. Fig.

D E M O N S T R A T I O N.

Parce que les deux Triangles EFK, MHK, sont équilatéraux, & qu'ils ont un côté égal à un côté semblablement posé, sçavoir le côté KF égal au côté KH, par constr. ces deux Triangles seront égaux entre eux, par 26. 1. c'est pourquoy si on les ajoute séparément au Pentagone AFKMD, on connoitra que le Trapezoïde AEMD est égal au Parallelogramme AFHD, c'est à dire, par 1. 6. au tiers du Parallelogramme ABCD. On démontrera de la même façon que le Trapezoïde BENC est égal au Parallelogramme BCIG, ou au tiers du Parallelogramme ABCD, d'où il est aisé de conclure, que le

C ;

Trian,



Pien-  
che 5.  
51. Fig. Triangle MEN est aussi égal au tiers du même Parallelogramme ABCD. Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E

72. Fig. Il est évident que lorsque la ligne BE sera la troisième partie du côté AB, il n'y a qu'à tirer la ligne EF, parallèle au côté BC, pour avoir le Parallelogramme EBCF égal au tiers du proposé ABCD, par 1. 6. D'où il suit que le Parallelogramme AEFD en est les deux tiers, c'est pourquoy si l'on tire la Diagonale ED, qui par 34. 1. le divisera en deux également, le Parallelogramme proposé ABCD se trouvera divisé en trois parties égales par les deux lignes EF, ED.

73. Fig. Il est évident aussi, que lorsque le point donné E sera précisément au milieu du côté AB, on en pourra aisément diviser le Parallelogramme proposé ABCD, en quatre parties égales, en tirant comme auparavant, au côté AD, ou BC, la parallèle EF, pour avoir les deux Parallelogrammes égaux AEFD, EBCF, que l'on divisera en deux également par les Diagonales ED, EC, &c.

## P R O B L E M E V.

*Diviser un Parallelogramme en quatre parties égales, par des lignes droites tirées d'un point au dedans du Parallelogramme.*

74. Fig. Pour diviser le Parallelogramme ABCD, en quatre parties égales, en tirant des lignes droites d'un point que nous trouverons sur la Diagonale BE, divisez le côté AD en deux également au point E, & cherchez entre ce côté AD, & la moitié AE, une moyenne proportionnelle AF, pour tirer du point F, au côté AB, la parallèle EGH, qui donnera sur la Diagonale BD, le point G, duquel tirant au côté AD, la parallèle GI, le Parallelogramme ABCD, se trouvera divisé en quatre parties égales, qui seront les deux Triangles BIG, BHG, & les deux Trapezoïdes AIGD, DGHC, de sorte que chacun de ces quatre Plans sera le quart du Parallelogramme ABCD.

## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que par const. les trois lignes AE, AF, AD, sont proportionnelles, le carré de la moyenne AF, ou GI son égale, sera, par 17. 6. égal au Rectangle des deux Extrêmes AE, AD, c'est à dire par 1. 6. au double du Carré AD, à cause

cause de la hauteur AD double de la base AE, *par constr.* & parce que *par 19. 6.* le Triangle ABD est à son semblable IBG, comme le Carré AD est au Carré IG, moitié du Carré AD, le Triangle BIG sera aussi la moitié du Triangle ABD, moitié du Parallélogramme ABCD, *par 34. 1.* D'où il suit que le Trapezoïde AIGD, & le Triangle GIB, & aussi son égal GHB, sont chacun le quart du Parallélogramme ABCD, & que par conséquent le Trapezoïde GHCD est aussi le quart du même Parallélogramme ABCD. *Ce qu'il falloit démontrer.*

Plan-  
che 5.  
54. Fig.

## PROBLEME VI.

*Diviser un Parallélogramme en deux parties égales par une ligne droite tirée d'un point donné en dedans.*

Pour diviser en deux également le Parallélogramme ABCD, *55. Fig.* en tirant une ligne droite par le point E donné en dedans, tirez par le point E la droite FG, parallèle au côté AD, ou BC, & ayant fait FH égale à FB, & EI égale à EF, cherchez aux trois lignes GI, IE, AH, une quatrième proportionnelle FK, pour avoir le point K, par lequel & par le point donné E, vous tirerez la droite KL, qui divisera en deux également le Parallélogramme proposé ABCD, parce qu'elle retranche de chaque côté les deux lignes égales BK, DL, comme nous allons démontrer.

## DEMONSTRATION.

Parce que les quatre lignes GI, IE, AH, FK, sont proportionnelles, *par constr.* on connoitra en composant, que les quatre GE, IE, AH + FK, FK, sont proportionnelles: & si à la place des deux premiers termes GE, IE, on met les deux LG, FK, qui sont en même Raison, *par 4. 6.* à cause de la similitude des Triangles équiangles GEL, FEK, on connoitra que la Raison des deux lignes LG, FK, est égale à celle des deux AH + FK, FK, & que par conséquent la ligne LG, ou DG - DL, ou AF - DL, est égale à AH + FK, ou AF - FH + FK, ou AF - BK, à cause de FB égale à FH, *par constr.* & que les deux Trapezoïdes AKLD, BKLC, ayant tous les angles & tous les côtés égaux, les uns aux autres, sont égaux entre eux, & qu'ainsi la ligne KL divise en deux également le Parallélogramme proposé ABCD. *Ce qu'il falloit démontrer.*

## PROBLEME VII.

*Diviser un Trapezoïde en autant de parties égales qu'on voudra.*

Plan-  
che 6.  
56 Fig.

Pour diviser le Trapezoïde ABCD, par exemple en trois parties égales, divisez chacun des deux côtes parallèles AB, CD, en trois également aux points E, F, G, H, & joignez les droites EG, FH, qui diviseront le Trapezoïde proposé ABCD en trois Trapezoïdes AEGD, EFHG, FBCH, qui sont égaux, comme l'on connoitra en tirant les Diagonales AG, EH, FC, qui feront connoître que tous ces Trapezoïdes sont composez de Triangles égaux, les uns aux autres par 38. 1.

## L E M M E.



















*La ligne AB étant coupée en C, la couper derechef au point D, entre B & C, en sorte que les trois Quarrez AC, AD, AB, soient en proportion arithmétique.*

57. Fig.

Pour trouver le point D entre B & C, en sorte que les trois Quarrez AC, AD, AB, soient en Proportion arithmétique, c'est à dire tels que la somme des deux extremes AB, AC, soit double du moyen AD; ayant élevé sur AB la perpendiculaire BE égale à AC, & ayant divisé la ligne AE en deux également au point F, tirez de ce point F, la ligne FG perpendiculaire & égale à la ligne AF moitié de AE, & faites AD égale à AG, & les trois quarrez AC, AD, AB, seront en proportion arithmétique.

## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que le Quarré AE est, par 47. 1. égal à la somme des Quarrez AB, BE, ou AC, le Quarré AF de la moitié de AE, sera par 20. 6. le quart de la somme des deux Quarrez AB, AC; & parce que le quarré AG ou AD est par 47. 1. double du quarré AF, parce qu'il est égal à la somme des deux égaux AF, FG, ce même Quarré AD sera la moitié de la somme des Quarrez AC, AD, & ainsi les trois Quarrez AC, AD, AB, seront en Proportion arithmétique: Ce qu'il falloit démontrer.





## PROBLEME VIII.

*Diviser un Trapezoïde isoscèle en quatre parties égales, par deux lignes perpendiculaires entre elles.*

Nous appellons *Trapezoïde isoscèle* celui dont les deux côtés qui ne sont pas parallèles, sont égaux entre eux, comme ABCD, dont les deux côtés AD, BC, sont supposés égaux & non parallèles. Pour le diviser en quatre parties égales par deux lignes perpendiculaires entre elles, prolongez les deux côtés égaux AD, BC, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en un point, comme E, & ayant divisé l'un des deux côtés parallèles AB, CD, comme AB, en deux également au point H, menez la droite EH, qui divisera aussi en deux également au point F, l'autre côté CD, & sera perpendiculaire à chacun de ces deux côtés AB, CD, à cause des deux Triangles isoscèles ABE, CDE, qu'elle partage aussi en deux également, aussi bien que le Trapeze proposé ABCD. Enfin coupez par Lem. prec. la ligne EH, qui est déjà coupée en F, au point G, en sorte que les trois Quarrés BF, EG, EH, soient en Proportion arithmétique, & tirez par le point G la droite IK perpendiculaire à la ligne FH, & ces deux perpendiculaires IK, FH, diviseront le Trapezoïde proposé ABCD en quatre parties égales, qui sont les quatre Trapezoïdes AHGI, BHGK, IGFD, KGFC.

## DEMONSTRATION.

Parce que les trois quarrés EF, EG, EH, sont en proportion arithmétique, par constr. il est aisé de conclure par 19. 6. que les trois Triangles isoscèles ABE, IKE, DCE, sont aussi en Proportion arithmétique, c'est à dire que la somme des deux Triangles ABE, CDE, est double du Triangle IKE, c'est pourquoy si de chaque côté on ôte le double du Triangle CDE, on connoitra que le Trapezoïde ABCD est double du Trapezoïde IKCD, & que par conséquent ce Trapezoïde IKCD est égal au Trapezoïde ABKI; & comme chacun de ces deux Trapezoïdes est divisé en deux également par la ligne FH, par Probl. 7. il s'ensuit que les quatre Trapezoïdes AHGI, BHGK, IGFD, KGFC, sont égaux entre eux. Ce qu'il falloit démontrer.

RTIE.

X.

égales ; par une  
égales.

pide ABCD, par  
olongez le côté  
en E, en sorte  
CD, & menez  
tant prolongée  
quelque point,  
ligne BF en  
quite AG, qui  
posé ABCD,  
de ce Trape-

C, on connol-  
allele, à la ligne  
des AE, DC,  
des AFC, ADC,  
de chacun on ôte le  
le AID égal au  
deux Triangles  
pezoïde ABCD  
1. le Triangle  
de la base BG,  
la moitié du  
montrer.

par une ligne,  
base.

des deux côtés  
pezoïde ABCD.  
duquel il faille  
égales, ayant pris  
Drez par le point  
ayant divisé la  
la droite EH,  
en deux parties  
BEHC.

Da-

## D E M O N S T R A T I O N .

Si l'on joint les droites EG, FG, EC, on connoitra par 37. 1. que parce que les deux lignes AG, FD, sont parallèles, par *constr.* les deux Triangles ADG, AFG, sont égaux entre eux, c'est pourquoy si de chacun on ôte le Triangle commun AIG, il restera le Triangle AIF égal au Triangle DIG, dont chacun étant ajouté séparément au Trapeze AIGE, fait connoître que le Trapezoïde ADGE est égal au Triangle EGF, & par conséquent au Triangle ECB son égal, par 38. 1. à cause des deux bases égales EB, EF, par *constr.* & parce que les deux Triangles GEH, CEH, sont aussi égaux entre eux, par 38. 1. à cause de leurs bases égales GH, CH, par *constr.* il est aisé de conclure que tout le Trapezoïde AEHD est égal à tout le Trapezoïde BEHC. Ce qu'il falloit démontrer.

## P R O B L E M E X I .

*Diviser un Trapeze en deux également, par une ligne droite tirée d'un angle donné.*

Pour diviser le Trapeze ABCD en deux parties égales par une ligne droite tirée de l'angle D, divisez la Diagonale AC opposée à l'angle donné D, en deux également au point E, par où vous tirerez à l'autre Diagonale BD la parallèle EF, & joignez la droite DE, qui partagera le Trapeze proposé ABCD en deux parties égales, qui sont le Triangle ADE, & le Trapeze BCDE. 61. Fig.

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que les deux lignes EA, EC, sont égales, par *constr.* les deux Triangles EDA, EDC seront égaux entre eux, aussi-bien que les deux EBA, EBC, par 38. 1. ce qui fait que les deux Trapezes ADEB, CDEB sont aussi égaux entre eux, & à cause du Trapeze ADEB égal au Triangle ADE, & du Trapeze CDEB, égal au Trapeze BCDE, parce les deux Triangles DIE, BIE, sont égaux entre eux, comme l'on connoitra en ôtant le Triangle DIB, des deux Triangles DEB, DEB, qui sont égaux, par 37. 1. à cause des deux parallèles BD, EF, par *constr.* il s'ensuit que le Triangle ADE est égal au Trapeze BCDE. Ce qu'il falloit démontrer. Voyez le Probl. 19.



## S C O L I E.

On voit par cette Figure , que l'on peut aisément diviser un Trapeze en deux également par deux lignes droites tirées de deux angles oppoſez donnez, comme ſi l'on donne les deux angles B, D, on diviſera en deux également, au point E, la Diagonale AC, qui paſſe par les deux autres angles A & C, & l'on joindra les droites EB, ED, qui diviſeront le Trapeze propoſé ABCD en deux parties égales, qui ſont les deux Trapezes ABED, BCDE, parce que par 38. 1. les deux Triangles EBA, EBC, ſont égaux entre eux, auſſi bien que les deux EDA, EDC.

## L E M M E.

*Etant donné le Triangle ABC rectangle en A, trouver ſur le côté AB prolongé le point D, duquel tirant à l'autre côté AC, la parallele DE, terminée en E, par l'hypotenuse BC prolongée; le Trapeze ACED ſoit égal au Carré de la ligne donnée AF.*

52. Fig. SI à la ligne AC, à la ligne AF, & au double AG de la ligne AF, on trouve une quatrième proportionnelle AH, & qu'entre AB, & la ſomme BH des deux AB, AH, on trouve une moyenne proportionnelle BD, on aura le point D, qu'on cherche: de ſorte que ſi de ce point D on tire au côté AC, la parallele DE rencontrant l'hypotenuse BC prolongée en E, le Trapezoïde ACED ſera égal au Carré de la ligne donnée AF.

## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que les Triangles rectangles ABC, DBE, ſont équiangles, à cauſe des deux paralleles AC, DE, par conſtr. ils ſont entre eux comme les Carrez de leurs côtés homologues AB, DB, par 19. 6. c'eſt pourquoy ſi au lieu du Carré DB, on met le Rectangle ſous AB, BH, qui luy eſt égal, par 17. 6. à cauſe des trois proportionnelles AB, BD, BH, par conſtr. on connoitra que le Triangle ABC, eſt au Triangle DBE, comme le Carré AB, eſt au Rectangle ſous AB, BH, ou par 1. 6. comme la baſe AB, à la baſe BH, à cauſe de la hauteur commune AB: & par conſequence de Raiſon, le Triangle ABC, eſt au Trapeze ACED, comme AB, eſt à AH; & ſi aux deux derniers termes AB, AH, conſidérez comme des baſes, on donne la hauteur commune AC,

on connoitra par 1. 6. que le Triangle ABC est au Trapezoïde ACED, comme le Rectangle sous AB, AC, est au Rectangle sous AH, AC, c'est à dire au double du Quarré AF, à cause des quatre proportionnelles AC, AF, 2AF, AH, par constr. où l'on void que le premier antecédent, sçavoir le Triangle ABC étant par 41. 1. la moitié du second antecédent, qui est le Rectangle sous AB, AC, aussi le premier conséquent, sçavoir le Trapezoïde ACED, est égal à la moitié du second conséquent, qui est le double du Quarré AF, & par conséquent égal au Quarré AF. Ce qu'il falloit démontrer. Voyez Probl. 19.

Plan-  
che 6.  
62. Fig.

## PROBLEME XII.

*Diviser un Trapeze qui a deux angles égaux, en deux également par une ligne perpendiculaire au côté d'entre les deux angles égaux.*

Pour diviser en deux parties égales le Trapeze ABCD, 63. Fig dont les deux angles A, & B, sont égaux, par une ligne droite perpendiculaire au côté interjacent AB, prolongez les deux AB, CD, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en F, & les deux AD, BC, jusqu'à ce qu'ils se coupent en E, & alors le Triangle AEB sera isoscèle, par 6. 1. à cause des deux angles égaux A, B. par supp. c'est pourquoy si l'on tire de l'angle E, sur son côté opposé AB, la perpendiculaire EG, les deux Triangles rectangles AGE, BGE, seront égaux entre eux. D'où il est aisé de conclure, que le Trapeze AGHD est plus grand que le Trapeze BGHC, à cause du Triangle DEH moindre que le Triangle CEH, de tout le Triangle CEL, en supposant la Base HL, égale à la base HB, & par consequent le Triangle HEL égal au Triangle HED, par 38. 1. C'est pourquoy si l'on réduit la moitié du Triangle CEL en Quarré, & qu'à ce Quarré on fasse le Trapeze égal GHKI, par Lem. prec. la perpendiculaire IK divisera le Trapeze proposé ABCD en deux également. Ce qu'il falloit faire.

## PROBLEME XIII.

*Diviser un Trapezoïde en deux également par une ligne droite perpendiculaire aux deux côtés parallèles.*

Pour diviser le Trapezoïde ABFE en deux parties égales, par une ligne droite perpendiculaire aux deux côtés parallèles AB, EF, tirez des deux points E, F, les lignes EH, FK, par 3

Plan-  
che 4.  
36. Fig.

Plan-  
che 4.  
36. Fig.

perpendiculaires à la base AB, & prenez sur cette base AB, la partie AO égale à la quatrième partie de la somme d'une fois BK, de deux fois HK, & de trois fois AH, pour avoir le point O, d'où vous éleverez sur AB, la perpendiculaire OD, qui divisera en deux également le Trapezoïde proposé ABFE, de sorte que l'aire du Trapezoïde AODE sera précisément la moitié de celle du Trapezoïde ABFE.

#### D E M O N S T R A T I O N .

Si l'on met  $a$  pour AH,  $b$  pour HK,  $c$  pour BK, &  $p$  pour la hauteur commune DO, ou HE, ou KF, on aura  $\frac{1}{2}c + \frac{1}{2}b + \frac{3}{4}a$  pour AO,  $\frac{1}{4}c + \frac{1}{2}b - \frac{1}{4}a$  pour HO, & l'aire du Triangle AHE sera  $\frac{1}{2}ap$ , celle du Rectangle HODE sera  $\frac{1}{2}cp + \frac{1}{2}bp - \frac{1}{2}ap$ , celle du Rectangle HKFE sera  $bp$ , & celle du Triangle BKF sera  $\frac{1}{2}cp$ , tellement que l'aire du Trapezoïde ABFE sera  $\frac{1}{2}ap + bp + \frac{1}{2}cp$ , & celle du Trapezoïde AODE sera  $\frac{1}{2}ap + \frac{1}{2}bp + \frac{1}{2}cp$ , laquelle est bien la moitié de celle du Trapezoïde ABFE. Ce qu'il falloit démontrer.

#### P R O B L E M E XIV.

*Diviser un Trapeze en deux parties égales, par une ligne droite tirée d'un point donné sur un côté.*

Plan-  
che 6.  
64. Fig.

Pour diviser en deux également le Trapeze ABCD ; par une ligne droite tirée du point E donné sur le côté AB, joignez les droites DE, DB, & tirez à sa Diagonale DB, par le point C, la parallèle CF, qui coupe icy le côté AB prolongé au point F, par où & par le point D, vous tirerez la droite DF, qui fera le Triangle ADF égal au Trapeze proposé ABCD, à cause des deux Triangles égaux BOE, COD, comme l'on connoîtra en ôtant des deux Triangles DCB, DFB, qui sont égaux par 37. 1. à cause des deux parallèles BD, CF, par constr. le Triangle commun BOD. C'est pourquoy si l'on divise la base AF en deux également au point G, & qu'on mène la droite DG, le Triangle ADG sera par 1. 6. la moitié du Triangle ADF, ou du Trapeze ABCD. Enfin tirez par le point G, la droite GH parallèle à la droite DE. & joignez la ligne EH, qui partagera le Trapeze proposé ABCD en deux parties égales, qui sont les deux Trapezes AEHD, BEHC, de sorte que le

le premier de ces deux Plans, ſçavoir AEHD, ſera la moitié du Trapeze ABCD, qu'égal au Triangle ADG.

Plan-  
che 6.  
64. Fig.

## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que les deux Lignes DE, GH, ſont parallèles, *par conſtr.* les deux Triangles GDH, GEH, ſeront égaux entre eux, *par 38. 1.* c'eſt pourquoy ſi de chacun on ôte le Triangle commun GHI, il reſtera le Triangle DHI égal au Triangle GIE, dont chacun étant ajouté ſeparément au Trapeze AEID, on aura le Trapeze AEHD, égal au Triangle ADG, & par conſequent à la moitié du Trapeze propoſé ABCD. Ce qu'il falloit démonſtrer.

## S C O L I E.

Il ne ſera pas beſoin de reduire en Triangle le Trapeze propoſé ABCD, lorſque le point E ſera donné au milieu du côté AB, parce qu'on le peut diviſer autrement en deux parties égales par une ligne droite tirée de ce point de milieu E, comme vous allez voir.

65. Fig.

Ayant joint la droite CE, & ayant tiré de l'angle D, la ligne DF parallèle au côté AB, diviſez cette ligne DF en deux également au point G, par lequel vous tirerez à la ligne CE, la parallèle GH, qui donnera ſur le côté CD le point H, par lequel & par le point donné E, vous tirerez la droite EH, qui diviſera le Trapeze propoſé ABCD en deux parties égales: qui ſont les deux Trapezes AEHD, BEHC.

## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que les deux Trapezoides AEGD, BEGD, ſont égaux entre eux, *par Probl. 7.* & que les deux Triangles GCD, GCE, ſont auſſi égaux entre eux, *par 38. 1.* il ſ'enſuit que le Pentagone AEGCD eſt égal au Trapeze BEGC: & parce que les deux Triangles EIG, CIH, ſont encore égaux entre eux, comme l'on connoitra en ôtant des deux Triangles EGC, EHC, qui ſont égaux entre eux, *par 38. 1.* à cauſe des deux parallèles CE, GH, le Triangle commun EIC, il ſ'enſuit que le Trapeze AEHD eſt égal au Trapeze BEHC. Ce qu'il falloit démonſtrer.

On bien tirez des deux extremités A, B, du côté AB les droi-  
tes AF, BG, perpendiculaires au côté CD, & cherchez à la ſomme de ces deux perpendiculaires AF, BG, à la perpendiculaire BG, & au côté CD, une quatrième proportionnelle DH, pour avoir ſur le côté CD le point H, par lequel & par le point donné E, on tirera la droite EH, qui diviſera le Trapeze propoſé ABCD en deux parties égales, qui ſont les deux Trapezes AEHD, BEHC.

65. Fig.

Plan.  
che 6.  
66. Fig.

## DEMONSTRATION.

Parce que les quatre lignes  $AF+BG$ ,  $BG$ ,  $CD$ ,  $DH$ , sont proportionnelles, *par constr.* on connoitra *par conversion de Raison*, que les quatre  $AF$ ,  $BG$ ,  $CH$ ,  $DH$ , sont aussi proportionnelles, & *par 16. 6.* que le Rectangle des deux extrêmes  $AF$ ,  $DH$ , ou *par 41. 1.* le double du Triangle  $AHD$ , est égal au Rectangle des deux moyennes  $BG$ ,  $CH$ , ou au double du Triangle  $BHC$ , & que par conséquent les deux Triangles  $AHD$ ,  $BHC$ , sont égaux, auxquels si l'on ajoute les deux Triangles  $AHE$ ,  $BHE$  qui sont aussi égaux *par 38. 1.* à cause des deux bases égales  $AE$ ,  $BE$ , *par supp.* on connoitra que les deux Trapezes  $AEHD$ ,  $BEH$ , sont égaux entre eux. *Ce qu'il falloit démontrer.*

65. Fig. Ou bien encore si l'on veut reduire en Triangle le Trapeze proposé  $ABCD$ , on trouvera sur le côté  $CD$  prolongé, qui est opposé au point donné  $E$ , la base de ce Triangle, dont le sommet sera au point donné  $E$ , en tirant du point  $A$  une parallele à la ligne  $ED$ , & pareillement du point  $B$  une parallele à la ligne  $EC$ , & en divisant cette base en deux également au point  $H$ , &c.

## L E M M E.

*Reduire un Trapeze donné en un Trapezoïde.*

67. Fig. Pour reduire le Trapeze  $ABCD$  en un Trapezoïde, tirez du point  $A$  au côté  $BC$  la parallele  $AE$ , & du point  $D$ , à la Diagonale  $AC$ , la parallele  $DE$ , & par le point  $E$ , où ces deux paralleles  $AE$ ,  $DE$ , s'entre-coupent, tirez au point  $C$ , la droite  $CE$ , & le Trapezoïde  $ABCE$  sera égal au Trapeze proposé  $ABCD$ .

## DEMONSTRATION.

Parce que les deux lignes  $AC$ ,  $DE$ , sont paralleles, *par constr.* les deux Triangles  $ADC$ ,  $AEC$ , sont égaux entre eux, *par 38. 1.* c'est pourquoy si de chacun on ôte le commun  $AEC$ , il restera le Triangle  $EFA$  égal au Triangle  $CFD$ , & si l'on ajoute chacun de ces deux Triangles égaux au Trapeze  $ABCF$ , on connoitra que le Trapeze proposé  $ABCD$  est égal au Trapezoïde  $ABCE$ . *Ce qu'il falloit démontrer.*

A cause que l'on change icy deux côtez, cette resolution quoique bonne, comme vous venez de voir par sa démonstration, n'est pas propre pour nôtre dessein: c'est pourquoy nous en donnerons icy une autre, où l'on ne changera qu'un côté.

Pour donc changer le Trapeze ABCD en Trapezoïde, (sans 2. Fig. changer le côté AB, ni la position des deux AD, BC, prolongez ces deux côtez AD, BC, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en un point, comme E, & coupez le côté AB en F, en sorte que le côté BE soit au côté AE, comme le Rectangle des lignes EC, ED, au carré EF, ce qui est facile, pour avoir le point F, par lequel tirant la ligne FG parallèle au côté AD, on aura le Trapezoïde ABGF égal au Trapeze proposé ABCD.

## D E M O N S T R A T I O N .

Si l'on joint les droïtes FC, DG, on connoïtra premièrement que le Triangle ECD est égal au Triangle EGF, & par conséquent le Triangle CIG au Triangle DIF, en raisonnant de la sorte.

Parce que la ligne BE est à la ligne AE, comme le Rectangle des lignes EC, ED, est au Carré EF, *par constr.* si à la place des deux premiers termes BE, AE, on met les deux EG, EF, qui sont en même Raison, *par 4. 6.* à cause des deux parallèles AB, FG, *par constr.* on connoïtra que la Raison des deux lignes EG, EF, est égale à celle du Rectangle sous les lignes EC, ED, au Carré EF, & en donnant aux deux premiers termes EG, EF, la ligne EF, pour hauteur commune, on connoïtra *par 1. 6.* que la Raison du Rectangle sous les lignes EF, EG, au Carré EF, est la même que celle du Rectangle sous les lignes EC, ED, au même Carré EF, & que par conséquent le Rectangle des lignes EF, EG, est égal au Rectangle des lignes EC, ED. C'est pourquoy *par 16. 6.* les quatre lignes EC, EF, EG, ED, seront proportionnelles, & *par 15. 6.* les deux Triangles ECD, EFG, seront égaux entre eux, desquels ôtant le Trapeze commun EGID, il restera le Triangle CIG égal au Triangle DIF, & si à chacun de ces deux Triangles égaux on ajoute séparément le Pentagone ABCIF, on connoïtra que le Trapeze proposé ABCD est égal au Trapezoïde ABGF. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROBLEME XV.

*Diviser un Trapezoïde en deux parties égales, par une ligne droite parallele aux côtez paralleles.*

Plan-  
che 6.  
68. Fig.

Pour diviser en deux également le Trapezoïde ABGF, par une ligne droite parallele aux deux côtez paralleles AB, GF, prolongez les deux autres côtez AF, BG, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en un point, comme E, & coupez le côté AE en O, en sorte que le Quarré EO soit égal à la moitié de la somme des deux Quarrez AE, EF, pour avoir le point O, par lequel on tirera à la base AB, la parallele OH, qui divisera en deux également le Trapezoïde proposé ABGF.

## DEMONSTRATION.

Parce que la somme des deux Quarrez AE, EF, est double du Quarré EO, par constr. les trois Quarrez AE, EO, EF, seront en proportion arithmetique, aussi-bien que les trois Triangles semblables ABE, OHE, EGE, par 19. 6. c'est pourquoy l'excès du premier sur le second, sçavoir le Trapezoïde ABHO, sera égal à l'excès du second sur le troisiéme, ou au Trapezoïde OHGE. Ce qu'il falloit démontrer.

## COROLLAIRE.

On tire de ce Problème la maniere de diviser en deux également un Trapeze, comme ABCD, par une ligne droite parallele à un côté, comme au côté AB, sçavoir en décrivant par Lem. prec. sur ce côté AB le Trapezoïde ABGF égal au Trapeze proposé ABCD, & en achevant le reste comme il vient d'être enseigné. Mais cette Division se peut faire autrement & plus facilement, comme nous allons enseigner dans le

## PROBLEME XVI.

*Diviser un Trapeze en deux également, par une ligne droite parallele à un côté donné.*

69. Fig. 1

Pour diviser en deux également le Trapeze ABCD, par une ligne droite parallele au côté AD, prolongez les deux autres côtez AB, CD, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en un point, comme E, & ayant tiré de l'angle C, la droite CF paral-

parallele à la Diagonale BD, divisez la ligne AF en deux également au point G, & cherchez entre les deux lignes AE, EG, une moyenne proportionnelle EH, pour avoir le point H, par lequel tirant au côté AD, la parallele HI, elle divisera le Trapeze proposé ABCD en deux parties égales. Planché 6.  
69. Fig.

D E M O N S T R A T I O N .

En joignant les droites DE, DG, on connoitra comme dans le Probl. 14. que le Triangle ADF est égal au Trapeze ABCD, & par 1. 6. que le Triangle ADG est la moitié du Triangle ADF, ou du Trapeze ABCD, à cause de la base AG moitié de la base AF, *par constr.* & parce que les trois lignes AE, EH, EG, sont proportionnelles, *par constr.* on connoitra *par Corol.* 20. 6. que la premiere AE, est à la troisieme EG, comme le Quarré de la premiere AE, au Quarré de la seconde EH, ou par 19. 6. comme le Triangle AED, à son semblable HEI, à cause des deux paralleles AD, HI, *par constr.* & comme la Raison des deux memes lignes AE, EG, est aussi égale à celle des deux Triangles AED, GED, il s'ensuit que le Triangle AED est au Triangle GED, comme le même Triangle AED, est au Triangle HEI, & que par conséquent les deux Triangles GED, HEI, sont égaux entre eux: c'est pourquoy si de chacun on ôte le Triangle commun BCE, il restera le Trapeze BCDG égal au Trapeze BCHI, & si de chacun de ces deux Plans égaux on ôte le Pentagone commun BCIOG, il restera le Triangle DOI égal au Triangle GOH, dont chacun enfin étant ajouté au Trapeze ADOH, on connoitra que le Trapeze AHID est égal au Triangle ADG, ou à la moitié du Trapeze proposé ABCD, lequel ainsi est divisé en deux également par la droite HI. Ce qu'il falloit démontrer. Voyez Probl. 19.

S C O L I E.

On démontrera de la même façon, que si l'on fait la ligne AG égale à la troisieme partie de la ligne AF, le Trapeze AHID sera égal à la troisieme partie du proposé ABCD. C'est pourquoy si l'on divise en deux également le Trapeze BCHI, par la ligne KL parallele au côté HI, le Trapeze proposé ABCD se trouvera divisé en trois parties égales par les deux lignes droites HI, KL, paralleles entre elles & au côté AD. 70. Fig.

Il est évident par 38. 1. qu'à cause du Triangle ADF égal au Trapeze ABCD, si l'on divise la base AF en trois parties égales aux points G, H, & que de l'angle opposé D, on tire à ces deux points G, H, les droites DG, DH, le Trapeze ABCD, se trouvera divisé en trois parties égales par les deux lignes DG, DH, tirées du même angle D. 71. Fig.



52 TRAITÉ DE GEOMETRIE. I. PARTIE.

Plan- Il est évident aussi que si l'on prolonge les deux lignes che 6. DG, CF, jusqu'à ce qu'elles se coupent en un point, com- 72. Fig. me H, & qu'on divise en deux également toute la ligne GH par la droite BI, le Trapeze ABCD se trouvera divisé en trois parties égales par les deux lignes DG, BI, tirées des deux angles D, B, à cause du Triangle ADG, égal au tiers du Triangle ADF, ou du Trapeze ABCD, & du Triangle GBI égal à la moitié du Triangle GBH, ou du Trapeze GBCD, qui est égal aux deux tiers du proposé ABCD, &c.

73. Fig. Enfin il est évident, que si l'on prend la ligne AG égale à la quatrième partie de la ligne AF, & la ligne GI égale au quart de la ligne GH, & qu'on divise le Trapeze BCDI en deux également par la droite CO, le Trapeze proposé ABCD se trouvera divisé en quatre parties égales par les trois lignes BI, CO, DG, tirées des trois angles B, C, D.


## PROBLEME XVII.

*Diviser un Trapeze en trois parties égales, par des lignes droites tirées de deux points donnez sur un côté.*

Plan- Pour diviser le Trapeze ABCD. en trois parties égales che 7. par deux lignes droites tirées des deux points E, F, 74. Fig. donnez sur le côté AB, tirez de l'angle opposé C, à la Diagonale BD, la parallèle CG, & par le point G, où elle coupe le côté AB, tirez à l'autre angle opposé D, la droite DG, qui fera le Triangle ADG égal au Trapeze ABCD, par Probl. 14. C'est pourquoy si l'on divise en trois parties égales aux points H, I, la base AG, & qu'on mène les droites DH, DI, on connoitra par 1. 6. que chacun des trois Triangles ADH, HDI, IDG, est le tiers du Triangle ADG, ou du Trapeze proposé ABCD. Tirez par le point H la droite HK parallèle à la ligne DE, & par le point I, la droite IL parallèle à la ligne DF, & joignez les droites EK, EL, qui diviseront le Trapeze proposé ABCD en trois parties égales, qui sont les trois Trapezes AK, EL, FC, de sorte que chacun de ces trois Plans sera égal au tiers du Trapeze ABCD.

### DÉMONSTRATION.

Parce que les deux lignes DE, HK, sont parallèles par constr. les deux Triangles HDK, HEK, seront égaux entre eux, par 38. 1. C'est pourquoy si de chacun on ôte le Triangle commun HOK, il restera le Triangle DOK égal au Tri-  
gle





gle EOH, & si à chacun de ces deux Triangles égaux on <sup>Plan 7.</sup> ajoute le Trapeze AEOD, on connoitra que le Trapeze AEKD est égal au Triangle ADH, c'est à dire au tiers <sup>74 Fig.</sup> du Trapeze ABCD. On démontrera de la même façon, que le Trapeze AFLD est égal au Triangle correspondant ADI, c'est à dire aux deux tiers du Trapeze ABCD. D'où il est aisé de conclure, que chacun des deux Trapezes EL, FC, est le tiers du même Trapeze ABCD. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROBLEME XVIII.

*Diviser un Trapezoïde en autant de parties égales qu'on voudra par des lignes parallèles à l'un des deux côtés, qui ne sont pas parallèles.*

Pour diviser le Trapezoïde ABCD, par exemple en trois <sup>75. Fig.</sup> parties égales, par des lignes parallèles au côté AD, divisez l'autre côté opposé BC en deux également au point E, & tirez par ce point E, à la base AB, la parallèle EF, que vous diviserez en trois parties égales aux points G, H, par lesquels & par le point E, vous tirerez au côté AD, les trois parallèles IK, LM, NO, qui diviseront le Trapezoïde proposé ABCD en trois parties égales, qui sont les deux Parallélogrammes AK, IM, & le Trapezoïde LC, de sorte que chacun de ces trois Plans fera le tiers du Trapezoïde ABCD.

## DEMONSTRATION.

Parce que les deux Triangles BEN, CEO, sont équiangles, & qu'ils ont le côté EB, égal au côté EC, par constr. ils seront égaux entre eux, par 26. 1. D'où il est aisé de conclure, que le Trapezoïde BCML est égal au Parallélogramme MLNO, & tout le Trapezoïde ABCD égal à tout le Parallélogramme ANOD: & comme chacun des trois Parallélogrammes AK, IM, LO, est le tiers du Parallélogramme total AO, ils seront aussi le tiers du Trapezoïde proposé ABCD. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROBLEME XIX.

*Diviser un Trapeze en deux parties, dont la Raison soit donnée.*

Plan-  
che 7.  
76. Fig.

Pour diviser le Trapeze ABCD, en deux parties, dont la Raison soit égale à celle des deux lignes données AH, HB, ayant tiré des deux angles A, C, les droites AE, CF, perpendiculaires à la Diagonale BD, cherchez à la somme des deux lignes données AH, HB, à la somme des deux perpendiculaires AE, CF, & à la ligne AH, une quatrième proportionnelle AG, & aux trois AE, AG, AB, une quatrième proportionnelle AI, pour avoir le point I, par lequel & par le point D, vous tirerez la droite DI, qui divisera le Trapeze proposé ABCD en deux parties ADI, BCDI, dont la Raison sera égale à celle des deux lignes données AH, HB.

## DEMONSTRATION.

Parce que, par 1. 6. le Triangle ADI est au Triangle ADB, comme la base AI est à la base AB, ou par constr. comme AG, à AE: & de même parce que le Triangle ADB est au Triangle CDB, comme la hauteur AE, est à la hauteur CF, & qu'en composant, le Trapeze ABCD est au Triangle ADB, comme la somme des hauteurs AE, CF, à la hauteur AE, le Trapeze ABCD sera au Triangle ADI, comme la somme des hauteurs AE, CF, à la ligne AG, ou par constr. comme AB à AH, & en divisant le Trapeze BCDI sera au Triangle ADI, comme BH est à AH. Ce qu'il falloit démontrer,

## COROLLAIRE.

On tire de ce Problème une methode differente de celle du Probl. 11. pour diviser en deux également un Trapeze par une ligne droite tirée d'un angle donné, comme si l'on donne l'angle D, on divisera son côté opposé AB en deux également au point H, & on achèvera le reste comme il vient d'être enseigné.

77. Fig. Si l'on vouloit diviser le Trapeze ABCD en trois parties égales autrement que par le Scolie du Probl. 16. il faudroit faire AH égale au tiers du côté opposé AB, pour avoir le Triangle ADI égal au tiers du Trapeze ABCD: & diviser de la même façon le Trapeze BCDI en deux également par la droite DK, &c.

## PROBLEME XX.

*Retrancher d'un Trapeze donné une figure égale à une figure donnée.*

SI l'on réduit en Triangle la figure donnée, & aussi en Triangle le Trapeze proposé ABCD, & que de ce Triangle on retranche un Triangle ADI égal à la figure donnée, par Probl. 76. Fig. 9. Chap. 1. le Problème sera résolu.

Ou bien on cherchera la Raison qui est entre le Trapeze ABCD, & la figure donnée, ce qui est facile, & par le moyen du Problème précédent on divisera le Trapeze ABCD selon cette Raison.

## CHAPITRE III.

*De la Division des Polygones.*

LA Division des Polygones sera facile par celle des Figures de trois & de quatre côtes, parce qu'un Polygone se peut aisément réduire en un Quadrilatere, & en un Triangle, comme vous allez voir dans ce

## L E M M E.

*Réduire un Polygone proposé en Triangle.*

Pour réduire en Triangle le Pentagone ABCDE, en sorte qu'un des angles de ce Triangle soit par exemple en D, tirez de ce point D au point A, la Diagonale AD, & luy tirez par le point E, la parallèle EF, qui rencontre icy le côté AB au point F, par lequel & par le point donné D, vous tirez la droite DF, qui fera le Quadrilatere BCDF égal au Pentagone proposé ABCDE, à cause des deux Triangles égaux AKF, DKE, comme l'on connoîtra en ôtant le Triangle AKD de chacun des deux Triangles AED, AFD, qui sont égaux entre eux, par 37. 1. à cause des deux parallèles AD, EF. Il ne reste donc plus qu'à réduire en Triangle le Trapeze BCDF, ce qui se fera en tirant à sa Diagonale BD, par l'angle C, le plus proche, la parallèle CG, & en joignant la droite DG, car ainsi à cause de l'égalité des deux Triangles CLD, BLG, on aura le Triangle FDG égal au Quadrilatere BCDF, & par conséquent au Pentagone proposé ABCDE. Ce qu'il falloit faire.

Plan-  
che 7.  
78. Fig.

## TRAITE' DE GEOMETRIE. I. PARTIE.

Par là vous voyez que l'on peut aisément reduire en Triangle tel Polygone que l'on voudra, parce qu'on le peut toujours reduire en une Figure qui ait un côté de moins, & cette nouvelle Figure en une autre qui ait aussi un côté de moins, & continuer ainsi à diminuer le nombre des côtés jusqu'à ce que l'on soit parvenu au Triangle. Comme dans cet exemple, de la Figure de cinq côtés ABCDE, nous en avons fait la Figure de quatre côtés BCDF, & de celle-cy la Figure de trois côtés, ou le Triangle FDG.

### PROBLEME I.

*Diviser un Polygone donné en trois parties égales, par deux lignes droites tirées d'un angle donné.*

78. Fig. **P**our diviser le Pentagone ABCDE en trois parties égales, par deux lignes tirées de l'angle donné D, reduisez par le moyen du Lemme precedent, le Polygone proposé ABCDE au Triangle FDG, qui ait son sommet au point donné D, & ayant divisé la base FG en trois parties égales aux points H, I, menez du point donné D, par les deux points H, I, les droites DH, DI, qui diviseront le Pentagone proposé ABCDE en trois parties égales, qui sont le Triangle HDI, & les deux Trapezes AEDH, BCDI, de sorte que chacun de ces trois Plans sera égal à la troisième partie du Polygone proposé ABCDE,

### DEMONSTRATION.

Il est évident par 1. 6. que chacun des trois Triangles FDH, HDI, IDG, est le tiers du Triangle FDG, parce que leurs bases FH, HI, IG, sont chacune la troisième partie de la base FG, par constr. c'est pourquoy chacun de ces mêmes Triangles FDH, HDI, IDG, sera aussi le tiers du Polygone proposé ABCDE: & comme le Trapeze AEDH est égal au Triangle FDH, à cause du Triangle AKF égal au Triangle DKE, comme nous avons reconnu au Lem. prec. & que pareillement le Trapeze BCDI est égal au Triangle IDG, à cause du Triangle BLG égal au Triangle CLD, il s'ensuit que le Polygone proposé ABCDE est divisé en trois parties égales par les deux lignes DH, DI. Ce qu'il falloit démontrer.

### S C O L I E.

79. Fig. Lorsqu'un Polygone a deux côtés parallèles, comme l'Hexagone ABCDEF, dont les deux côtés AB, DE, sont parallèles, on le pourra diviser en trois parties égales, & mêmes en davan-

davantage si l'on veut, en le reduisant au Quadrilatere ABHG, qui sera un Trapezoïde, dont par consequent on pourra faire la division par Probl. 7. Chap. 2. sçavoir en divisant chacun des deux côtez paralleles AB, GH, en trois parties égales aux points L, M, I, K, & en joignant les droites LK, MI, qui diviseront l'Exagone proposé ABCDEF en trois parties égales, qui sont le Trapezoïde LMIK, & les deux Pentagones ALKEF, BCDIM, qui sont égaux aux deux Trapezoïdes ALKG, BMIH, à cause du Triangle AOF égal au Triangle GOE, & du Triangle BNC égal au Triangle DNH, &c.

Si l'un des deux points K, I, nommé I, tombe au dehors du côté DE, le Trapezoïde LMIK, quoy qu'égal à une troisième partie de l'Exagone ABCDEF, ne pourra pas être pris pour l'une des trois parties qu'on cherche. Dans ce cas il faudra tirer par le point I, à la ligne MD, la parallele IP, qui donnera sur le côté CD, le point P, par lequel & par le point M, on tirera la droite MP, & au lieu du Trapezoïde LMIK, on prendra le Pentagone LMPDK, qui luy est égal à cause des deux Triangles égaux MRP, DRI, comme l'on connoitra en ôtant le Triangle DRM, des deux Triangles DIM, DPM, qui sont égaux, par 37. 1. à cause des deux paralleles MD, PI, par constr.

## PROBLEME II.

*Diviser un Polygone donné en autant de parties égales qu'on voudra, par des lignes droites tirées d'un angle donné.*

Pour diviser le Pentagone ABCDE, par exemple en quatre parties égales, par des lignes droites tirées de l'angle donné D, reducez ce Polygone au Triangle FDG, dont le sommet est au point donné D, & ayant divisé la base FG en quatre parties égales aux points H, I, K, menez les droites DH, DI, DK qui feront les quatre Triangles FDH, HDI, IDK, KDG, dont chacun sera par 1. 6. la quatrième partie du Triangle FDG, & par consequent du Pentagone proposé ABCDE, mais comme le point H tombe icy au dehors du côté AB, il faudra changer le Triangle HDI au Trapeze ALDI, quel'on trouvera en tirant la droite HL parallele à la ligne AD, &c.



PROBLEME III.

*Diviser un Polygone donné en deux également , par des lignes droites paralleles à ses côtez.*

Plan-  
che 7.  
82. Fig.

POUR diviser le Pentagone ABCDE en deux parties égales , par des lignes droites paralleles aux trois côtez BC, CD, DE, reduisez ce Pentagone en Triangles, par les Diagonales AC, AD, & divisez par Probl. 7. Chap. 2. l'un de ces Triangles , comme ABC , en deux également par la droite FG parallele au côté BC , en sorte que le Triangle AFG soit égal au Trapeze FBCG , & alors si l'on tire par le point G , la droite GH parallele au côté CD , & par le point H , la droite HI parallele au côté DE , on connoitra par 19. 6. que le Triangle AGH est aussi égal au Trapeze GCHD , & pareillement le Triangle AHI au Trapeze HDEI , & qu'ainsi le Problème se trouve résolu.

S C O L I E.

83. Fig.

Au lieu de prendre l'angle A , pour reduire le Polygone proposé en Triangles , on peut prendre tel autre point qu'on voudra au dedans de la Figure , comme F , après quoy il ne faut que regarder la Figure pour comprendre le reste par ce qui a été fait auparavant , & de concevoir que par cette maniere on peut diviser le Polygone proposé en autant de parties égales qu'on voudra , & que cette même maniere se peut aussi appliquer aux Figures de trois & de quatre côtez.

PROBLEME IV.

*Diviser un Polygone donné en deux également par une ligne droite tirée du milieu de l'un de ses côtez.*

84. Fig.

POUR diviser en deux également le Pentagone ABCDE , par une ligne droite tirée du point N milieu du côté AB , il faut auparavant reduire le Polygone proposé en un Triangle qui ait le même côté AB , & le même Angle A , ce qui se peut faire par les principes du Lem. prec. comme vous allez voir.

Ayant tiré par l'angle C , à la Diagonale BD , la parallele CF , qui rencontre icy en F , le côté DE prolongé , menez la droite BF , & le Pentagone ABCDE se trouvera changé au Quadrilatere ABFE , qu'on reduira en Triangle , si l'on tire par

par le point E, à la Diagonale AF, la parallèle EG, qui rencontre icy le côté BF prolongé en G, & qu'on joigne la droite AG, car le Triangle AGB sera égal au Trapeze proposé ABCDE : mais comme il n'a pas le même angle A, on tirera par le point F, à la Diagonale BE, la parallèle FH, ou bien par le point G, au côté AB, la parallèle GH, qui rencontre icy le côté AE prolongé au point H, par lequel on tirera au point B, la droite HB, & le Triangle AHB sera celui qu'on cherche, & par 1. 6. il sera divisé en deux également par la droite HN, qui coupe le côté DE au point I.

Cette preparation étant faite, tirez du point H, la droite HL perpendiculaire au côté DE, & du point N, la droite NK perpendiculaire au même côté DE, & cherchez aux trois lignes NK, HL, IE, une quatrième proportionnelle IM, pour joindre la droite MN, qui divisera en deux également le Pentagone proposé ABCDE, de sorte que le Trapeze AEMN sera la moitié de ce Polygone.

## D E M O N S T R A T I O N.

Parce que les quatre lignes NK, HL, IE, IM, sont proportionnelles, par constr. le Rectangle des deux extrêmes NK, IM, sera égal au Rectangle des deux moyennes HL, IE, par 16. 6. c'est pourquoy les moitez de ces deux Rectangles, qui par 41. 1. sont les deux Triangles IMN, IEH, seront égaux entre eux, à chacun desquels ajoutant le Trapeze commun AEIN, on connoitra que le Trapeze AEMN est égal au Triangle AHN, ou à la moitié du Pentagone ABCDE. Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E.

Le Problème sera aisé à résoudre, lorsque le Polygone 34. Fig. donné sera regulier : car s'il est *Impair*, c'est à dire composé d'un nombre impair de côtez, comme le Pentagone ABCDE, il n'y a qu'à tirer du point donné N, à l'angle opposé D, la droite DN, qui divisera le Pentagone proposé ABCDE, en deux parties égales, chacune étant composée d'un nombre égal d'angles & de côtez égaux les uns aux autres. Mais si le Polygone donné est *Pair*, c'est à dire composé d'un nombre pair de côtez, comme l'Exagone ABCDEF, il est évident 35. Fig. qu'il n'y a qu'à tirer du milieu N du côté AB, par le milieu M du côté opposé & parallèle DE, la droite MN, &c.

## PROBLEME V.

*Diviser en deux également un Polygone donné, par une ligne droite parallèle à un côté donné.*

Plan-  
che 8.  
87. Fig.

Pour diviser le Pentagone ABCDE en deux parties égales, par une ligne droite parallèle au côté AE, réduisez le Polygone donné au Triangle FDG, ce qui se fait icy par les deux lignes EF, CG, parallèles aux deux Diagonales DA, DB, & ayant divisé en deux également au point H, la base FG, joignez la droite DH, pour avoir le Triangle FDH égal à la moitié du Triangle FDG, par 1. 6. ou du Polygone proposé ABCDE. Tirez du point D, la droite DI parallèle au côté donné AE, & ayant prolongé les côtés AB, DE, jusqu'à ce qu'ils se coupent en un point, comme K, cherchez entre les lignes KH, KI une moyenne proportionnelle KL, & tirez par le point L, au côté donné AE, la parallèle LM, qui divisera le Pentagone proposé ABCDE, en deux parties égales, qui sont le Trapeze ALME, & le Pentagone BCDML, de sorte que l'un de ces deux Plans, comme le Trapeze ALME fera la moitié du Pentagone ABCDE.

## DEMONSTRATION.

Parce que les deux Triangles KDI, KML, sont équiangles, à cause des deux bases parallèles DI, LM, par constr. le Triangle KML, sera au Triangle KDI, comme le Carré du côté KL, au Carré du côté homologue KI, par 19. 6. ou comme la ligne KH, à la ligne KI, par Coroll. 20. 6. à cause des trois proportionnelles KH, KL, KI, par constr. ou bien encore comme le Triangle KDH, au Triangle KDI. D'où il suit que le Triangle KML est égal au Triangle KDH, & par conséquent le Triangle DOM égal au Triangle LOH, & le Trapeze ALME, égal au Trapeze AHDE, ou au Triangle FDH, c'est à dire à la moitié du Polygone proposé ABCDE, Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E.


Plan-  
che 7.  
85. Fig.

Il est évident que lorsque le Polygone proposé sera un Polygone régulier, composé d'un nombre pair de côtés, comme l'Exagone ABCDEF, on le divisera en deux également par une ligne parallèle au côté AB, en tirant par les deux angles diamétralement opposés, & également éloignés du côté donné AB, sçavoir F, C, la droite FC, qui se trouvera paral-

lele



1840  
1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000



lele au côté AB, & perpendiculaire à la ligne MN, qui passant <sup>Plan-</sup> par les milieux M, N, des deux côtés oppoſez & parallèles <sup>che 72</sup> DE, AB, diviſe auſſi en deux également l'Éragont ABCDE, <sup>85. Fig.</sup> lequel en cette façon ſe trouve diviſé en quatre parties égales par les deux perpendiculaires MN, FC.

Il ſera auſſi facile de diviſer un Polygone regulier compoſé d'un nombre impair de côtés en quatre parties égales par deux <sup>84. Fig.</sup> lignes perpendiculaires entre elles, comme le Pentagone ABCDE, ſçavoir en le diviſant premièrement en deux parties égales par la ligne DN, qui eſt perpendiculaire au côté AB, comme il a été enſigné au *Probl. 4* & encore en deux également par la ligne FG parallèle au même côté AB, comme il vient d'être enſigné, &c.

## PROBLEME VI.

*Diviſer un Polygone en deux également, par une ligne droite tirée d'un point donné ſur un côté.*

Pour diviſer en deux parties égales le Pentagone ABCDE, <sup>Plan-</sup> par une ligne droite tirée du point F donné ſur le côté AB, <sup>che 8.</sup> après l'avoir réduit au Triangle GDH par les lignes EG, CH, <sup>89. Fig.</sup> parallèles aux deux Diagonales DA, DB, diviſez la baſe GH en deux également au point I, & tirez par ce point I, à la ligne DF, la parallèle IK : pour avoir ſur le côté CD le point K, par lequel & par le point donné F, vous tirerez la droite FK, qui diviſera le Polygone propoſé ABCDE, en deux parties égales, qui ſont le Pentagone AFKDE, & le Trapeze BCKF, de ſorte que chacun de ces deux Plans ſera la moitié du Pentagone ABCDE.

## DEMONSTRATION.

Parce que la baſe GI du Triangle GDI eſt la moitié de la baſe GH du Triangle GDH, le Triangle GDI ſera *par 1.* la moitié du Triangle GDH, ou du Pentagone ABCDE : & parce que le Pentagone AFKDE eſt égal au Triangle GDI, à cauſe de la ligne EG parallèle à la Diagonale DA, *par conſtr.* & qui fait que les Triangles GLA, DLE, ſont égaux entre eux : & de la ligne IK parallèle à la Diagonale DF, ce qui rend pareillement égaux les deux Triangles FOI, DOK ; il ſ'enſuit que le même Pentagone AFKDE eſt auſſi la moitié du propoſé ABCDE. Ce qu'il falloit démonſtrer.

Planch.  
cher 8.  
96. Fig.

## S C O L I E.

Il est évident que pour diviser le Polygone proposé ABCDE en trois parties égales, on doit prendre la base GI, égale au tiers de la base GH, car ainsi le Pentagone AFKDE sera le tiers du proposé ABCDE, & par conséquent le Trapeze BCKF en sera les deux tiers: c'est pourquoy si l'on reduit ce Trapeze BCKF au Triangle FKN, par la ligne CN parallèle à la Diagonale KB, & qu'on divise la Base FN en deux également au point M, en joignant la droite KM, le Polygone proposé ABCDE se trouvera divisé en trois parties égales par les deux lignes KF, KM, parce que la ligne KM divise le Trapeze BCKF en deux également, puisque par 1. 6, le Triangle FKM est égal à la moitié du Triangle FKN, gal au Trapeze BCKF.

99. Fig.

Il est évident aussi que pour diviser en deux également un Polygone regulier composé d'un nombre pair de côtez, comme l'Exagone ABCDEF, par une ligne droite tirée du point G donné sur le côté AB, il n'y a qu'à prendre sur le côté opposé & parallèle DE, la partie DH égale à la partie AG, & joindre la droite GH, qui divisera l'Exagone proposé ABCDEF en deux parties égales, qui sont les deux Pentagones AGHEF, BGHDC, que l'on peut par le moyen du Probl. 4. diviser chacun en deux également par une ligne droite tirée du milieu O du côté commun GH, lequel milieu O est le centre de l'Exagone, pour avoir ainsi le Polygone divisé en quatre parties égales par des lignes droites tirées de son centre. Mais cette division se peut faire plus facilement en cette sorte.

Pour diviser en deux également le Pentagone BGHDC, prenez sur les côtez BC, CD, les deux lignes BK, CI, égales chacune à la ligne AG, ou DH, ou bien les deux parties CK, DI, égales chacune à la partie BG, ou EH, & tirez les droites OI, OK, qui diviseront le Pentagone BGHDC en trois parties égales: c'est pourquoy pour le diviser en deux également, il n'y a qu'à diviser en deux également celle du milieu, c'est à dire le Trapeze KOIC, en le reduisant au Triangle KOL, par la ligne IL parallèle à la Diagonale OC, & en divisant la base KL en deux également au point M, pour joindre la droite OM, qui étant prolongée vers N divisera chacun des deux Pentagones AGHEF, BGHDC, en deux parties égales, & ainsi l'Exagone proposé ABCDEF se trouvera divisé en quatre parties égales par des lignes droites qui se coupent au centre O.

## PROBLEME VII.

*Diviser un Polygone en trois parties égales, par deux lignes droites tirées de deux points donnez sur un côté.*

Pour diviser en trois parties égales le Pentagone ABCDE, <sup>Plan- che II. 91. Fig.</sup> par deux lignes droites tirées des deux points K, M, donnez sur le côté AB, on le reduira au Triangle HDI, par les deux lignes EH, CI, paralleles aux deux Diagonales DA, DB, & ayant pris la ligne HL égale à la troisiéme partie de la base HI, on tirera par le point L, à la ligne DK, la parallele LF, & par le point F au point donné K, la droite KF, qui retranchera le Pentagone AKFDE, égal au Triangle HDL, ou à la troisiéme partie du Polygone proposé ABCDE, comme il a été démontré au Probl. 6. il ne reste donc plus qu'à diviser le Trapeze BKFC en deux également, par une ligne droite tirée de l'autre point donné M, & qui se fera de la même façon, comme vous allez voir. Ayant réduit le Trapeze BKFC au Triangle KFO, par la ligne CO parallele à la Diagonale DB, divisez la base KO en deux également au point N, & ayant tiré par le point N la droite NG parallele à la ligne FM, menez la droite MG, qui retranchera le Trapeze KFGM égal au Triangle KFN, ou à la moitié du Trapeze KFCB, à cause du Triangle FPG égal au Triangle MPN. D'où il suit que chacun des deux Trapezes KFGM, MAGB, est le tiers du Polygone proposé ABCDE, & qu'ainsi ce Polygone se trouve divisé en trois parties égales, par les lignes KF, MG, tirées des deux points donnez K, M. Ce qu'il falloit faire.

## PROBLEME VIII.

*Diviser un Pentagone regulier en trois parties égales, par autant de lignes droites tirées de son centre.*

Pour diviser en trois parties égales le Pentagone regulier ABCDE, <sup>91. Fig.</sup> par trois lignes droites tirées de son centre F, prenez sur chacun des deux côtés BC, AE, leurs troisiémes parties AG, BH, & menez les droites FD, FG, FH, qui diviseront le Pentagone proposé ABCDE en trois parties égales, comme l'on connoitra en divisant tous les côtés du Pentagone en trois également, & en tirant du centre F par tous les points de division, & aussi par tous les angles du Pentagone, autant de lignes droites, qui formeront quinze petits Triangles égaux,



égaux par 38. 1. dont chacun des trois Plans termine par les trois lignes FD, FG, FH, en comprendra cinq.

### PROBLEME IX.

*Diviser un Polygone en deux parties, dont la Raison soit donnée, par une ligne droite tirée d'un angle donné.*

93. Fig.

Pour diviser le Pentagone ABCDE en deux parties, dont la Raison soit égale à celle des deux lignes données AF, FG, par une ligne droite tirée de l'angle donné D; réduisez le Polygone proposé au Triangle HDI, dont le sommet soit à l'angle donné D, & ayant coupé la base HI en K, en sorte que les quatre lignes AG, AF, HI, HK, soient proportionnelles, menez la droite DK, qui divisera le Polygone proposé ABCDE en deux parties AKDE, BKDC, proportionnelles aux deux lignes données AF, FG.

### DEMONSTRATION.

Parce que les quatre lignes AG, AF, HI, HK, sont proportionnelles, par constr. on connoitra en divisant que les quatre FG, AF, KI, KH, sont aussi proportionnelles: c'est pourquoy si à la place des deux dernières KI, KH, on met les deux Triangles KDI, KDH, qui sont en même Raison, par 1. 6. ou bien si à la place de ces deux Triangles on met les deux Trapezes BKDC, AKDE, qui leur sont égaux, à cause du Triangle BMI égal au Triangle CMD, & du Triangle ALH égal au Triangle DLE, on connoitra que la Raison des deux lignes FG, AF, est égale à celle des deux Trapezes BKDC, AKDE. Ce qu'il falloit démontrer.

SECON.



## SECONDE PARTIE

## DE LA LONGIMÉTRIE.

**L**A Longimétrie est ainsi appelée, parce qu'elle enseigne à mesurer sur la terre les longueurs, ou les lignes droites, qui peuvent être *Accessibles* & *Inaccessibles*, *Horizontales*, *Verticales*, & *Inclinées*: les *Accessibles* étant celles, dont on peut approcher par l'une de leurs extrémités, comme la largeur d'une Rivière: les *Inaccessibles*, celles dont les extrémités ne peuvent être vues que de loin, telle qu'est ordinairement la distance de deux Bastions: les *Horizontales*, celles qui sont couchées sur le Plan de l'Horizon, comme celle qu'on imagineroit dans une Plaine: les *Verticales*, celles qui sont élevées à plomb, ou abaissées au dessous de l'Horizon, comme les hauteurs & les profondeurs, qui peuvent aussi être accessibles & inaccessibles: & les *Inclinées*, celles qui sont penchantes, ou élevées à angles obliques & inégaux sur le Plan de l'Horizon, comme le penchant d'une colline.

Toutes ces lignes se peuvent mesurer en deux manières, sçavoir par le calcul, ou sans le calcul. Quand on les veut mesurer par le calcul, le moyen qui me semble le meilleur, est de le faire par la Trigonométrie en mesurant les angles visuels par le moyen du *Demi-cercle*, ou *Graphométrie*, dont nous avons parlé dans notre *Introduction aux Mathématiques*, & qui est assez commun, sans qu'il soit besoin d'en parler icy davantage; ainsi je me contenteray de vous en donner icy la figure, où vous voyez que la ligne BC qui passe par le centre A de l'Instrument, est celle que nous avons appelée *Ligne de foy*, qui sert pour montrer les degrez des angles visuels sur le bord de l'Instrument, & à laquelle répondent les fentes des deux Pinnules D, E, élevées à angles droits sur l'*Alidade*, ou *Regle Mobile* BC, par lesquelles on vise les objets éloignez, pour mesurer la quantité des angles visuels.

Ou bien on se servira de l'*Instrument Universel*, où les degrez du *Demi-cercle* sont aussi marquez. Mais quand on veut mesurer une Ligne sans calcul, on n'a que faire de

connoître les angles visuels, que l'on ne peut jamais sçavoir au vray, ce qui fait qu'en travaillant par les angles : on manque toujours un peu, & il est dangereux de manquer beaucoup, quand les angles visuels sont bien aigus, ou bien obtus. Dans ce cas il est tres-avantageux de se servir de l'*Instrument Universel*, qui est un Cadre rectangulaire de Metal, ou de quelqu'autre matière solide, comme ABCD, dans lequel on y peut mettre & ôter quand on veut, une ou plusieurs piéces de Carton, pour y travailler dessus, en y tirant avec une pointe de lignes droites qui représentent les Rayons visuels, le long de la Ligne de foy EO de l'Alidade FO, qui est mobile non-seulement autour de son centre O, mais encore le long de la ligne OH, que nous appellerons *Ligne de conduite*, au dessous de laquelle il y a deux *Pimules*, ou Visières semblables aux deux E, G, de l'Alidade EO, dont la Ligne de foy contient un certain nombre de parties égales & semblables à celle de la Ligne de conduite OH, lesquelles représentent des Pieds, des Toises, &c. Comme nous avons publié autrefois un Traité particulier touchant la construction & l'usage de l'*Instrument Universel*, je ne m'arrêteray pas ici en parler davantage; je diray seulement que cet instrument contient sur ses trois côtez AD, CD, BC, les degrez du Demi-cercle, dont le centre I est environ au milieu de la Ligne de conduite OH, sur lequel on avance le centre O de l'Alidade, quand on veut mesurer les angles visuels.


## P R O B L E M E I.


*Mesurer une ligne horizontale accessible par ses deux extremittez.*


Quoique la ligne horizontale AB soit accessible par chacune de ses deux extremittez A & B, je suppose néanmoins qu'on ne puisse pas la parcourir, à cause de quelque precipice qui seroit entre les deux extremittez A & B, ou pour quelqu'autre empêchement, comme s'il y avoit de l'eau entre-deux, ou quelqu'autre chose qui empêchât de la pouvoir mesurer actuellement avec un cordeau, ou avec une chaîne. Dans ce cas on en pourra connoître la longueur en cette sorte.


Ayant planté sur terre un piquet en un point commode, comme C, duquel on puisse mesurer les deux lignes CA, CB, prolongez ces deux lignes CA, CB, en D & en E, en sorte que la ligne CD soit égale à l'une des deux CA, CB, comme à la ligne CA, & l'autre ligne CE à l'autre ligne CB, & mesurez la longueur de la ligne DE, qui par 4. 1. sera égale à celle de la proposée AB.

On









Ou bien ayant planté un piquet au point F pris à discretion sur le terrain, mesurez avec une chaîne la longueur de la ligne AF, & avec un Graphometre la quantité de l'angle BAF, & faites au point B, avec le même Graphometre l'angle ABG, qui soit le reste à 180 de degrez de l'angle BAF, par la ligne BG, qui par 28. 1. sera parallèle à la ligne AF: c'est pourquoy si on la fait égale à la ligne AF, & qu'on mesure la longueur de la ligne FG, on aura celle de la proposée AB, par 33. 1.

Plan-  
che 8.  
95. Fig.

PROBLEME II.

*Mesurer une Ligne horizontale accessible seulement par l'une de ses deux extremittez.*

Pour mesurer la ligne AB, que je suppose accessible vers A, plantez en ligne droite un piquet en un point commode sur terre, comme en C, & un autre en quelqu'autre lieu commode, comme en D, en sorte que la distance CD des deux points C, D, qu'on appelle *Points de station*, soit d'une longueur considerable par rapport à la ligne BC qu'on veut mesurer, car si cette ligne CD étoit bien petite à l'égard de la ligne AB, ou BC qu'on cherche, l'angle BDC deviendrait si grand, qu'une petite erreur que l'on commettrait en le mesurant, en pourroit causer une considerable dans la mesure de la ligne BC. Ayant donc mesuré avec un cordeau la ligne CD, que nous supposérans de 125 pieds, & avec un Graphometre ou autrement chacun des deux angles BCD, BDC, leur somme étant ôtée de 180 de degrez, donnera l'angle CBD, par 32. 1. Comme si l'angle C est de 73 de degrez, & l'angle D de 58 de degrez, le troisième angle CBD se trouvera de 49 de degrez. C'est pourquoy dans le Triangle BCD, connoissant les angles & le côté CD, on pourra connoître par la Trigonometrie le côté BC, en faisant cette Analogie;

Plan-  
che 10.  
97. Fig.

Comme le Sinus de l'angle B,	75471
A son costé opposé CD;	125
Ainsi le Sinus de l'angle D,	84895
A son costé opposé BC.	149

qui se trouvera d'environ 149 pieds; d'où ôtant la longueur de la ligne AC, qui soit par exemple de 51 pieds, le reste donnera 98 pieds pour la quantité de la ligne proposée AB.



Plan-  
che 10.  
97. Fig.

## S C O L I E.

Quand vous n'aurez point de Tables de Sinus, vous pourrez recourir le grand Triangle BCD, & luy en faire un semblable sur le papier en cette sorte. Tirez à part la ligne GI de 125 parties égales prises sur une échelle, pour les 125 pieds de la ligne CD, & faites à son extrémité G, l'angle IGH égal à l'angle BCD, & à son extrémité I, l'angle GIH égal à l'angle CDB, pour avoir le petit Triangle GHI semblable au grand BCD, de sorte que le côté GH représentera la ligne BC, c'est pourquoy si l'on porte ce côté GH sur la même échelle avec un Compas, le nombre des parties égales qui se trouveront comprises entre les pointes du Compas, donnera le nombre des pieds de la ligne proposée BC.

Comme il est libre de faire au point C tel angle qu'on voudra, on y pourra faire un angle de 60 degrez par la ligne CD, sur laquelle on choisira un point, comme D, en sorte que l'angle BDC soit aussi de 60 degrez, & alors il arrivera que l'angle CBD sera pareillement de 60 degrez, & que par 6. 1. le Triangle BCD sera équilateral; ainsi il n'y aura qu'à mesurer avec un cordeau la longueur de la ligne CD, pour avoir celle de la proposée BC.

Ou bien on fera au point C un angle droit par la ligne CF, sur laquelle on choisira un point, comme F, en sorte que l'angle CFB soit demi-droit ou de 45 degrez, auquel cas l'angle CBF sera aussi de 45 degrez, par 32. 1. & par 6. 1. le Triangle rectangle BCF sera isoscèle, ainsi en mesurant avec un cordeau la longueur de la ligne CF, on aura celle de la proposée BC.

Si le terrain ne vous permet pas d'aller en F, cherchez sur la même ligne CF le point E, en sorte que l'angle CEB soit de 60 degrez, & alors la ligne EB sera double de la ligne EC, par Prop. 5. Chap. 3. L. 1. Trigon. C'est pourquoy si l'on mesure avec un cordeau la ligne EC, son double donnera la ligne EB, dont le quarré étant diminué du quarré EC, le reste sera le quarré BC; par 47. 1. & la Racine quarrée de ce reste donnera par conséquent la ligne BC qu'on cherche.

Enfin s'il n'est pas commode de faire au point C, avec la ligne BC, un angle de 60, ni de 90 degrez, on le fera tel que l'on voudra, comme de 73 degrez, en sorte que l'angle BCD soit de 73 degrez, & alors on cherchera sur la ligne CD, un point, comme D, en sorte que l'angle CDB soit de 53. 30', sçavoir le complement de la moitié du precedent BCD, car il est aisé à démontrer que dans ce cas la ligne CD sera égale à la proposée BC, & qu'ainsi en mesurant avec un cordeau la ligne CD, on aura la ligne BC qu'on demande.

Mais

Mais la ligne proposée AB, se peut trouver immédiatement, <sup>Plan-</sup> en faisant à son extrémité A, l'angle BAD d'une grandeur vo- <sup>che 10.</sup> lontaire, par la ligne AD d'une longueur aussi volontaire, <sup>97. Fig.</sup> & en mesurant l'angle ADB, pour faire dans le Triangle ADB, où l'on connoît outre les angles, le côté AD, cette Analogie,

*Comme le Sinus de l'angle B,  
A son côté opposé AD;  
Ainsi le Sinus de l'angle D,  
A son côté opposé AB.*

## PROBLEME III.

*Mesurer une ligne Horizontale inaccessible.*

Pour mesurer la ligne inaccessible AB, plantez deux pi- <sup>98. Fig.</sup>quets aux deux points C, D, pris à discretion sur le terrain; en sorte que, si cela se peut, l'un de ces deux points, comme C, soit en ligne droite avec la Ligne à mesurer AB, & ayant connu avec un cordeau la ligne CD, qui doit être d'une longueur raisonnable & proportionnée à la Ligne à mesurer AB, & avec un Graphometre les angles C, CDA, ADB, ôtez de 180 degrez la somme des deux C, CDA, pour avoir l'angle CAD, & de cet angle CAD l'angle ADB, pour avoir l'angle B. Ainsi dans le Triangle CAD, connoissant les angles & le côté CD, on pourra connoître le côté AD, par cette Analogie,

*Comme le Sinus de l'angle A,  
A son côté opposé CD;  
Ainsi le Sinus de l'angle C,  
A son côté opposé AD.*

& dans le Triangle ADB, connoissant outre les angles le côté AD, on pourra connoître la Ligne AB qu'on cherche, en faisant cette Analogie,

*Comme le Sinus de l'angle B,  
A son côté opposé AD;  
Ainsi le Sinus de l'angle D,  
A son côté opposé AB.*

Mais si le point C de station ne peut pas être en ligne droi- <sup>99. Fig.</sup>te avec la ligne à mesurer AB, prolongez chacune des deux lignes AC, BC, en E & en D, en sorte que les deux lignes CD, CE, soient chacune d'une grandeur connue,

E 3

& me-

Plan-  
che 10.  
99. Fig.

& mesurez les deux angles ADB, AEB, lesquels étant ôtez de l'angle ACB, donneront les angles CAD, CBE, par 32. 1. & dans le Triangle ADC, on pourra connoître le côté AC, par cette Analogie,

*Comme le Sinus de l'angle A,  
A son costé opposé CD;  
Ainsi le Sinus de l'angle D,  
A son costé opposé AC.*

& pareillement dans le Triangle BCE, on trouvera le côté BC, par cette Analogie,

*Comme le Sinus de l'angle B,  
A son costé opposé CE;  
Ainsi le Sinus de l'angle E,  
A son costé opposé BC.*

Ainsi dans le Triangle ACB, on connoitra les deux côtés AC, BC, & l'angle compris ACB, ce qui suffit pour pouvoir connoître les deux autres angles A & B, & le troisième côté, ou la ligne AB qu'on cherche.

#### SCOLI E.

On n'aura pas besoin de Trigonometrie, si sur les deux lignes AC, BC, prolongées on prend les deux points D, E, en sorte que chacun des deux angles ADB, AEB, soit la moitié de l'angle ACB, parce que dans ce cas la Ligne AB qu'on cherche sera égale à la ligne DE, dont la longueur peut être facilement connuë avec un cordeau, comme il est aisé à démontrer.

Si le terrain ne vous permet pas de prolonger les lignes AC, BC, faites au point C, avec la ligne AC, un angle tel qu'il vous plaira par la ligne CF d'une longueur arbitraire, & mesurez l'angle F, afin que dans le Triangle ACF, où l'on connoît outre les angles le côté CF, on puisse connoître le côté AC. Pareillement faites au même point C, avec la ligne BC, un angle à volonté par la ligne CG d'une grandeur connuë, & mesurez l'angle G, afin que dans le Triangle BCG, où l'on connoît outre les angles le côté CG, on puisse connoître le côté BC. Après quoy on pourra connoître la ligne AB dans le Triangle ABC, où l'on connoît trois choses, sçavoir les deux côtés AC, BC, & l'angle compris ACB.

La même Ligne inaccessible AB se peut mesurer encore autrement, comme vous allez voir. Ayant choisi sur terre les deux points de station D, E, dont la distance DE puisse être con-

connuë, mesurez les angles ADB, EDB, AEB, AED, & ôtez de 180 degrez la somme des trois ADB, BDE, AED, pour avoir l'angle DAE, & pareillement les trois AEB, AED, BDE, pour avoir l'angle DBE. Après quoy dans le Triangle ADE, connoissant les angles & le côté DE, on pourra connoître le côté AD; & dans le Triangle DEB, connoissant les angles & le côté DE, on pourra connoître le côté BD; & enfin dans le Triangle ADB, connoissant les côtés AD, BD, & l'angle compris ADB, on pourra connoître la ligne AB qu'on cherche. Ou bien dans le Triangle ADE, connoissant les angles & le côté DE, on pourra connoître le côté AE: & dans le Triangle DBE, connoissant les angles & le côté DE, on pourra connoître le côté BE: & enfin dans le Triangle ABE, connoissant les deux côtés AE, BE, & l'angle compris AEB, on pourra connoître le troisième côté AB.

Plan-  
che 10.  
99. Fig.

Cette Ligne se peut mesurer tres-facilement par le moyen de l'Instrument Universel en cette sorte. Prenez à volonté sur le terrain deux points de station éloignez entre eux d'une distance considerable & si proches de la Ligne à mesurer AB, que les Rayons visuels se puissent couper sur le Plan de l'Instrument Universel; comme D, E, dont la distance DE se doit mesurer bien exactement avec un cordeau; ou autrement; nous la supposons de 150 toises. Ayant arrêté le centre de l'Alidade & de l'Instrument Universel en un point commode de la ligne de conduite, comme en *d*, appliquez l'Instrument en sorte que le point *d* réponde perpendiculairement sur le point D, & la ligne de conduite sur la ligne DE, ce qui sera facile en visant par les Pinnules d'en bas; & ayant tourné l'Alidade vers les deux extremités A, B, de la ligne à mesurer AB, tirez sur la surface de l'Instrument le long de la Ligne de foy les deux Rayons visuels *dA*, *dB*.

Après cela parce que nous avons supposé la ligne DE de 150 toises, avancez le centre de l'Alidade de 150 parties égales de la Ligne de conduite, depuis *d* en *e*, & appliquez de nouveau l'Instrument Universel, en sorte que ce point *e* réponde perpendiculairement au point E, & la Ligne de conduite *de* sur la ligne DE, pour tourner comme auparavant, l'Alidade vers les extremités A, B, de la ligne à mesurer AB, & tirer de la même façon sur la Surface de l'Instrument le long de la Ligne de foy, les deux lignes ou Rayons visuels *ea*, *eb*, qui coupent icy les deux premiers aux points *a*, *b*, dont la distance *ab* étant portée sur la ligne de conduite, donnera par le nombre des parties égales qu'elle comprendra, le nombre des toises de la ligne proposée AB.

On peut aussi connoître en même temps la longueur des lignes DA, DB, EA, EB, en appliquant l'Alidade sur les lignes *da*, *db*, *ea*, *eb*, car ainsi on trouvera sur les divisions de la

Plan-  
che 10.  
99. Fig.

Ligne de foy le nombre des toises que ces lignes comprennent. Ainsi vous voyez que par le moyen de l'Instrument Universel on peut mesurer cinq lignes à la fois avec toute l'exactitude possible.

Plan-  
che 11.  
100. Fig.

Il peut arriver que d'un même point de station, on ne pourra pas voir les deux extremités de la ligne à mesurer AB, comme icy on ne peut voir du point C que l'extremité A, & du point D que l'extremité B, à cause d'un Ravelin qui se rencontre entre-deux. Dans ce cas ayant mesuré avec un Demi-cercle les angles ACD, CDB, & avec un cordeau la ligne CD, on fera à volonté au point C, avec la ligne AC, l'angle ACE, par la ligne CE d'une grandeur volontaire, afin qu'ayant mesuré l'angle E, on puisse connoître dans le Triangle AEC, le côté AC, & dans le Triangle ACD, le côté AD, & l'angle CDA, lequel étant ôté de l'angle CDB, il restera l'angle ADB. Enfin faites au point D, avec la ligne BD, l'angle à discretion BDF, par la ligne DF d'une longueur arbitraire, afin qu'ayant mesuré l'angle F, vous puissiez connoître par supputation dans le Triangle BDF, le côté BD, & ensuite dans le Triangle ADB, la ligne AB qu'on cherche.

#### PROBLEME IV.


*Mesurer d'en haut une ligne Horizontale.*

101. Fig.

Pour mesurer du point C la Ligne horizontale AB, dont l'extremité A répond perpendiculairement au point C, mesurez avec un Demi-cercle l'angle ACB, & à l'aide d'un cordeau que vous ferez pendre en bas du point C, avec un plomb, la hauteur AC, pour avoir dans le Triangle ABC, rectangle en A, outre les angles le côté connu AC, qui nous servira avec l'angle visuel ACB, à trouver la ligne proposée AB, en faisant cette Analogie,

*Comme le Sinus Total,  
A la Tangente de l'angle visuel ACB;  
Ainsi la hauteur AC,  
A la ligne AB.*

Si vous voulez mesurer cette ligne par l'Instrument Universel, il faut placer le centre de l'Alidade au point O éloigné du point E d'autant de parties égales de la ligne de conduite que la hauteur AC contiendra de pieds, après quoy on posera le point O au point C, en sorte que la ligne de foy EO soit à plomb, & l'Instrument demeurant dans cette situation, on tournera l'Alidade vers l'extremité B





de la Ligne à mesurer AB, pour tirer sur la Surface de l'Instrument le long de la ligne de foy la droite OF, qui déterminera la ligne EF, dont la longueur étant portée sur la ligne de conduite, donnera dans le nombre des parties égales qu'elle comprendra, le nombre des pieds de la Ligne proposée AB.

## S C O L I E.

Il peut arriver que le Rayon visuel coupera le côté EG au dehors de l'Instrument, comme icy au point H, au de là du point G, pour la mesure de la ligne AD; Dans ce cas, comme l'on ne peut pas porter la longueur de la ligne EH sur la ligne de conduite, pour sçavoir le nombre des parties égales qu'elle comprend, parce qu'on n'a pas le point de Section H, on trouvera ce nombre par la Règle de Trois directe en cette sorte.

Tirez par pensée du point O, la ligne OK parallèle au côté EG, & ayant ôté le nombre des parties égales de la ligne GI, de celui de la ligne GK, ou EC, vous aurez le nombre des parties égales de la ligne IK: & parce que nous sçavons celui de la ligne CK, ou EG, en transportant sa longueur sur la ligne de conduite, on fera dans les Triangles semblables OKI, OFH, ce raisonnement, si le nombre des parties égales de la ligne IK, donne tant pour le nombre des parties égales de la ligne OK, combien donnera le nombre des parties égales de la ligne CE? & l'on trouvera le nombre des parties égales de la ligne EH, ou le nombre des pieds de la ligne AD qu'on cherche.

Nous avons supposé que l'extrémité A de la ligne à mesurer répondoit perpendiculairement sous le point donné C, & nous supposons à présent qu'elle n'y réponde pas, comme si on vouloit mesurer par la Trigonometrie la ligne BD, il faudroit encore mesurer avec un Demi-cercle l'angle visuel ACD, pour trouver par son moyen toute la ligne AD, par une Analogie semblable à la précédente, qui nous a donné la ligne AB, laquelle étant ôtée de la ligne AD, le reste sera la ligne BD, que l'on peut trouver immédiatement, en tirant des deux Analogies qu'il faut faire pour trouver les lignes AB, AD une seule Analogie, telle qu'est la suivante,

*Comme le Sinus Total,*

*A la différence des Tangentes des angles visuels ACB,*  
*ACD;*

*Ainsi la hauteur AC,*

*A la ligne BD.*



Plan-  
che II.  
201. Fig.

La démonstration de cette Analogie sera évidente à celui qui considérera, que le côté AC qui est commun aux deux Triangles rectangles CAB, CAD, étant pris pour le Sinus Total, les deux lignes AB, AD, sont les Tangentes des angles visuels ACB, ACD, & que par conséquent la ligne BD est la différence de ces Tangentes.

## PROBLEME V.

*Mesurer d'en haut une Ligne inclinée.*


102. Fig. **P**OUR mesurer la Ligne inclinée AB sans sortir de la Tour DB, à laquelle je suppose qu'elle est directement opposée, en sorte que les deux lignes AB, DE, soient dans un même Plan; choisissez deux endroits commodes, comme les deux fenêtres C, D, pour y faire vos stations, & mesurer avec un cordeau leur distance CD, qui doit être la plus grande qu'il sera possible, & avec un Demi-cercle les angles visuels ECA, ECB, EDA, EDB, lesquels étant ainsi connus, les angles CAD, & CBD seront aussi connus, & aussi les angles ACB, ADB: parce que l'angle CAD est égal à la différence des deux ECA, EDA, par 32. 1. & l'angle CBD à la différence des deux ECB, EDB, & que l'angle ACB est égal à la différence des deux ECA, ECB, & pareillement l'angle ADB à la différence des deux EDA, EDB. Cela étant supposé on pourra connoître dans le Triangle ACD, le côté AC, & dans le Triangle BCD le côté BC, & enfin dans le Triangle ACB le côté AB qu'on cherche. On bien on pourra connoître dans le Triangle ACD le côté AD, & dans le Triangle BCD le côté BD, & enfin dans le Triangle ADB, la ligne AB qu'on cherche.


## SCOLIUM.

L'Instrument Universel peut aussi servir tres-commodément pour la mesure de la Ligne AB, ce qui est si facile à comprendre par ce qui a été dit auparavant, qu'il seroit inutile d'en donner icy un exemple particulier. Je diray seulement qu'afin que les Rayons visuels se coupent sur la surface de l'Instrument, la distance CD des stations ne doit pas être trop petite par rapport à la ligne à mesurer AB.

Il semble aussi inutile de dire, qu'on peut de la même façon mesurer d'en haut la longueur d'un Toit, la largeur d'un Pré, la hauteur d'un Château, ou d'une Maison, & toute autre ligne, dont les extremittez seront en ligne droite avec la hauteur ED.

PRO-





## PROBLEME VI.

*Mesurer d'en bas une Ligne parallele & élevée au dessus de l'Horizon.*

LA Ligne Horizontale AB, qui represente icy la distance de deux fenêtres, se peut mesurer tres-facilement par le-moyen de l'Instrument Universel, en cette sorte.

Plan-  
che 12.  
103. Figure

Ayant choisi sur terre les deux points de station C, D, qui soient autant qu'il sera possible dans une ligne parallele à la Ligne proposée AB, ce qui sera facile dans cet exemple, placez dans la premiere station C, l'Instrument Universel; en sorte que la ligne de conduite soit parallele à la ligne CD, ce qui sera aussi facile en élevant aux points C, D, deux piquets à plomb de même hauteur, comme de trois ou de quatre pieds, c'est à dire d'une hauteur égale à celle du Pied, ou Bâton qui soutient l'Instrument, & qu'on appelle *Bâton d'Arpenteur*, & en visant par les Pinnules d'en bas le Piquet élevé en D, lorsque l'Instrument est en C, & l'Alidade étant au point E qui répond perpendiculairement au point C, visez par les deux Pinnules de l'Alidade les extremités A, B, de la Ligne à mesurer AB, & tirez le long de la ligne de foy sur la Surface de l'Instrument les deux lignes EG, EH. Après cela faites une seconde station en D, où l'Instrument étant posé comme auparavant, en sorte que quand l'Alidade aura été avancée de E en F, d'autant de parties égales que la ligne CD contiendra de pieds, ce point F répond perpendiculairement au point D, on vise de la même façon les mêmes extremités A, B, pour tirer sur la Surface de l'Instrument le long de la ligne de foy les lignes Fa, Fb, qui coupent icy les deux premieres tirées du point E, aux points a, b, dont la distance étant portée sur la ligne de conduite donnera dans le nombre des parties égales qu'on trouvera, le nombre des pieds de la Ligne proposée AB.

On peut mesurer par la Trigonometrie cette Ligne AB, en mesurant avec un Demi-cercle les angles visuels qui se forment aux deux points E, F, & avec un cordeau la longueur de la ligne CD, qui donnera celle de son égale & parallèle EF: & alors dans le Triangle EBF. connoissant les angles & le côté EF, on pourra connoître le côté BF; & pareillement dans le Triangle EAF, connoissant outre les angles le côté EF, on pourra connoître le côté AE, & enfin dans le Triangle BAE, connoissant les côtés AE, BE, & l'angle compris AEB, on pourra connoître le troisième côté, ou la Ligne AB qu'on cherche, ou bien dans le Triangle BCF on pourra connoître

le

Fig. 11. le côté BF, & dans le Triangle EAF le côté AF, & enfin  
103. Fig. dans le Triangle ABF, la ligne propofée AB.

## PROBLEME VII

*Mefurer une Hauteur accessible.*

304. Fig. **U**Nc Hauteur accessible fe peut mefurer en plusieurs manieres differentes, lorsque le terrain eft égal & uni ; mais nous enfeignerons icy feulement celles qui peuvent être d'ufage, & dont la pratique eft aifée & convenable à la hauteur.

Pour donc mefurer la Hauteur accessible AB, premiere-ment avec l'Instrument Univerfel, choisissez dans la Campagne le point C de ftation autant éloigné que vous pourrez de la bafe B de la Hauteur à mefurer AB, pour une Raifon que la fuite de l'operation vous fera aifément connoître. Ayant donc pofé l'Instrument Univerfel au point C., en forte que la ligne de conduite EF foit parallele à l'Horizon BC, & que quand l'Alidade aura été avancée depuis F en E d'autant de parties égales que la ligne BC que l'on peut mefurer avec un cordeau, contiendra de pieds, le point E répondra perpendiculairement au point C : & ayant tourné l'Alidade vers le fommet A de la hauteur à mefurer AB, ce qui fe fera en vifant ce fommet A par les Pinnules de l'Alidade, marquez un point comme G, où l'Alidade coupe le côté FA, que je fuppose perpendiculaire à l'autre côté EF, & alors la partie FG étant portée fur la ligne de conduite EF, le nombre des parties égales qu'on trouva, fera le nombre des pieds de la hauteur du point A au dessus du point E, c'est à dire la hauteur AD, en continuant la ligne EF parallele à l'Horizon jufqu'en D ; c'est pourquoy fi à cette hauteur AD ainfi trouvée on ajoute la hauteur BD, ou CE, on aura la Hauteur AB qu'on cherche.

Si vous voulez trouver cette Hauteur AB par la Trigonometrie, il faudra mefurer avec un Demi-cercle l'angle vifuel AED, & avec un cordeau la ligne BC égale à la ligne DE, afin que dans le Triangle ADE rectangle en D, on puiſſe trouver premierelement le côté AD par cette Analogie,

Comme le Sinus Total,  
A la Tangente de l'angle vifuel AED,  
Ainſi le côté DE,  
A la hauteur AD.

Quand

Quand la hauteur AB ne sera pas bien grande, on pourra assez exactement la mesurer par son ombre, comme seroit BM : car si dans le même temps on marque l'ombre IL d'un Bâton IK perpendiculairement élevé sur un Plan Horizontal, comme les deux ombres IL, BM, sont terminées par les deux Rayons du Soleil KL, AM, qui peuvent passer pour parallèles, ce qui fait que les deux Triangles rectangles KIL, ABM, étant semblables, on pourra trouver directement la Hauteur AB, en faisant cette Analogie,

Plan-  
che 12.  
104. Fig.

*Comme l'ombre du Bâton IL,*  
*A sa hauteur IK,*  
*Ainsi l'ombre BM,*  
*A la Hauteur AB.*

Ou bien pour trouver cette Hauteur plus exactement, on prendra avec un Demi-cercle, ou autrement, la hauteur du Soleil, qui donnera l'angle AMB, lequel étant ainsi connu avec l'ombre BM, on pourra trouver par la Trigonometrie la Hauteur AB, en faisant cette Analogie,

*Comme le Sinus Total,*  
*A la Tangente de la hauteur du Soleil ;*  
*Ainsi la longueur de l'ombre BM,*  
*A la Hauteur AB qu'on cherche.*

Quand la même Hauteur AB sera assez petite, on la pourra aussi mesurer assez exactement par Reflexion, en cette sorte. Mettez sur terre une petite piece de miroir plat dans une situation horizontale, mais comme il est difficile de la bien placer, & qu'une erreur imperceptible en peut causer une considerable dans la mesure de la Hauteur AB, il vaudra mieux au lieu d'un miroir plat se servir de l'eau qui conserve toujours une situation horizontale. Ayant donc mis de l'eau par exemple en M, retirez-vous jusqu'à ce qu'étant par exemple en O, & votre œil en N du Rayon de Reflexion MN, vous apperceviez dans l'eau le sommet A par reflexion, & alors l'Angle de Reflexion OMN étant égal à l'Angle d'Incidence AMB, les deux Triangles rectangles ABM, MON, seront semblables ; c'est pourquoy on pourra trouver la Hauteur AB, en mesurant bien exactement les distances MB, MO, & la hauteur de l'œil ON, & en faisant cette Analogie,

*Comme la distance MO,*  
*A la distance MB ;*  
*Ainsi la hauteur NO,*  
*A la hauteur AB.*

## PROBLEME VIII.

*Mesurer une Hauteur inaccessible.*

UNE Hauteur inaccessible se peut mesurer comme si elle étoit accessible, lorsque l'on voit la base, parce que la distance de cette base au point de station peut être connue par Probl. 2. & que le reste se peut achever comme il vient d'être enseigné. Mais quand la base sera cachée, il sera besoin de deux points de station, pris en ligne droite avec la Hauteur à mesurer, c'est à dire tels que la ligne des deux Stations, & celle qu'on veut mesurer, soient dans un même Plan, comme vous allez voir.

Plan-  
che 12.  
105. Fig.

Pour donc mesurer la Hauteur inaccessible AB, premièrement au moyen de l'Instrument Universel, ayant arrêté le centre de l'Alidade en un point commode de la ligne de conduite EF, comme en E, & ayant choisi dans la Campagne deux points de station, qui soient de niveau & en ligne droite avec la base B de la Hauteur à mesurer AB, ce qui est facile, quoique la base B ne soit pas visible, comme C, D, qui doivent être un peu éloignés entre eux, plus ou moins, selon que la Hauteur AB sera plus grande ou plus petite, élevez à plomb l'Instrument Universel, en sorte que le point E réponde perpendiculairement sur le point de station C, & que la ligne de conduite EF soit parallèle à l'Horizon CD, & l'Alidade étant tournée vers le sommet A, tirez sur la Surface de l'Instrument, le long de la ligne de foy, la droite EO. Après cela avancez le Centre de l'Alidade depuis E en F, d'autant de parties égales que la ligne CD contiendra de pieds ou de toises, & ayant élevé à plomb l'Instrument Universel, en sorte que le point F réponde perpendiculairement sur le point de station D, & que la ligne de conduite EF soit comme auparavant, parallèle à l'Horizon CD, tournez aussi l'Alidade vers le sommet A, & tirez pareillement sur la Surface de l'Instrument, le long de la ligne de foy la droite FH, qui coupe icy la première EO au point I, dont la distance à la ligne de conduite EF, que l'on trouvera en décrivant de ce point I, un arc de Cercle qui touche la ligne de conduite EF, étant portée sur la même ligne de conduite EF, donnera dans le nombre des parties égales qu'elle comprendra, le nombre des pieds ou des toises de la hauteur du point A par dessus la ligne de conduite EF, c'est à dire de la hauteur AG à laquelle ajoutant trois ou quatre pieds pour la ligne BG, ou DF, ou CE, qui est ordinairement d'autant, on aura la hauteur proposée AB.

Pour

100


101

102

103

104





Pour mesurer cette Hauteur par la Trigonometrie, il faut mesurer avec un cordeau la distance CD des stations, & avec un Demi-cercle les angles visuels AEG, AFG, dont les complemens, sçavoir les angles EAG, FAG, seront par conséquent connus, & leurs Tangentes, sçavoir les lignes EG, FG, à l'égard du Sinus Total AG seront aussi connues, aussi-bien que leur difference EF, ou CD. D'où l'on tire aisément cette Analogie,

*Comme la difference des Tangentes des angles EAG, FAG,  
Au Sinus Total ;*

*Ainsi la distance des stations CD,  
A la Hauteur AG qu'on cherche.*

## S C O L I E.

Si après avoir mesuré l'Angle visuel AEG dans le point C de la premiere station, on fait la seconde au point D, en sorte que l'angle visuel AFG soit double du premier AEG, & qu'on mesure la ligne CD, qui sera dans ce cas égale au Rayon visuel AF; on pourra connoître la hauteur AG, en faisant dans le Triangle rectangle AFG, cette Analogie,

*Comme le Sinus Total,*

*A la ligne AF, ou CD ;  
Ainsi le Sinus de l'angle AFG,  
A la Hauteur AG.*

Si vous ne voulez point de calcul, faites la premiere station au point C, en sorte que l'angle visuel AEG soit de 26, degrez, & d'environ 34 minutes, & la seconde station au point D, en sorte que l'angle visuel AFG soit précisément de 45 degrez, & alors la Hauteur AG sera égale à la distance CD de ces deux stations, & aussi à la ligne BD.

Si vous voulez trouver la même Hauteur AG par une figure raccourcie, tirez à part la ligne KL d'autant de parties égales prises sur une échelle que la distance CD des deux stations contient de pieds ou de toises, & ayant fait au point K, l'angle LKM égal à l'angle visuel AEG, & au point L l'angle NLM égal à l'angle visuel AFG, tirez sur la droite KLN, du point M, la perpendiculaire MN, dont la longueur étant portée sur l'échelle, donnera le nombre des pieds ou des toises de la Hauteur AG qu'on cherche.

Quand la Hauteur AB ne sera pas bien grande, on la pourra mesurer tres-facilement par le moyen de deux Bâtons inégaux en cette sorte. Elevez sur terre les deux Bâtons inégaux CD,

Plan-  
che 13.  
106. Fig.

Plan-  
che 13.

106. Fig.

CD, EF, paralleles entre eux & à la Hauteur à mesurer AB, en sorte que les trois points B, C, E, soient en ligne droite, & que par les deux extremités F, D, on voye le sommet A. Après cela faites une seconde station en ligne droite aux deux points G, I, pour élever comme auparavant les deux Bâtons GH, IK, égaux aux deux precedens, en sorte que pareillement on voye par les deux extremités H, K, le même sommet A. Cela étant fait, tirez par pensée par les deux points H, K, les droites HDM, KFL, paralleles entre elles & à l'Horizon IB, & pour trouver la hauteur AM du sommet A sur le plus grand Bâton CD, ou GH, mesurez exactement la longueur des Bâtons, & les distances IG, EC, GC, pour faire cette Analogie,

*Comme la difference des distances IG, EC,*

*A la difference des Bâtons CD, EF ;*

*Ainsi la distance GC,*

*A la Hauteur AM.*

#### D I M O N S T R A T I O N .

Dans les Triangles semblables AKF, AHD, on connoît par 4. 6. que les quatre lignes AK, AH, FK, DH, sont proportionnelles, & que pareillement dans les Triangles semblables AKL, AHM, les quatre lignes AK, AH, AL, AM, sont proportionnelles, & que par conséquent les quatre FK, DH, AL, AM, ou EI, CG, AL, AM, sont aussi proportionnelles : c'est pourquoy en divisant on connoitra que la difference des deux premières EI, CG, ou des deux IG, EC, est à CG, comme la difference LM des deux dernières AL, AM, ou des deux Bâtons CD, EF, est à AM. Ce qu'il falloit démontrer.

La Hauteur proposée AB se peut trouver directement par Reflexion en cette sorte. Ayant placé horizontalement une piece de Miroir plat en un lieu commode, comme au point N, qui soit au niveau avec la base B de la Hauteur à mesurer AB, retirez-vous en P, en sorte qu'ayant l'œil au point O de la ligne de Reflexion NO, vous apperceviez le sommet A, par l'angle de Reflexion PNO, qui est toujours égal à l'angle d'incidence ANB. Après cela mettez une autre piece de Miroir plat, ou la même en quelqu'autre point commode, comme Q, qui soit de niveau & en ligne droite avec les deux N, B, pour l'y placer horizontalement, & s'en éloigner comme auparavant, jusqu'à ce qu'étant par exemple en S, vous apperceviez le même sommet A, par l'angle de Reflexion SQR égal à l'angle d'incidence AQB. Enfin mesurez exactement la hauteur de l'œil PO, ou RS, & les distances NP, NQ, QS, pour faire cette Analogie, qui donnera tout d'un coup la hauteur AB ;

*Comm e*

*Comme la différence des distances SQ. PN,*

*À la hauteur de l'œil RS, ou OP;*

*Ainsi la distance QN,*

*À la Hauteur proposée, AB.*

Plan-  
che 13.  
106. Fig.

## D É M O N S T R A T I O N.

Dans les Triangles semblables ANB, OPN, on connoît par 4. 6. que les quatre lignes BN, PN, AB, OP, sont proportionnelles, & en mettant à la place des deux dernières AB, OP, ou AB, RS, les deux BQ, QS, qui sont en même Raison, par 4. 6. à cause des Triangles semblables ABQ, RSQ, on connoîtra que ces quatre BN, PN, BQ, QS, sont proportionnelles: c'est pourquoy en composant on connoîtra que ces quatre BP, PN, BS, QS, sont proportionnelles, & en permutant, que ces quatre BP, BS, PN, QS, sont proportionnelles, & en divisant, que ces quatre PS, BP, QS—PN, PN, sont proportionnelles, & en permutant, que ces quatre PS, QS—PN, BP, PN, sont proportionnelles, & en divisant, que ces quatre QN, QS—PN, BN, PN, sont proportionnelles, & si à la place des deux dernières BN, PN, on met les deux AB, OP, qui sont en même Raison, par 4. 6. à cause des Triangles semblables ABN, OPN, on connoîtra que ces quatre QN, QS—PN, AB, OP, sont proportionnelles, & enfin par Raison converse que ces quatre QS—PN, QN, OP, AB, sont proportionnelles. Ce qu'il falloit démontrer.

## P R O B L E M E IX.

*Mesurer d'une petite Hauteur une plus grande, dont la base est visible.*

Pour mesurer la Hauteur AB, dont la base B est visible, du point C de la Hauteur plus petite CD, dont la base D est supposée au niveau avec la base B, c'est à dire que la ligne BD est supposée parallèle à l'Horizon; tirez par imagination la ligne CE parallèle à la ligne DB, & mesurez avec un Demi-cercle la quantité des angles visuels ACE, BCD, & avec un plomb la Hauteur CD, & alors on pourra trouver dans le Triangle CDB rectangle en D, la ligne DB, ou CE son égale, & dans le Triangle AEC rectangle en E, la ligne AE, à laquelle ajoutant la ligne BE ou CD son égale, on aura la Hauteur AB qu'on cherche. On bien dans le Triangle rectangle BDC, ou trouvera l'hypoténuse BC, & dans le Triangle obliquangle ACB, on pourra trouver le côté ou la Hauteur AB qu'on cherche.

### 3. TRAITS' DE GEOMETRIE. II. PARTIE.

107. Fig. Les deux Analogies qu'il faut faire dans les deux Triangles rectangles ACE, CDB, pour trouver la Hauteur AE, se peuvent aisément reduire à celle cy,

*Comme le Quarré du Rayon,  
Au Rectangle des Tangentes des angles visuels ACE,  
BCD;  
Ainsi la Hauteur CD,  
A la Hauteur AB qu'on cherche.*

### PROBLEME X.

*Mesurer d'une grande Hauteur une plus petite, dont la base est visible.*

107. Fig. **P**our mesurer la Hauteur CD, dont la base D est visible, du Sommet A de la Hauteur plus grande AB, dont la base B est supposée au niveau avec la base D, c'est à dire que la ligne BD est supposée parallèle à l'Horizon, tirez par pensée à cette ligne BD, la parallèle CE, & mesurez avec un Demi-cercle la quantité des angles visuels BAC, BAD, & avec un plomb la Hauteur AB, & alors on pourra trouver dans le Triangle ABD, rectangle en B, la ligne BD, ou EC son égale, & dans le Triangle rectangle AEC, la ligne AE, laquelle étant ôtée de la Hauteur AB, on aura la ligne BE, ou la Hauteur CD qu'on cherche. Ou bien dans le Triangle rectangle ABD, on trouvera l'hypotenuse AD, & dans le Triangle obliquangle ACD, on trouvera le côté ou la Hauteur CD qu'on cherche.

Les deux Analogies qu'il faut faire dans les deux Triangles rectangles ABD, AEC, pour trouver la ligne AE, se peuvent aisément reduire à celle cy,

*Comme le Quarré du Rayon,  
Au produit des Tangentes des angles visuels BAD,  
BAC;  
Ainsi la Hauteur AB,  
A la ligne AE.*

### PROBLEME XI.

*Mesurer la Hauteur d'une Tour située sur une Montagne.*

108. Fig. **T**irant l'Azimut, que si par Probl. 10. on mesure la Hauteur de la Tour au dessus du Plan de l'Horizon, & Montagne, & qu'en ôte cette Hauteur de la

la première, il restera la Hauteur de la Tour au dessus de la Montagne. Comme si AD représente une Tour située sur la Montagne GAC, en ôtant de toute la Hauteur DB du sommet D sur le Plan de l'Horizon BF, la Hauteur AB de la Montagne, on aura la Hauteur AD qu'on cherche: Plan.  
cas 13.  
108. Fig.

S O L U T I O N.

Quand la Montagne GAC ne sera pas extrêmement haute, & qu'on la pourra parcourir de haut en bas, c'est à dire de A en G, on pourra aisément mesurer la Hauteur AB, & même son Talud BG, par une manière fort simple qu'on appelle *Cubellation*, qui se peut pratiquer très-facilement au moyen de l'Instrument Universel, comme vous allez voir.

Ayant posé à plomb l'Instrument Universel sur son Bâton arrêté au point G, en sorte que la ligne de conduite HI soit Horizontale, conduisez par ses deux Pinnules le Rayon visuel HK, & l'Instrument étant posé de la même façon au point K; tirez pareillement le Rayon HL, pour avoir sur le penchant de la Montagne le point L, où l'Instrument étant transporté de la même façon, on dirigera le Rayon HM, & l'on continuera ainsi jusqu'au sommet A; & alors il est évident que toutes les longueurs des lignes HK, HL, HM, &c. qu'il est aisé de mesurer, étant ajoutées ensemble donneront le Talud BG, & que la hauteur du premier point H étant multipliée par le nombre de stations, donnera la Hauteur AB qu'on cherche.

La même Hauteur AB se peut aussi mesurer très-facilement par la Trigonometrie, si l'on mesure avec un cordeau la longueur AG, & avec un Demi-cercle l'angle BAG, dont le complement donnera l'angle AGB, à cause de l'angle droit B; car dans le Triangle rectangle AGB, on pourra connoître la Hauteur AB par cette Analogie;

*Comme le Sinus Total;  
A la longueur AG;  
Ainsi le Sinus de l'angle AGB;  
A la Hauteur AB;*

Si le penchant AG de la Montagne est trop inégal, pour pouvoir être commodément mesuré, & qu'au dessus de la Montagne il y ait une Plaine assez grande, on y pourra faire deux stations en deux endroits commodés, comme A, C, d'où l'on puisse voir un même point de la Campagne, comme F, & mesurer la Hauteur AB en cette sorte.

Ayant fait votre première station en A, mesurez avec un Demi-cercle soutenu par le Bâton perpendiculaire AD, l'angle

Plan-  
che 19.  
108. Fig.

gle visuel ADF, & ayant pareillement fait votre seconde station en C, mesurez aussi avec un Demi-cercle soutenu par le Bâton perpendiculaire CE égal au premier AD, l'angle visuel CEF, lequel étant ôté de l'angle droit CED, on aura l'angle DEF; comme le premier angle ADF étant ajouté à l'angle droit ADE, on a l'angle EDF, & par conséquent l'angle EFD. Ainsi dans le Triangle FDE, on connoitra les angles & le côté DE, égal à la distance AC, que l'on peut mesurer avec un cordeau, c'est pourquoy on pourra connoître la ligne DF, & dans le Triangle DBF rectangle en B, on connoitra la Hauteur DB, de laquelle ôtant la Hauteur AD du Bâton, on aura la Hauteur AB qu'on cherche.

La Hauteur DB se peut connoître plus facilement, en raisonnant de la sorte. Puisque dans le Triangle rectangle DBF, l'angle BDF est connu, on connoitra dans les Tables la Tangente BF, à l'égard du Sinus Total BD: & pareillement puisque dans le Triangle rectangle EOF, on connoît l'angle OEF, on connoitra la Tangente OF, à l'égard du Sinus Total OE égal au premier BD, parce que les lignes DB, EO, étant perpendiculaires à l'Horizon peuvent passer pour parallèles. C'est pourquoy si de la Tangente OF, on ôte la Tangente BF, la difference de ces deux Tangentes donnera BO, ou AC, pour le Sinus Total DB, ou EO de 10000000 parties: & comme la ligne AC est déjà connue, on pourra trouver à l'égard de sa valeur le Sinus Total BD, par cette Analogie,

*Comme la difference des Tangentes,  
Au Sinus Total;  
Ainsi la distance AC des stations,  
A la Hauteur BD qu'on cherche.*

C'est de la même maniere qu'on mesurera une profondeur, comme vous allez voir dans le


## PROBLEME XII.

*Mesurer une Profondeur.*


Plan-  
che 14.  
109. Fig.

Pour mesurer la profondeur AB, premierement au moyen de l'Instrument Universel, choisissez sur la terre deux points commodes, qui soient en ligne droite avec le point B, de niveau entre eux, & autant éloignez entre eux & du point B qu'il sera possible, comme C, D, pour les deux points de station, où il faut placer l'Instrument Universel en cette sorte.

Ayant arrêté le centre de l'Alidade de l'Instrument Universel







sel en un point commode de la ligne de conduite GH, comme en E, & l'Instrument étant élevé à plomb, en sorte que le point E réponde perpendiculairement sur le point C, & la ligne de conduite GH sur la ligne CD, tournez l'Alidade vers le point A, en sorte que par ses Pinaules vous voyez ce point A, & tirez sur la surface de l'Instrument le long de la ligne de foy, la droite EF.

Après cela avancez le centre de l'Alidade depuis E en G, d'autant de parties égales de la ligne de conduite GH, que la ligne CD contiendra de pieds, & l'Instrument Universel étant comme auparavant élevé à plomb au point D, en sorte que le point G réponde perpendiculairement sur le point D, & la ligne de conduite GH sur la ligne CD, tournez pareillement l'Alidade vers le point A, & tirez sur la surface de l'Instrument, le long de la ligne de foy, la droite GI, qui rencontre icy la première EF au point I.

Enfin tirez par pensée de ce point I une ligne perpendiculaire à la ligne de conduite GH, & cette ligne GH représentera la profondeur AK qu'on cherche, & pour avoir la longueur de cette perpendiculaire, sans qu'il soit besoin de la tirer effectivement, mettez une pointe du compas au point I, & décrivez de ce point I un arc de cercle qui raze la ligne de conduite GH, & l'ouverture du compas donnera la longueur de cette perpendiculaire, qui étant portée sur la même ligne de conduite GH, le nombre des parties égales qu'on trouvera, donnera le nombre des pieds de la hauteur de l'œil sur le point A, c'est à dire de la ligne AK, de laquelle ôtant la ligne BK, ou CE, c'est à dire la hauteur de l'œil sur l'Horizon CD, on aura la profondeur AB qu'on cherche.

Si vous voulez mesurer la ligne AK par la Trigonometrie, il faut après avoir mesuré avec un cordeau la distance CD des deux stations, qui est égale à la ligne GE, mesurer avec un Demi-cercle la quantité des angles visuels CEA, DGA, & alors dans le Triangle obliquangle GAE, on pourra connoître la ligne AE, & dans le Triangle rectangle AKE la ligne AK : ou bien dans le Triangle obliquangle GAB, on pourra connoître la ligne AG, & dans le Triangle rectangle AKG, la ligne AK.

Mais les deux Analogies qu'il faut-icy faire pour trouver la ligne AK, se peuvent aisément reduire à cette seule.

*Comme la difference des Tangentes des angles visuels CEA,*  
*DGA,*

*Au Sinus Total :*

*Ainsi la distance CD des stations,*  
*A la ligne AK qu'on cherche.*

Plan-  
che 13.  
Fig. 6.

CD, EF, paralleles entre eux & à la Hauteur à mesurer AB, en sorte que les trois points B, C, E, soient en ligne droite, & que par les deux extremités F, D, on voye le sommet A. Après cela faites une seconde station en ligne droite aux deux points G, I, pour élever comme auparavant les deux Bâtons GH, IK, égaux aux deux precedens, en sorte que pareillement on voye par les deux extremités H, K, le même sommet A. Cela étant fait, tirez par pensée par les deux points H, K, les droites HDM, KFL, paralleles entre elles & à l'Horizon IB, & pour trouver la hauteur AM du sommet A sur le plus grand Bâton CD, ou GH, mesurez exactement la longueur des Bâtons, & les distances IG, EC, GC, pour faire cette Analogie,

*Comme la difference des distances IG, EC,*

*A la difference des Bâtons CD, EF ;*

*Ainsi la distance GC,*

*A la Hauteur AM.*

#### D I M O N S T R A T I O N.

Dans les Triangles semblables AKF, AHD, on connoît par 4. 6. que les quatre lignes AK, AH, FK, DH, sont proportionnelles, & que pareillement dans les Triangles semblables AKL, AHM, les quatre lignes AK, AH, AL, AM, sont proportionnelles, & que par conséquent les quatre FK, DH, AL, AM, ou EI, CG, AL, AM, sont aussi proportionnelles : c'est pourquoi en divisant on connoît que la difference des deux premières EI, CG, ou des deux IG, EC, est à CG, comme la difference LM des deux dernières AL, AM, ou des deux Bâtons CD, EF, est à AM. Ce qu'il falloit démontrer.

La Hauteur proposée AB se peut trouver directement par Reflexion en cette sorte. Ayant placé horizontalement une piece de Miroir plat en un lieu commode, comme au point N, qui soit au niveau avec la base B de la Hauteur à mesurer AB, retirez-vous en P, en sorte qu'ayant l'œil au point O de la ligne de Reflexion NO, vous apperceviez le sommet A, par l'angle de Reflexion PNO, qui est toujours égal à l'angle d'incidence ANB. Après cela mettez une autre piece de Miroir plat, ou la même en quelqu'autre point commode, comme Q, qui soit de niveau & en ligne droite avec les deux N, B, pour l'y placer horizontalement, & s'en éloigner comme auparavant, jusqu'à ce qu'étant par exemple en S, vous apperceviez le même sommet A, par l'angle de Reflexion SQR égal à l'angle d'incidence AQB. Enfin mesurez exactement la hauteur de l'œil PO, ou RS, & les distances NP, NQ, QS, pour faire cette Analogie, qui donnera tout d'un coup la hauteur AB ;

*Comm e*

*Comme la difference des distances SQ, PN,*

*A la hauteur de l'œil RS, ou OP;*

*Ainsi la distance QN,*

*A la Hauteur proposée, AB.*

Plan-  
che 13.  
106. Fig.

## DÉMONSTRATION.

Dans les Triangles semblables ANB, OPN, on connoît par 4. 6. que les quatre lignes BN, PN, AB, OP, sont proportionnelles, & en mettant à la place des deux dernières AB, OP, ou AB, RS, les deux BQ, QS, qui sont en même Raison, par 4. 6. à cause des Triangles semblables ABQ, RSQ, on connoît que ces quatre BN, PN, BQ, QS, sont proportionnelles: c'est pourquoy en composant on connoît que ces quatre BP, PN, BS, QS, sont proportionnelles, & en permutant, que ces quatre BP, BS, PN, QS, sont proportionnelles, & en divisant, que ces quatre PS, BP, QS—PN, PN, sont proportionnelles, & en permutant, que ces quatre PS, QS—PN, BP, PN, sont proportionnelles, & en divisant, que ces quatre QN, QS—PN, BN, PN, sont proportionnelles, & si à la place des deux dernières BN, PN, on met les deux AB, OP, qui sont en même Raison, par 4. 6. à cause des Triangles semblables ABN, OPN, on connoît que ces quatre QN, QS—PN, AB, OP, sont proportionnelles, & enfin par Raison converse que ces quatre QS—PN, QN, OP, AB, sont proportionnelles. Ce qu'il falloit démontrer.

## PROBLEME IX.

*Mesurer d'une petite Hauteur une plus grande, dont la base est visible.*

Pour mesurer la Hauteur AB, dont la base B est visible, du point C de la Hauteur plus petite CD, dont la base D est supposée au niveau avec la base B, c'est à dire que la ligne BD est supposée parallèle à l'Horizon; tirez par imagination la ligne CE parallèle à la ligne DB, & mesurez avec un Demi-cercle la quantité des angles visuels ACE, BCD, & avec un plomb la Hauteur CD, & alors on pourra trouver dans le Triangle CDB rectangle en D, la ligne DB, ou CE son égale, & dans le Triangle AEC rectangle en E, la ligne AE, à laquelle ajoutant la ligne BE ou CD son égale, on aura la Hauteur AB qu'on cherche. On bien dans le Triangle rectangle BDC, ou trouvera l'hypoténuse BC, & dans le Triangle obliquangle ACB, on pourra trouver le côté ou la Hauteur AB qu'on cherche.



## TROISIEME PARTIE. DE LA PLANIMETRIE.

**L**A *Planimetrie* qu'on appelle aussi *Arpentage*, comme nous avons déjà dit ailleurs, enseigne à mesurer un Plan & toute autre superficie: & comme dans la *Longimetric* nous avons mesuré les Lignes par des Lignes plus petites, de même dans la *Planimetrie* on mesure les Surfaces par des Surfaces plus petites, qui sont ordinairement des Quarrez, & quelquefois des Quarrez-longs, les Geometres ayant choisi l'angle droit plutôt que l'angle aigu, ou que l'angle obtus, parce que ces deux angles peuvent varier en une infinité de manieres différentes, au lieu que l'angle droit est invariable & unique dans son espece.

Le nombre des Mesures quarrées qui sont contenues dans une Superficie, se trouve toujours par la Multiplication, parce qu'on la conçoit ordinairement égale à un Rectangle, dont l'aire se trouve en multipliant la longueur par la largeur. Comme si du Rectangle ABCD on multiplie la longueur AB, que je suppose de quatre toises, par la largeur AD de trois toises, on aura douze toises quarrées pour la Superficie de ce Rectangle, lesquelles sont causées par les intersections des lignes droites tirées en long & en travers par les divisions des côtez opposez.

Plan-  
che 14.  
Fig. 112.

D'où il suit qu'une Toise courante, comme AE, ayant 6 Pieds courants, la Toise quarrée AEFG aura 36 Pieds quarrés, parce qu'en multipliant 6 par 6, le produit est 36: & qu'un Pied courant ayant 12 Ponces courans, un Pied quarré aura 144 Ponces quarrés, parce que le produit de 12 par 12 est 144. Ce qui fait dire que l'Arpent a 100 Perches en Quarré, parce que l'on donne 10 Perches courantes à la longueur de l'un de ses côtez, & que multipliant 10 par 10, il vient 100 au produit. Ainsi des autres.

C'est pourquoy quand on aura des Toises quarrées à reduire en Pieds quarrés, au lieu de les multiplier par 6, on les doit multiplier par 36. Ainsi ayant connu que l'aire du Rectangle ABCD est de 12 Toises quarrées, si l'on veut sçavoir combien elles font de Pieds quarrés, on les multipliera par 36, & l'on aura 432 Pieds quarrés pour le contenu du Rectangle.

tangle ABCD. Tout au contraire, quand on aura des Pieds <sup>Plan-</sup>quarrez à réduire en Toises quarrées, au lieu de les diviser par <sup>che 14-</sup>36, on les divisera par 36. Ainsi des autres. <sup>112. Fig.</sup>

Nous avons dit que les Surfaces se mesurent quelquefois par des Quarrez-longs, ce qui se fait principalement pour avoir un calcul plus aisé, lorsqu'il y a des especes différentes à multiplier ensemble: & alors on appelle *Pied de toise quarrée* un Rectangle qui contient six Pieds quarrez, comme la Toise courante contient six Pieds courans, ce Rectangle étant mis dans la pratique à la place d'une Toise quarrée qui vaut 36 Pieds quarrez, & ayant été appelé *Pied de toise quarrée*, parce qu'il a un Pied de largeur sur une Toise de longueur.

Pareillement on appelle *Pouce de Pied quarré* un Rectangle, dont la Superficie contient douze Ponces quarrez, comme le Pied courant contient douze Ponces courans, ce Rectangle étant mis dans la pratique à la place d'un Pied quarré, qui vaut 144 Ponces quarrez, & ayant été appelé *Pouce de pied quarré*, parce qu'il a un Pouce de largeur sur un Pied de longueur.

On appelle de la même façon *Ligne de Pouce quarré* un Rectangle, dont l'aire contient douze Lignes quarrées, comme le Pouce courant contient douze Lignes courantes, ce Rectangle étant mis dans la pratique à la place d'un Pouce quarré, qui vaut 144 Lignes quarrées, & ayant été appelé *Ligne de pouce quarré*, parce qu'il a une Ligne de largeur sur un Pouce de longueur.

On doit appeler de la même maniere *Pouce de Toise quarrée* un Rectangle, dont la largeur est d'un Pouce, & la longueur d'une Toise, ou de 72 Ponces, & dont l'aire par conséquent est de 72 Ponces quarrez, tout de même que la Toise courante est de 72 Ponces courans: & *Ligne de Toise quarrée* un Rectangle, dont la largeur est d'une Ligne, & la longueur d'une Toise, ou de 864 Lignes, & dont par conséquent l'aire est de 864 Lignes quarrées, tout de même que la Toise courante est de 864 Lignes courantes. Ainsi des autres.

Cela fait dire aux Arpenteurs, que des Toises courantes multipliées par des Toises courantes, produisent des *Toises quarrées*: & que pareillement des Pieds courans multipliez par des Pieds courans produisent des *Pieds quarrez*: & ainsi des autres. Mais que des Toises courantes multipliées par des Pieds courans, produisent des *Pieds de Toise quarrée*: & que pareillement des Pieds courans multipliez par des Ponces courans, produisent des *Ponces de Pied quarré*: & de la même façon que des Ponces courans multipliez par des Lignes courantes, produisent des *Lignes de Pouce quarré*: & ainsi des autres.

## CHAPITRE I.

*Des Théorèmes.*

QUoique les Problèmes de la Planimetrie soient faciles dans l'exécution, la Theorie neanmoins en est tres-profonde: c'est pourquoy pour en rendre la pratique plus aisée & moins embrouillée, j'ay crû que je devois mettre la Theorie à part, afin que ceux qui ne veulent pas travailler à l'aveugle, y puissent trouver les démonstrations de toutes les pratiques qui seront enseignées dans la suite, & que ceux qui se contentent de la seule pratique, la trouvent dégagée de la Theorie, & ainsi la puissent comprendre plus facilement.

## THEOREME I.

*L'Aire d'un Triangle rectiligne est quatrième proportionnelle au Sinus Total, à la Tangente de la moitié de l'un des trois angles, & au Rectangle sous la moitié du contour du Triangle, & l'excès de cette moitié sur le côté opposé au même angle.*

Plan-  
che 14.  
113. Fig.

JE dis que la Raïson du Sinus Total à la Tangente de la moitié de l'angle C, du Triangle ABC, est égale à celle du Rectangle sous la moitié du contour, c'est à dire la moitié de la somme des trois côtés du Triangle ABC, & l'excès de cette moitié sur le côté AB opposé au même angle C, à l'aire du Triangle ABC.

## P R E P A R A T I O N .

Inscrivez par 4. 4. dans le Triangle ABC, le cercle EFG, dont les trois Rayons DE, DF, DG, qui passent par les points d'attouchement E, F, G, seront perpendiculaires aux côtés qu'ils coupent, par 12. 3. de sorte que tous les angles qui se font par ces Rayons aux points d'attouchement E, F, G, seront droits, & les deux lignes AE, AG, seront égales entre elles, parce qu'elles sont deux touchantes du cercle tirées du même point A, ce qui fait que par 36. 3. le Quarré de chacune est égal à un même Rectangle, outre que les deux Triangles rectangles AGD, AED, sont égaux entre eux, &c. On connoîtra par un semblable raisonnement, que les deux lignes BE, BF, sont égales entre elles, aussi bien que les deux

deux CF, CG. D'où il est aisé de conclure que les trois lignes AE, BE, CF, ou seulement les deux AB, CF, sont ensemble égales à la moitié du contour du Triangle ABC, & que par conséquent CF, ou CG est l'excès de la moitié de ce contour sur le côté BC. Ainsi nous avons à démontrer, que le Sinus Total est à la Tangente de l'angle ACD, ou BCD, moitié de l'angle ACB, *par constr.* comme le Rectangle sous CF, ou GG, & la moitié du contour du Triangle ABC, à l'Aire du même Triangle ABC.

## D É M O N S T R A T I O N.

Dans le Triangle CGD rectangle en G, le Sinus Total est à la Tangente de l'angle GCD, comme CG, à DG, *par Theor. 1. Chap. 1. L. 2. Trigon.* c'est pourquoy si l'on donne aux deux derniers termes CG, DG, la moitié du contour du Triangle ABC, pour hauteur commune, on connoitra par 1. 6. que le Sinus Total est à la Tangente de l'angle GCD, comme le Rectangle sous CG, & la moitié du contour est au Rectangle sous DG & la moitié du contour, c'est à dire à l'Aire du Triangle ABC, parce que par 41. 1. le Triangle ADC est égal au Rectangle sous DG & la moitié de AC, & que pareillement le Triangle CDB est égal au Rectangle sous DE égale à DG, & la moitié de BC, & aussi le Triangle ADB égal au Rectangle sous DE égale à DG, & la moitié de AB. Ce qu'il falloit démontrer.

## T H E O R E M E II.

*L'Aire d'un Triangle rectiligne est moyenne proportionnelle entre le Rectangle sous la moitié de son contour & l'excès de cette moitié, sur un côté, & le Rectangle sous les deux excès de la même moitié sur chacun des deux autres côtés.*

Je dis que l'Aire du Triangle ABC est moyenne proportionnelle entre le Rectangle sous la moitié de son contour, ou la moitié de la somme de ses trois côtés, & l'excès de cette moitié sur le côté AB, & le Rectangle sous les deux excès de la même moitié sur chacun des deux autres côtés AC, BC. 113. Fig.

## P R É P A R A T I O N.

Ayant inscrit comme auparavant, au Triangle ABC, le cercle EFG, dont le centre est D, ajoutez au côté AC la ligne AH



AH égale à la ligne BE, ou DF, & la ligne HL égale à la ligne AE, ou AG, & alors la ligne AL sera égale au côté AB. Ajoutez aussi au côté BC, la ligne BI égale à la ligne AE, ou AG, & alors la ligne CI sera égale à la ligne CH, chacune étant égale à la moitié du contour du Triangle ABC : car comme nous avons reconnu au *Theor.* 1. que les deux lignes AB, CF, étoient ensemble égales à la moitié du contour, on connoitra de la même façon que la somme des deux AC, BE, ou des deux AC, AH, ou bien la seule ligne CH est la moitié du contour, & que pareillement la somme des deux BC, AE, ou des deux BC, BI, ou bien la seule ligne CI est la moitié du contour, parce que nous avons reconnu que CF, ou CG, est l'excès de la moitié du contour sur le côté AB, & l'on connoitra pareillement que BE ou BF est l'excès de la moitié du contour sur le côté AC, & que AE, ou AG est l'excès de la moitié du contour sur le côté BC. Ainsi nous avons à démontrer que l'Aire du Triangle ABC est moyenne proportionnelle entre le Rectangle sous les lignes AB, CF, & le Rectangle sous les lignes AE, BE, ce que nous ferons après avoir tiré du point H, à la ligne CH, la perpendiculaire HK, qui coupe icy la ligne CD prolongée au point K, par où l'on tirera les droites KA, KB, & encore la droite KI qui sera perpendiculaire à la droite CI, & égale à la droite KH, à cause des deux Triangles rectangles égaux CHK, CIK, par 4. 1. ce qui fait que les deux KHL, KIB, sont aussi égaux entre eux, par 4. 1. aussi bien que les deux ABK, ALK, par 8. 1. & que par conséquent l'angle KAL, est égal à l'angle KAB; c'est à dire que la ligne AK divise en deux également l'angle LAB, comme l'angle EDG est divisé en deux également par la droite AD, à cause des deux Triangles rectangles égaux AED, AGD. D'où il suit que l'angle ADE est égal à l'angle HAK : car à cause des deux angles droits E, G, les deux angles oppoiez GAB, GDE, du Quadrilatere AEDG, seront ensemble égaux à deux droits, par 32. 1. & par conséquent égaux aux deux GAB, HAB, qui ensemble valent aussi deux droits, par 13. 1. c'est pourquoy en ôtant de chaque côté l'angle commun GAB, il restera l'angle GDE égal à l'angle HAB, & la moitié ADE égale à la moitié HAK; ce qui rend semblables les deux Triangles rectangles AED, AHK : c'est pourquoy par 4. 6. les quatre lignes DE, AE, AH, KH, sont proportionnelles, & par 16. 6. le Rectangle des deux extrêmes DE, KH, est égal au Rectangle des deux moyennes AE, AH, ou AE, BE.

## D É M O N S T R A T I O N.

Si du Triangle CHK rectangle en H, on prend le côté CH, ou la moitié du contour pour le Sinus Total, l'autre côté HK de-

deviendra la Tangente de l'angle HCK moitié de l'angle ACB, *Plan-*  
comme l'on connoitra en décrivant du point C, par le point che 14.  
I, l'arc de cercle HM : & parce que par Theor. 1. le Sinus To- 119. Fig.  
tal CH, ou la moitié du contour, est à la Tangente KH,  
comme le Rectangle sous CF & la moitié du contour, au  
Triangle ABC, si aux deux premiers termes, sçavoir à la moi-  
tié du contour & à la ligne KH, on donne la hauteur commu-  
ne DE, on connoitra par 1. 6. que le Rectangle sous la moi-  
tié du contour & la ligne DE, c'est à dire le Triangle ABC,  
comme vous avez vû au Theor. 1. est au Rectangle des lignes  
KH, DE, ou au Rectangle des lignes AE, BE, comme le  
Rectangle sous la moitié du contour & la ligne CF, au  
Triangle ABC, & (que par conséquent le Triangle ABC est  
moyen proportionnel entre le Rectangle sous la moitié du  
contour & la ligne CF, & le Rectangle sous les lignes AE,  
BE. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME III.

*L'Aire d'un Triangle rectiligne rectangle, est égale au  
Rectangle sous la moitié de son contour, & l'excès de  
cette moitié sur l'hypoténuse : ou bien au Rectangle sous  
les deux excès de la même moitié sur chacun des deux côtés.*

LA démonstration de ce Theorème sera évidente, si nous  
avons une fois démontré que la moitié du contour d'un Tri-  
angle rectangle, & les trois excès de cette moitié sur les deux côtés,  
& l'hypoténuse sont quatre quantitez proportionnelles, ce que  
nous avons premierement decouvert par la Synthèse, & ensui-  
te démontré par l'Analyse, comme vous allez voir.

Pour donc connoître, si en ôtant séparément de la moi-  
tié du contour  $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ , du Triangle rectangle  $a$ ,  
 $b$ ,  $c$ , les deux côtés  $a$ ,  $b$ , & l'hypoténuse  $c$ , cette moitié  
 $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ , & les trois restes ou excès  $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}$   
 $b + \frac{1}{2}c$ ,  $\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ ,  $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$ , sont  
quatre quantitez proportionnelles, on raisonnera de la  
sorte.

## SYNTHESE.

Si  $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ ,  $-\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c :: \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b +$   
 $\frac{1}{2}c$ ,  $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$ , aussi en doublant tous les termes,  $a + b + c$

— $a+b+c::a-b+c, a+b-c$ , & en prenant les quarréz de tous les termes,  $aa+2ab+bb+2ac+2bc+cc, aa-2ab+bb-2ac+2bc+cc::aa-2ab+bb+2ac-2bc+cc, aa+2ab+bb-2ac-2bc+cc$ , & en mettant  $aa+bb$  à la place de  $cc$ , on aura cette autre Analogie,  $2aa+2bb+2bc+2ab+2ac, 2aa+2bb+2bc-2ab-2ac::2aa+2bb-2bc-2ab+2ac, 2aa+2bb-2bc+2ab-2ac$ , & en prenant la moitié de tous les termes,  $aa+bb+bc+ab+ac, aa+bb+bc-ab-ac::aa+bb-bc-ab+ac, aa+bb-bc+ab-ac$ , & en composant,  $2aa+2bb+2bc, aa+bb+bc+ab+ac::2aa+2bb-2bc, aa+bb-bc-ab+ac$ , & en prenant les moitez des antecedens,  $aa+bb+bc, aa+bb+bc+ab+ac::aa+bb-bc, aa+bb-bc-ab+ac$ , & en divisant,  $ab+ac, aa+bb+bc::ab+ac, aa+bb-bc$ , & en permutant  $ab+ac, -ab+ac::aa+bb+bc, aa+bb-bc$ , & en divisant,  $2ab, ab+ac::2bc, aa+bb+bc$ , & en prenant les moitez des antecedens,  $ab, ab+ac::bc, aa+bb+bc$ , & en mettant  $cc$  à la place de  $aa+bb$ , on aura cette autre Analogie moins composée  $ab, ab+ac::bc, cc+bc$ , & enfin en divisant les deux premiers termes par  $a$ ; & les deux derniers par  $c$ , on aura cette dernière Analogie,  $b, b+c::b, c+b$ , laquelle étant connue, servira pour faire la démonstration par l'Analyse en cette sorte.

## ANALYSE.

Si l'on fait cette Analogie,  $b, b+c::b, c+b$ , & qu'on multiplie les deux premiers termes par  $a$ , & les deux derniers par  $c$ , on aura cette autre Analogie,  $ab, ab+ac::bc, cc+bc$ , & si à la place de  $cc$ , on met  $aa+bb$ , on aura celle-ci,  $ab, ab+ac::bc, aa+bb+bc$ , & en doublant les antecedens,  $2ab, ab+ac::2bc, aa+bb+bc$ , & en divisant,  $ab+ac, -ab+ac::aa+bb+bc, aa+bb-bc$ , & en permutant,  $ab+ac, aa+bb+bc::-ab+ac, aa+bb-bc$ , & en composant,  $aa+bb+bc, aa+bb+bc+ab+ac::aa+bb-bc, aa+bb-bc-ab+ac$ , & en doublant les antecedens,  $2aa+2bb+2bc, aa+bb+bc+ab+ac::2aa+2bb-2bc, aa+bb-bc-ab+ac$ , & en divisant,  $aa+bb+bc+ab+ac, aa+bb+bc-ab-ac::aa+bb-bc-ab+ac, aa+bb-bc+ab-ac$ , & en doublant tous les termes,  $2aa+2bb+2bc+2ab+2ac, 2aa+2bb+2bc-2ab-2ac::2aa+2bb-2bc-2ab+2ac, 2aa+2bb-2bc+2ab-2ac$ , & en mettant  $1cc$  à la place de  $2aa+2bb$ , on aura cette autre Analogie,  $aa+bb+cc+2bc+2ab+2ac, aa+bb+cc-2ab-2ac+2bc::aa+bb+cc-2bc-2ab+2ac, aa+bb+cc+2bc+2ab-2ac$ , & en prenant la Racine quarrée de chaque terme,  $a+b+c, -a+b+c::a-b+c, a+b-c$ , & enfin en prenant les moitez de tous les termes,

mes,  $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ ,  $-\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c :: \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ ,  $-\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$ . Ce qu'il falloit premièrement démontrer.

DEMONSTRATION.

Parce que la moitié du contour du Triangle rectangle est à l'excès de cette moitié sur l'un des deux côtés, comme l'excès de la même moitié sur l'autre côté, à l'excès de cette moitié sur l'hypoténuse, comme il vient d'être démontré, il s'ensuit par 16. 6. que le Rectangle sous la moitié du contour & l'excès de cette moitié sur l'hypoténuse, est égal au Rectangle sous les deux excès de cette moitié sur chacun des deux côtés : & parce que l'Aire du même Triangle est moyenne proportionnelle entre ces deux Rectangles égaux, par Theor. 2. il est de nécessité qu'elle soit égale à chacun de ces deux Rectangles. Ce qu'il falloit démontrer.

THEOREME IV.

*L'Aire d'un Trapezoïde est la moitié du Rectangle sous la somme des deux côtés parallèles, & la perpendiculaire tirée entre ces deux côtés.*

JE dis que l'Aire du Trapezoïde ABCD, dont les deux côtés AB, CD, sont parallèles, est égale à la moitié du Rectangle qui a pour longueur la somme des deux côtés parallèles AB, CD, & pour largeur la perpendiculaire DE tirée entre ces deux côtés parallèles AB, CD. Plan. 14. Fig.

DEMONSTRATION.

Si à la Diagonale DB, on tire par le point C, la parallèle CF, qui rencontre en F le côté AB prolongé, & qu'on joigne la droite DF, on connoîtra par 37. 1. que le Triangle CDF est égal au Triangle CBF, c'est pourquoi si de chacun on ôte le Triangle CGF, on aura le Triangle CGD égal au Triangle BGF, & si l'on ajoute à chacun de ces deux Triangles égaux CGD, BGF, le Trapeze ABGD, on connoîtra que le Trapezoïde ABCD est égal au Triangle ADF, c'est à dire par 41. 1. à la moitié du Rectangle sous la perpendiculaire DE, & la somme AF des deux côtés parallèles AB, CD, parce que la figure BFCD étant un Parallelogramme, par constr. les deux côtés opposés BF, CD, sont égaux entre eux, par 34. 1. Ce qu'il falloit démontrer.

THEO.

## THEOREME V.

*L'Aire d'un Polygone regulier est la moitié du Rectangle sous son contour , & la perpendiculaire tirée du centre sur un côté.*

117. Fig. JE dis que l'Aire du Pentagone regulier ABCDE est la moitié du Rectangle sous son contour ou circonference AL , & la perpendiculaire FG tirée du centre F sur le côté AB.


## DEMONSTRATION.

Parce que la ligne AL represente la circonference du Pentagone ABCDE, si on la divise en autant de parties égales que ce Polygone a de côtez, comme icy en cinq aux points H, I, K, chaque partie sera égale au côté du Pentagone, & si l'on tire au centre F, par les points H, I, K, L, autant de lignes droites, on aura le grand Triangle AFL composé d'autant de Triangles égaux entre eux que ceux du Pentagone ABCDE, qui se font à son centre. D'où il suit que ce Pentagone ABCDE est égal au Triangle AFL, c'est à dire par. 41. 1. à la moitié du Rectangle sous le contour AL, & la perpendiculaire FG. Ce qu'il falloit démontrer.




## THEOREME VI.

*Si par un point de la circonference d'une Parabole quarrée, il passe en dedans une ordonnée à un Diametre, & en dehors une ligne droite qui coupe ce Diametre en un point autant éloigné du sommet que l'ordonnée ; cette ligne droite touchera la circonference de la Parabole en ce point.*

Planche 14. 115. Fig. JE dis que si par le point A de la circonference de la Parabole quarrée ABC, il passe en dedans, l'ordonnée AD au Diametre BD, & en dehors, la droite AE, qui coupe le Diametre BD prolongé au point E autant éloigné du sommet B que le point D, cette ligne droite AE touchera la Parabole ABC au point A, de sorte qu'elle ne la rencontrera pas en un autre point, comme seroit F.



n8.



## P R E P A R A T I O N .

Car si l'on veut que la droite AE rencontre la circonferen-  
ce ABC encore au point F, que l'on imagine par ce point F  
l'ordonnée FG au Diametre BD, & que l'on fasse BH égale  
à BG, pour avoir EH égale à DG, à cause des deux lignes  
égales BD, BE, *par supp.*

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que *par Déf. 36.* on a cette Analogie  $BG, BD::FGq, ADq$ , en doublant les deux premiers termes BG, BD, on aura celle-cy,  $GH, DE::FGq, ADq$ , & si l'on donne aux deux premiers termes BG, BD, la hauteur commune DE, on aura celle-cy,  $DEGH, DEq::FGq, ADq$ , & si à la place des deux derniers termes FGq, ADq, on met les deux GEq, DEq, qui sont en même raison, à cause des Triangles semblables FGE, ADE, on aura cette autre Analogie,  $DEGH, DEq::GEq, DEq$ , où les deux conséquens étant égaux, les deux antecédens sçavoir le Rectangle DEGH, & le Quarré GE seront égaux aussi, & *par 17. 6.* on aura cette Analogie,  $DE, GE::GE, GH$ , & en divisant on aura celle-cy  $DG, GE::EH, GH$ , dont les deux antecédens DG, EH, étant égaux, les deux conséquens GE, GH, doivent être pareillement égaux, ce qui étant impossible, il est impossible aussi que la ligne AE rencontre la Parabole ABC ailleurs qu'au point A: c'est pourquoy elle la touche en ce même point A: *Ce qu'il falloit démontrer.*

## S C O L I E .

Le Theorème inverse est aussi veritable, sçavoir que si la droite AE touche la Parabole ABC au point A, les deux lignes BD, BE, seront égales entre elles, parce que si l'une de ces deux lignes, comme BD étoit plus grande que BE, qu'on en retranche BI égale à BE, & que par le point I, l'on tire au Diametre BD l'ordonnée IK, & alors la droite EK touchera la Parabole ABC au point K, selon la démonstration précédente: & parce que l'on suppose que la droite AE la touche aussi au point A, ces deux touchantes AE, KE, doivent nécessairement se rencontrer proche les points d'atouchement A, K, au dehors de la Parabole, & comme elles se rencontrent aussi au point E, elles renfermeront une figure, ce qui étant impossible, il est impossible aussi que les deux parties BD, BE, soient inégales.



THEOREME VII.

*Si par un point de la circonférence d'une Parabole cubique, il passe en dedans une ordonnée à un Diametre, & en dehors une ligne droite qui coupe ce Diametre en un point, dont la distance au sommet soit double de celle de l'ordonnée, cette ligne droite touchera la circonférence de la Parabole au même point.*

Plan-  
che 15.  
Fig. 118.

JE dis que si par le point A de la circonférence de la Parabole cubique ABC, il passe en dedans, l'Ordonnée AD au Diametre BD, & en dehors la droite AE, qui coupe le Diametre BD prolongé au point E, en sorte que la partie BE soit double de la partie DB, cette ligne droite AE touchera la Parabole ABC au point A, c'est à dire qu'elle ne la rencontrera pas en quelqu'autre point, comme seroit F.

PREPARATION.

Car si l'on veut que la droite AE rencontre la circonférence ABC encore au point F, que l'on imagine par ce point F, l'ordonnée FG au Diametre BD, & que l'on fasse BH double de BG, pour avoir GH triple de BG, comme DE est triple de BD.

DEMONSTRATION.

Parce que par la propriété de cette Parabole solide, on a cette Analogie, BG, BD:: FG, AD, en triplant les deux premiers termes BG, BD, on aura celle-cy, GH, DE:: FG, AD, & si à la place des deux derniers termes FG, AD, on met les deux GE, DE, qui sont en même Raison, à cause des Triangles semblables FGE, ADE, on aura cette autre Analogie, GH, DE:: GE, DE, & en donnant aux deux premiers termes GH, DE, le carré DE pour base, on aura celle-cy, GHDE, DE:: GE, DE, où les deux conséquens étant égaux, les deux antécédens, sçavoir le solide sous GH & le carré DE, & le cube GE, seront égaux aussi, ce qui est impossible, parce qu'il s'ensuivroit que la ligne BD seroit égale à la partie BG, comme vous avez vu.

Si l'on met a pour AD, b pour FG, c pour BD, & d pour BG, on aura 1d pour GH, 3c pour DE, & 2c+d pour GE, dont le cube est  $8c^3 + 12acd + 6cdd + d^3$ , & parce que le solide GHDE, ou  $27ecd$  doit être égal au cube DE, on aura cette Equation,  $27ecd = 8c^3 + 12acd + 6cdd + d^3$ , ou  $d^3 + 6cdd - 15ecd + 8c^3 = 0$ , laquelle étant divisée par  $dd + 7cd - 8c$ , donne

donne celle-cy, *d-c-o*, ou *d-o-c* ou BG en BD, ce qui <sup>Plan-</sup> étant impossible, il est impossible aussi que le solide GHDE <sup>che 17.</sup> soit égal au Cube DE, & que par conséquent la droite AE ren- <sup>118. Fig.</sup> contre la Ligne Parabolique ABC, ailleurs qu'au point A; d'où il suit qu'elle la touche en ce point A. *Ce qu'il falloit dé-*  
*monstrer.*

## S C O L I E.

Le Théorème inverse est aussi véritable, sçavoir que si la droite AE touche la Parabole ABC au point A, la partie BE sera double de la partie BD, parce que si ce-  
la étoit autrement, comme si BD est plus grande que la moitié de BE, que l'on fasse BI égale à la moitié de BE, & que par le point I, l'on tire au Diamètre BD l'ordonnée IK, & alors la droite EK touchera la Parabole ABC au point K, selon la démonstration précédente, ce qui est impossible, parce que la ligne AE, qui part du même point E, est une touchante *par supp.* comme vous avez déjà vu au Theor. 6.

A l'imitation des deux démonstrations précédentes, on connoîtra facilement que la partie BE est triple de la partie correspondante BD dans une Parabole carré-quarrée, & qu'elle est quadruple dans une Parabole d'un degré plus élevé, & ainsi ensuite. Ainsi vous voyez que dans toutes ces Paraboles infinies, la propriété de la touchante est telle que la partie BD est à la partie correspondante BE, comme l'unité est aux nombres naturels 1, 2, 3, 4, &c. Ce qu'il est bon de remarquer, parce que cela nous servira dans la suite.

## THEOREME VIII.

Plan-  
che 15.  
119. Fig.

Si de la Ligne courbe  $ABCD$ , dont un Diametre est  $AE$ , & la touchante au sommet  $A$ , est  $AS$ , parallele à l'ordonnée  $DE$ ; l'on forme sur le même Diametre  $AE$ , la courbe  $AIOM$ , dont une ordonnée, comme  $HI$  soit égale à la partie  $AF$  de la touchante au sommet  $AS$ , terminée en  $F$  par la touchante correspondante  $BF$ ; & pareillement l'ordonnée  $EM$  égale à la partie  $AG$  de la même touchante au sommet  $AS$ , terminée en  $G$  par la touchante correspondante  $DG$ , & ainsi des autres, & que l'on tire la droite  $AD$ , cette droite  $AD$  retranchera le Segment  $ADCBA$  égal à la moitié de l'espace correspondant  $AEMOIA$ .

## PREPARATION.

Faites la ligne  $DQ$  égale à la touchante  $AG$ , & joignez la droite  $AQ$ , qui sera égale & parallele à la touchante  $DG$ , par 33. 1. tellement que la figure  $AGDQ$  sera un Parallelogramme. Prenez par pensée sur la courbe  $ABCD$ , le point  $C$  infiniment proche du point  $D$ , auquel cas la partie  $CD$  pourra passer pour une ligne droite, & par conséquent pour une partie de la touchante  $DG$ , & tirez par ce point  $C$ , la ligne  $CL$  parallele à la ligne  $DM$ , & la ligne  $CR$  parallele au Diametre  $AE$ , & encore par les points  $M$ ,  $N$ , les droites  $LM$ ,  $NP$ , paralleles au même Diametre  $AE$ . Enfin joignez la droite  $AC$ .

## DEMONSTRATION.

Parce que les deux lignes paralleles  $DM$ ,  $CL$ , sont supposées infiniment proches, les deux points  $L$ ,  $O$ , sont aussi infiniment proches, ce qui fait que la figure mixtiligne  $MOKE$  sera la même que le Parallelogramme  $EMLK$ : & parce que la ligne  $EM$  est par la generation de la courbe  $AIOM$ , égale à la ligne  $AG$ , ou  $CN$ , le Parallelogramme  $EMLK$ , ou la figure mixtiligne  $EMOK$ , est par 36. 1. égale au Parallelogramme  $PNCR$ , ou par 35. 1. au Parallelogramme  $QNCD$ , c'est à dire par 41. 1. au double du Triangle  $ACD$ . D'où il est aisé de conclure, en tirant d'autres paralleles, & d'autres lignes correspondantes du point  $A$ , que toutes les figures mixtilignes, dont la figure  $AEMI$  est composée, sont doubles de tous les Triangles correspondans, dont tout le Segment  $ADCBA$  est composé, & que par conséquent la figure  $AEMI$  est double de la figure  $ADCBA$ . Ce qu'il falloit démontrer.

S c o

## S C O L I E.

Si par le point D, on tire la ligne DS parallèle au Diamètre AE, & qu'on fasse la courbe ANPQ semblable à la courbe AIOM, la courbe proposée ABCD divitera en deux également l'espace AQDS, c'est à dire que les deux espaces AQDB, ABDS, seront égaux entre eux.

## P R E P A R A T I O N.

Prenez comme auparavant, sur la courbe ABCD, le point C, infiniment proche du point D, & tirez par ce point C, la droite TR parallèle au Diamètre AE, ou à la ligne DS. Joignez encore la droite GQ, qui sera parallèle au Diamètre AE, ou à la ligne TR, à cause des deux lignes égales AG, EQ, par la generation de la courbe ANPQ.

## D I M O N S T R A T I O N.

Parce que les Triangles GQD, CRD, sont semblables, on connoît par 4. 6. que les quatre lignes DR, CR, DQ, GQ, ou DS, sont proportionnelles, & par 16. 6. que le Rectangle des deux extrêmes DR, DS, c'est à dire le Parallelogramme RDST, est égal au Rectangle des deux moyennes CR, DQ, c'est à dire à la figure mixtiligne DCPQ, qui peut passer pour un Parallelogramme : c'est pourquoy si de chacun de ces deux Plans égaux on ôte le Triangle commun CRD, il restera le Trapeze CDST égal au Trapeze QRCP. D'où il est aisé de conclure en tirant d'autres paralleles, que tous les Trapezes qui composent la figure ABDS, sont égaux à tous les Trapezes correspondans qui composent la figure AQDB, & que par conséquent ces deux figures AQDB, ABDS, sont égales entre elles. Ce qu'il falloit démontrer.

## C O R O L L A I R E.

Il s'ensuit que si l'on décrit la nouvelle courbe AXV, telle que la partie MV soit double de la partie correspondante QD, & pareillement la partie OX double de la partie correspondante PC, & ainsi des autres ; l'espace AEVX est égal au Parallelogramme AEDS, à cause des deux espaces égaux AEMO, AEQP, par constr. & des deux égaux AMVX, AQDS, chacun étant double de l'espace AQDC, parce que le premier AMVX a ses lignes doubles de celles de l'espace AQDC, par constr. & que le second AQDS, a été démontré double du même espace AQDC. D'où il suit que les trois espaces AMV, MAQ, AQDS, sont égaux entre eux, &c.

## THEOREME IX.

*La Parabole quarrée est à un Parallelogramme de même base & de même hauteur, comme 2. est à 3.*

Plan-  
che 15.  
121 Fig.

J E dis que si ABD est la circonference d'une Parabole quarrée, dont un Diametre soit AE, & une ordonnée à ce Diametre soit ED, l'Espace Parabolique AEB est au Parallelogramme AEDS décrit sur la même base DE, & sur la même hauteur AE, comme 2 est à 3.

## PREPARATION.

Formez de la courbe ABD, la Courbe AIM, par Theor. 8. où nous avons démontré que l'espace AEMI est double du Segment Parabolique ADB, & tirez par le point D, la touchante DF, que vous prolongerez jusqu'au Diametre en C, & alors la ligne AF sera égale à la ligne EM, par la generation de la courbe AIM, & la ligne AC égale à la ligne AE, par Theor. 7.

## DEMONSTRATION.

Parce que les Triangles CAF, CED, sont équiangles, & que le côté CE est double du côté CA, par la propriété de la touchante de cette Parabole, le côté ED sera aussi double du côté AF, ou EM son égale, par la generation de la courbe AIM: & l'on démontrera de la même façon, en tirant d'autres touchantes, que toutes les ordonnées de l'espace AEDB sont doubles de toutes les ordonnées correspondantes de l'espace AEMI, & que par conséquent l'espace AEDB est double de l'espace AEMI, lequel étant double de l'espace ADB, par Theor. 8. l'espace AEDB sera quadruple de l'espace ADB, & le Triangle ADE triple par conséquent du même Segment ADB: c'est pourquoy le Parallelogramme AEDS, qui est double de ce Triangle, par 34. 1 sera sextuple du Segment Parabolique ADB; & comme l'espace Parabolique AEDB est quadruple de ce Segment, il s'ensuit que la Parabole AEDB est au Parallelogramme AEDS, comme 4 est à 6, ou comme 2 à 3. Ce qu'il falloit démontrer.

## SCOLIES.

Parce que le Triangle ADE, ou ADS, est triple du Segment Parabolique ADB, il s'ensuit que l'espace ABDS, que nous appel-

appellerons *Complément Parabolique*, est double du même Segment ADB : & parce que le Parallelogramme AEDS est sextuple du Segment ADB, il s'ensuit que le Complément Parabolique ABDS est au Parallelogramme AEDS, comme 2 est à 6, ou comme 1 à 3.

Plan-  
che 15.  
121. Fig.

Lorsque la Parabole ABD sera solide, on connoitra par un raisonnement semblable au precedent, que l'Espace Parabolique AEDB est au Parallelogramme AEDS, comme 3 est à 4, comme vous allez voir.

Parce que les Triangles CAF, CED, sont équiangles, & que le côté CE est au côté CA, comme 3 est à 2, à cause de AC double de AE, par la propriété de la Touchante de cette Parabole, le côté ED sera aussi au côté AF, ou EM, comme 3 est à 2 : & l'on connoitra de la même maniere, en tirant d'autres Touchantes, que toutes les ordonnées de l'espace AEDB sont à toutes les ordonnées correspondantes de l'espace AEMI, comme 3 est à 2, & que par conséquent l'espace AEDB est à l'espace AEMI, comme 3 est à 2, & à sa moitié ADB, comme 3 est à 1, c'est à dire que l'espace Parabolique AEDB est triple du Segment Parabolique ADB, & le Triangle ADE double du Segment ADB : c'est pourquoy le Parallelogramme AEDS sera quadruple du Segment ADB. Puisque donc le Parallelogramme AEDS est quadruple du Segment ADB, & que l'espace Parabolique AEDB est quadruple du même Segment ADB, il s'ensuit que la Parabole solide AEDB est au Parallelogramme AEDS, comme 3 est à 4.

Parce que le Triangle ADE, ou ADS, est double du Segment ADB, il s'ensuit que le complément Parabolique ABDS est égal au même Segment ADB : & parce que le Parallelogramme AEDS est quadruple du Segment ADB, il sera aussi quadruple du Segment Parabolique ABDS, c'est à dire que dans la Parabole solide, le Segment Parabolique ABDS est au Parallelogramme AEDS, comme 1 à 4.

Lorsque la Parabole ABD sera quarré quarrée, on connoitra par un raisonnement semblable au precedent, que la Parabole AEDB est au Parallelogramme AEDS, comme 4 est à 5, & que le Complément Parabolique ABDS est au même Parallelogramme AEDS, comme 1 à 5 : & lorsque la Parabole sera d'un degré plus élevé, la Parabole sera à son Parallelogramme, comme 5 à 6, & le Segment Parabolique au même Parallelogramme, comme 1 à 6. Ainsi vous voyez que dans une suite infinie de Paraboles de differens degrez, les Paraboles sont à leurs Parallelogrammes de même base & de même hauteur, comme 2 à 3, comme 3 à 4, comme 4 à 5, comme 5 à 6, & ainsi ensuite, & que les compléments Paraboliques sont aux mêmes Parallelogrammes comme 1 à 3, à 4, à 5, à 6, &c. à cause de la propriété de

Plan-  
chr 15.  
121 Fig. la touchante de toutes ces Paraboles, qui est que AF, ou EM, est à ED, comme 1 à 2, comme 2 à 3, comme 3 à 4, comme 4 à 5, &c. Ce qui fait que les espaces Paraboliques AEMI, AEDB, sont aussi dans cette Raison.

## THEOREME X.

*La somme des quantitez infinies en Progression arithmetique, en commençant depuis 0, est égale à la moitié du produit sous la plus grande & le nombre qui exprime la multitude de toutes ces quantitez.*

122. Fig. **P**our la démonstration de ce Theorème, on considerera la plus grande de toutes les quantitez arithmetiquement proportionnelles, comme la base AC du Triangle rectangle ABC, & le nombre de leur multitude comme la hauteur AB, en supposant que cette hauteur AB est divisée en une infinité de parties égales, & en faisant passer par les points de division autant de lignes droites paralleles à la base AC, lesquelles on prendra pour les quantitez en progression arithmetique, parce qu'effectivement elles sont arithmetiquement proportionnelles, comme étant les côtes homologues d'une infinité de Triangles semblables entre eux & au Triangle ABC, ce qui fait qu'elles sont comme les hauteurs BE, BF, BG, BH, &c. qui sont en progression arithmetique; & comme toutes ces lignes paralleles, dont la plus petite est 0, ou le point B, & la plus grande est AC, accomplissent tout le Triangle ABC, qui par 41. 1. est la moitié du Rectangle ABDC, dont l'aire est égale au produit sous la base AC & la hauteur AB, il s'en suit que la moitié du produit sous la plus grande quantité AC & le nombre AB de la multitude des quantitez arithmetiquement proportionnelles est égal à leur somme, que le Triangle ABC represente. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME XI.

*La somme des Quarrez des quantitez infinies en progression arithmetique, en commençant depuis 0, est égale au tiers du produit sous le plus grand Quarré & le nombre qui exprime la multitude de toutes ces quantitez.*

**J**E dis que la somme des Quarrez 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, &c. des nombres naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, &c. qui representent des quantitez en progression arithmetique, est égale au tiers du produit sous le plus grand  
de

de tous ces Quarrez, & le nombre qui en exprime la multitude.

Plan-  
che 17.  
322. Fig.

DEMONSTRATION.

Si l'on considère par exemple les trois premiers Quarrez 0, 1, 4, dont la somme est 5, laquelle si le nombre des Quarrez étoit infini, devroit être égale au tiers du produit 12 sous le plus grand Quarré 4, & le nombre 3 de leur multitude : & comme le tiers de ce produit 12, n'est que 4, au lieu qu'il devroit être 5, la différence 1, qui est  $\frac{1}{5}$  de la véritable somme 5, &  $\frac{1}{4}$  de la fausse somme 4, est assez considérable dans ce nombre de trois Quarrez seulement.

Si l'on considère un plus grand nombre de Quarrez, par exemple les dix premiers Quarrez, 0, 1, 4, 9, 16, 25, dont la somme est 55, cette somme devroit être égale au tiers du produit 150, sous le plus grand Quarré 25, & le nom-

$$\begin{array}{r} 0 \text{ ——— } 0 \\ 1 \text{ ——— } 1 \\ 4 \text{ ——— } 4 \\ \hline \text{Somme } 5 \end{array} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{r} 3 \text{ ——— } 9 \\ 4 \text{ ——— } 16 \\ 5 \text{ ——— } 25 \\ \hline \text{Somme } 55 \end{array} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{r} 6 \text{ ——— } 36 \\ 7 \text{ ——— } 49 \\ 8 \text{ ——— } 64 \\ \hline \text{Somme } 204 \end{array} \quad \frac{1}{17} \quad \frac{1}{16}$$

bre 6 de leur multitude : & comme le tiers de ce produit 150, n'est que 50, au lieu qu'il devroit être 55, la différence 5, qui est  $\frac{1}{11}$  de la véritable somme 55, ou  $\frac{1}{10}$  de la fausse 50, est encore assez considérable, mais non pas tant que la première, parce que le nombre des Quarrez est plus grand.

Prenons



Prenons donc encore un plus grand nombre de Quarrez , comme les neuf premiers 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dont la somme est 204, laquelle si le nombre des Quarrez étoit infini , devroit être égale au tiers du produit 576 sous le plus grand Quarré 64, & le nombre 9 de leur multitude: & comme le tiers de ce produit 576 est 192 seulement , au lieu qu'il devroit être 204 , la différence 12, qui est  $\frac{1}{3}$  de la véritable somme 204, ou  $\frac{1}{16}$  de la fautive 192 , est encore moins considérable que la précédente.

Puisque donc en augmentant également le nombre des Quarrez , la différence va toujours en diminuant de la même façon , comme l'on voit icy par les trois fractions  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{12}$ ,  $\frac{1}{17}$ , ou par les trois  $\frac{1}{16}$ ,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{16}$ , dont les Dénominateurs se surpassent de 6, il est aisé de conclure , que plus on prendra de Quarrez , moins la différence sera considérable , de sorte qu'elle se réduira à rien , lorsque le nombre des Quarrez sera infini , & qu'ainsi la somme de ces Quarrez infinis est précisément égale au tiers du produit sous le plus grand & le nombre de leur multitude. Ce qu'il falloit démontrer.

*Autre Démonstration.*

Plan-  
che 19.  
123. Fig.

Ou bien parce que l'on suppose que les côtes de tous ces Quarrez sont dans une continuelle proportion arithmétique, on peut considérer tous ces Quarrez dans une Pyramide, comme ABCD, dont la base ABC soit le plus grand Quarré , & le sommet D le plus petit Quarré , ou 0, en sorte que tous les Quarrez qui composent la Pyramide, divisent en une infinité de parties égales la hauteur DE , qui représentera la multitude de tous ces Quarrez , dont les côtes seront dans une continuelle proportion arithmétique , sçavoir dans la même proportion que les parties de la hauteur DE, en les comptant depuis le sommet D. En concevant donc que tous ces Quarrez mis les uns sur les autres remplissent la Pyramide ABCD , qui par 7. 12. est le tiers du Prisme ABCFGH , qui a même base & même hauteur , & dont la solidité est égale au produit sous la base ABC , & la hauteur DE , ou AH , il s'ensuit que le tiers du produit sous le plus grand Quarré ABC , & le nombre DE de la multitude de tous ces Quarrez , est égal à leur somme , que la Pyramide ABCD représente. Ce qu'il falloit démontrer.

## Troisième Démonstration.

Plan-  
che 15.  
124. Fig.

On bien encore décrivez sur l'ordonnée AC, à l'Axe AB, de la Parabole quarrée ABC, le Rectangle ACDB, & divisez son côté BD en une infinité de parties égales, pour tirer par les points de division E, F, G, au côté CD, les paralleles EH, FI, GK, qui seront terminées par la circonférence de la Parabole aux points H, I, K, par où vous tirerez à l'ordonnée AC, les paralleles HL, IM, KN. Il est évident que toutes les paralleles EH, FI, GK, composent le complement Parabolique BCD, & que la ligne BD représente le nombre de ces paralleles, dont toutes les valeurs sont dans la Raison des Quarrez des nombres naturels 0, 1, 2, 3, 4, &c. parce qu'elles sont égales aux parties de l'Axe BLBM, BN, qui sont dans cette même proportion, par la nature de la Parabole quarrée, & ainsi toutes les paralleles EH, FI, GK, DC, du Segment Parabolique BCD, peuvent être considérées comme des Quarrez des quantitez en progression arithmetique, dont le plus grand est CD, & le plus petit est 0, ou le point B; c'est pourquoy la somme de toutes ces paralleles, ou le complement Parabolique BCD, étant par Theor. 9. égal au tiers du Rectangle ACDB, dont l'aire est égale au produit sous les lignes BD, CD, il s'ensuit que la somme des Quarrez des quantitez infinies, arithmetiquement proportionnelles, en commençant depuis 0, est égale au tiers du produit sous le plus grand CD, & le nombre BD de leur multitude. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME XII.

*La somme des Cubes des quantitez infinies en progression arithmetique, en commençant depuis 0, est égale au quart du produit sous le plus grand Cube, & le nombre qui exprime la multitude de toutes ces quantitez.*

Je dis que la somme des Cubes 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, &c. des nombres naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qui représentent des quantitez en progression arithmetique, est égale au quart du produit sous le plus grand de tous ces Cubes & le nombre qui en exprime la multitude.

## DEMONSTRATION.

Si l'on considère par exemple les quatre premiers Cubes

0,

108 TRAITÉ DE GEOMETRIE. III. PARTIE.

0, 1, 8, 27, dont la somme est 36, laquelle si le nombre des Cubes étoit infini devroit être égale au quart du produit 108 sous le plus grand Cube 27 & le nombre 4 de leur multitude: & comme le quart de ce produit 108 n'est que 27, au lieu qu'il devroit être 36, la différence 9, qui est  $\frac{1}{4}$  de la véritable somme 36, ou  $\frac{1}{3}$  de la fausse somme 27, est assez considérable dans ce nombre de quatre Cubes seulement.

0	0
1	1
2	8
3	27

Somme 36 —  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{3}$

4	64
5	125
6	216
7	343

Somme 784 —  $\frac{1}{8}$  —  $\frac{1}{7}$

8	512
9	729
10	1000
11	1331

Somme 4356 —  $\frac{1}{12}$  —  $\frac{1}{11}$

Si l'on considère un plus grand nombre de Cubes, par exemple les huit premiers Cubes 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, dont la somme est 784, cette somme 784 devroit être égale au quart du produit 2744, sous le plus grand Cube 343 & le nombre 8 de leur multitude: & comme le quart de ce produit 2744 n'est que 686, au lieu qu'il devroit être 784, la différence 98, qui est  $\frac{1}{8}$  de la véritable somme 784, ou  $\frac{1}{7}$  de la fausse 686, est encore assez considérable, mais non pas tant que la première, parce que le nombre des Cubes est plus grand.

Prenons donc encore un plus grand nombre de Cubes, comme les douze premiers 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, dont la somme est 4356, laquelle si le nombre des Cubes étoit infini, devroit être égale au quart

quart du produit 15972 sous le plus grand Cube 1331 & le nombre 12. de leur multitude: & comme le quart de ce produit 15972 est 3993 seulement, au lieu qu'il devoit être 4396, la difference 363, qui est  $\frac{1}{12}$  de la veritable somme 4356, &  $\frac{1}{12}$  de la fausse 3993, est encore moins considerable que la precedente.

Puisque donc en augmentant également le nombre des Cubes, la difference va toujours en diminuant de la même façon, comme l'on void icy par les trois fractions  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{16}$ , ou par les trois  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{1}{11}$ , dont les Dénominateurs se succèdent de 4, il est aisé de conclure, que plus on prendra de Cubes, moins la difference sera considerable, de sorte qu'elle se reduira à rien, lorsque le nombre des Cubes sera infini, & qu'ainsi la somme de ces Cubes infinis est précisément égale au quart du produit sous le plus grand Cube & le nombre de leur multitude. Ce qu'il falloit démontrer.

*Autre Démonstration.*

On bien décrivez sur l'ordonnée AC, à l'Axe AB de la Parabole solide ABC, le Rectangle ACDB, & ayant achevé le reste comme au Theorème precedent, vous connoîtrez que toutes les parallèles EH, FI, GK, composent le complement Parabolique BCD, & que la ligne BD represente le nombre de ces paralleles, dont toutes les valeurs sont dans la Raison des Cubes des Nombres naturels 0, 1, 2, 3, 4, &c. parce qu'elles sont égales aux parties de l'Axe BL, BM, BN, qui sont dans cette même proportion par la nature de la Parabole solide; & ainsi toutes les paralleles EH, FI, GK, DC, de ce Segment Parabolique BCD, peuvent être considérées comme des Cubes de quantitez en progression arithmetique, dont le plus grand est CD, & le plus petit est 0, ou le point B; c'est pourquoy la somme de toutes ces paralleles, ou le complement Parabolique BCD, étant par Theor. 9. égal au quart du Rectangle ACDB, dont l'aire est égale au produit des lignes BD, CD, il s'ensuit que la somme des Cubes des quantitez infinies arithmetiquement proportionnelles en commençant depuis 0, est égale au quart du produit sous le plus grand CD, & le nombre BD de leur multitude. Ce qu'il falloit démontrer.

S C O L I E.

A l'imitation de ce Theorème & du precedent, il est aisé à démontrer, en prenant ABC pour une Parabole-quarré-quarré, que

que la somme des Quarré-quarrez des quantitez en continuëlle proportion arithmetique, en commençant depuis 0, est égale à la cinquième partie du produit sous le plus grand & le nombre de leur multitude: & en supposant que la Parabole ABC, soit surfolide, que la somme des surfolides des quantitez infinies en progression arithmetique en commençant depuis 0, est égale à la sixième partie du produit sous le plus grand & le nombre de leur multitude, & ainsi ensuite.

Ainsi vous voyez par ce Theorème, & par les deux precedens, que les sommes des quantitez infinies en progression arithmetique, de leurs Quarréz, de leurs Cubes, de leurs Quarré-quarrez, de leurs Surfolides, & de leurs autres Puissances plus élevées de degré en degré, sont aux produits sous la plus grande & le nombre de leur multitude, comme l'Unité est aux Nombres naturels qui la suivent 2, 3, 4, 5, 6, &c. Ce qu'il faut bien remarquer parce que cela nous servira pour la Quadrature du Cercle & de l'Hyperbole.

### THEOREME XIII.

*Un Cercle est égal à la moitié du Rectangle sous sa circonférence & son Rayon.*

CE Theorème est évident par ce qui a été démontré du Polygone regulier au Theor. 5. parce qu'un Cercle est proprement un Polygone regulier composé d'une infinité de côtez, dont la perpendiculaire est égale à son Rayon.

217. Fig.

Ou bien divisez par pensée le Rayon AB en une infinité de parties égales, & décrivez du centre A, par les points de division autant de circonférences de cercle, qui seront en progression arithmetique, parce que leurs Rayons qui croissent également, sont dans cette même progression, & que les circonférences des cercles sont en même Raison que leurs Rayons: & parce que la somme de toutes ces circonférences ou quantitez en progression arithmetique, qui remplissent le cercle, est égale à la moitié du produit sous la plus grande qui est la circonférence du cercle, & le nombre de leur multitude, qui est le Rayon AB, par Theor. 10. il s'en suit que le Cercle est égal à la moitié du Rectangle sous sa circonférence & son Rayon. Ce qu'il falloit démontrer.

### SCOLIE.

On démontrera de la même façon, que l'Aire d'un Secteur de cercle est égale à la moitié du Rectangle sous l'arc qui lui sert de base & le Rayon du cercle, qui est le côté de ce Secteur.

THEO-

## THEOREME XIV.

*Le Diametre d'un cercle est à sa Circonférence ; environ  
comme 100 est à 314.*

JE dis que le Diametre AB d'un cercle , dont le centre *Plan.*  
est D , est à sa circonférence , environ comme 100 est che 150  
à 314. 125. Fig

## P R E P A R A T I O N.

Décrivez comme dans le Theor. 8. de la courbe ou demi-circonférence ACB, la courbe ASM, que nous appellerons *Quadratrice geometrique*, parce qu'elle contribue à la *Quadrature du Cercle* ; c'est à dire à la connoissance de l'aire du cercle : sçavoir en faisant l'ordonnée GH égale à la partie correspondante de la touchante au sommet AF, ou plus facilement à la ligne DI terminée par la droite BE sur la ligne indéfinie DK perpendiculaire au Diametre AB, parce que cette ligne DI est égale à la touchante correspondante AF, ou EF, comme l'on connoitra en joignant la droite DE, qui divisera en deux également l'angle au centre ADE, dont la moitié ADE est égale à l'angle à la circonférence ABE, ce qui rend équiangles & égaux les deux Triangles rectangles DAF, BDI, &c.

Il est évident que la courbe ASM étant continuée approchera toujours de plus en plus de la droite BV perpendiculaire au Diametre AB, sans jamais la rencontrer, & qu'ainsi la droite BV lui est Asymptote : & que l'espace indéfini terminé par la courbe indéterminée ASM, par son Axe AB, & par son Asymptote indéfinie BV, est égale au Cercle, dont le Diametre est AB, parce que l'espace AGHT est double du Segment correspondant AE, par Theor. 8. & pareillement l'espace ADRH double du Segment correspondant ACE, & de même l'espace ALMS double du Segment correspondant AXE, & ainsi ensuite jusqu'à l'espace indéfini ABVM, qui sera double du Demi-cercle ABC, ou égal au Cercle, dont le Diametre est AB.

Il est évident aussi que l'ordonnée DR, qui part du centre D, est égale au Rayon DA, & que par conséquent le Parallelogramme RDAQ est un Quarré, dont le côté AQ doit être divisé en une infinité de parties égales, pour tirer par les points de division les lignes NT, OH, PS, &c. qui rempliront le Complement ARQ, dont l'aire étant déterminée en termes analytiques, servira pour la

Plan-  
che 15.  
225. Fig.

## DEMONSTRATION.

Si l'on met  $a$  pour le Rayon AD, ou BD, & par conséquent  $2a$  pour le Diametre AB,  $x$  pour l'ordonnée GH, ou AF, ou DI, &  $y$  pour la partie AG, on aura  $2a-y$  pour BG, & par conséquent  $2ay-yy$  pour le Quarré GE, qui est égal au Rectangle des lignes AG, BG, par 35. 3. & parce que les quatre lignes BD, DI, BG, GE, sont proportionnelles, par 4. 6. à cause des Triangles équiangles BDI, BGE, leurs Quarrés seront aussi proportionnels, par 22. 6. & l'on aura en termes analytiques cette Analogie,  $aa, xx::4aa-4ay+yy, 2ay-yy$ , & en divisant les deux derniers termes par  $2a-y$ , on aura celle cy,  $aa, xx::2a-y, y$ , & par conséquent cette Equation  $2ay::2axx-xy$ , dans laquelle on trouvera  $y$ , on

$$AG \propto \frac{2axx}{aa+xx}, \text{ \& en divisant le Numerateur } 2axx \text{ par le}$$

$$\text{Denominateur } aa+xx, \text{ on aura } AG \propto \frac{2xx}{a} + \frac{2x^2}{a^3} + \frac{2x^4}{a^5} + \frac{2x^6}{a^7} + \dots$$

&c. & si au lieu de  $x$  pour l'ordonnée GH, on avoit mis  $2x$ , on auroit trouvé  $AG \propto \frac{8xx}{a} + \frac{32x^2}{a^3} + \frac{128x^4}{a^5} + \frac{512x^6}{a^7} + \dots$  :

si l'on avoit mis  $3x$  pour la même ordonnée GH, on auroit trouvé  $AG \propto \frac{18xx}{a} + \frac{162x^2}{a^3} + \frac{1458x^4}{a^5} + \frac{13122x^6}{a^7} + \dots$ , &c. &

ainsi ensuite. C'est pourquoy si l'on met  $x$  pour la premiere partie AN, on aura  $2x$  pour la deuxième AO,  $3x$  pour la troisième AP, & ainsi des autres, jusqu'à toute la ligne AQ  $\propto a$ , qui exprime le nombre de la multitude des ordonnées NT, OH, PS, &c. qui remplissent le Complement ARQ: & alors on trouvera

$$\begin{array}{l} NT \propto \frac{2xx}{a} + \frac{2x^2}{a^3} + \frac{2x^4}{a^5} + \frac{2x^6}{a^7} + \dots, \&c. \\ OH \propto \frac{8xx}{a} + \frac{32x^2}{a^3} + \frac{128x^4}{a^5} + \frac{512x^6}{a^7} + \dots, \&c. \\ PS \propto \frac{18xx}{a} + \frac{162x^2}{a^3} + \frac{1458x^4}{a^5} + \frac{13122x^6}{a^7} + \dots, \&c. \end{array}$$

& ainsi des autres, jusqu'à la dernière & plus grande QR

On

On peut trouver par le moyen des *Theor.* 11. & 12. la somme de toutes ces ordonnées infinies, c'est à dire le complément ARQ, parce que tous les termes semblables, dont les Numerateurs des valeurs trouvées de toutes ces lignes sont le double des Puissances, dont les côtes sont dans la progression des Nombres naturels, 1, 2, 3, 4, &c. & par conséquent dans la progression arithmétique. Ainsi on connoitra par *Theor.* 11. que la somme des Numerateurs de tous

les premiers termes 2xx, 8xx, 18xx, &c. vaut  $\frac{2}{3}a^3$ , &

par *Theor.* 12. que la somme des Numerateurs de tous les seconds termes  $2x^4$ ,  $32x^4$ ,  $162x^4$ , &c. vaut  $\frac{2}{5}a^5$ , que la

somme des Numerateurs de tous les troisièmes termes  $2x^5$ ,  $128x^5$ ,  $1458x^5$ , &c. vaut  $\frac{2}{7}a^7$ , & ainsi ensuite. D'où il

suit que la somme de toutes ces lignes infinies NT, OH, PS, &c. ou le Complement ARQ vaudra  $\frac{2}{3}aa - \frac{2}{5}aa + \frac{2}{7}aa - \frac{2}{9}aa$ , &c. lequel étant ôté du Carré RDAQ, qui

vaut  $aa$ , il restera  $aa - \frac{2}{3}aa + \frac{2}{5}aa - \frac{2}{7}aa + \frac{2}{9}aa$ , &c. pour l'espace ARD, dont la moitié  $\frac{1}{2}aa - \frac{1}{3}aa + \frac{1}{5}aa - \frac{1}{7}aa + \frac{1}{9}aa$ , &c. sera par *Theor.* 8. l'aire du Segment

correspondant ACE, à laquelle ajoutant l'aire du Triangle isoscèle rectangle ADC, qui vaut  $\frac{1}{2}aa$ , on aura  $aa - \frac{1}{3}aa + \frac{1}{5}aa - \frac{1}{7}aa + \frac{1}{9}aa$ , &c. pour le Quart de Cercle ADCE,

dont le quadruple  $4aa - \frac{4}{3}aa + \frac{4}{5}aa - \frac{4}{7}aa + \frac{4}{9}aa$ , &c. sera par conséquent l'aire du Cercle entier, laquelle étant

égale à la moitié du Rectangle sous sa circonférence & son Rayon, par *Theor.* 13. si on la divise par la moitié du Rayon, c'est à dire par  $\frac{1}{2}a$ , on aura  $8a - \frac{8}{3}a + \frac{8}{5}a - \frac{8}{7}a + \frac{8}{9}a$ , &c. pour la circonférence du Cercle. D'où il suit

que le Diamètre d'un Cercle est à sa circonférence, comme  $2a$  est à  $8a - \frac{8}{3}a + \frac{8}{5}a - \frac{8}{7}a + \frac{8}{9}a$ , &c. ou comme 1 à  $4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9}$ , &c. ou comme 1 à  $\frac{8}{3} + \frac{8}{15} - \frac{8}{35} + \frac{8}{63}$ , &c.

ou comme 1 à  $\frac{8}{3} + \frac{8}{15} - \frac{8}{35} + \frac{8}{63}$ , &c.

ou comme 1 à  $\frac{8}{3} + \frac{8}{15} - \frac{8}{35} + \frac{8}{63}$ , &c.

ou comme 1 à  $\frac{8}{3} + \frac{8}{15} - \frac{8}{35} + \frac{8}{63}$ , &c.

ou comme 1 à  $\frac{8}{3} + \frac{8}{15} - \frac{8}{35} + \frac{8}{63}$ , &c.

ou comme 1 à  $\frac{8}{3} + \frac{8}{15} - \frac{8}{35} + \frac{8}{63}$ , &c.



Mas- Il est aisé de continuer ces Fractions à l'infini, parce qu'el-  
 che 15. les ont un même Numérateur 8, & que leurs Dénomina-  
 825. Fig. teurs 3, 35, 99, 195, &c. qui sont des nombres quarréz  
 moins l'Unité, sont dans une progression du second degré,  
 parce que les différences de leurs différences sont égales, sca-  
 voir 32. Il est évident que tant plus on continuëra ces frac-  
 tions, d'autant plus près, on approchera de la Raison du  
 Diametre d'un Cercle à sa circonference, de sorte que si on  
 les pouvoit toutes continuer, & avoir leur somme, cette  
 Raison seroit précisément connuë. Nous l'avons continuëe  
 dans la Table suivante jusqu'au nombre de 315 dénomina-  
 teurs, ce qui suffit pour avoir à une centième partie près la  
 Raison du Diametre d'un Cercle à sa circonference.

*Table des Dénominateurs de 315 Fractions, dont le Numérateur commun est 8, & qui composent la circonférence d'un Cercle, dont le Diamètre est 1.*

3	14883	58563	131043	232323	362403
35	15875	60515	133955	236195	367235
99	16899	62499	136899	240899	372099
195	17955	64515	139875	244835	376995
323	19043	66563	142883	248003	381923
483	20163	68643	145923	252003	386883
675	21315	70755	148995	256035	391875
899	22499	72899	152099	260099	396899
1155	23715	75075	155235	264195	401955
1443	24963	77283	158403	268323	407043
1763	26243	79523	161603	272483	412163
2115	27555	81795	164835	276675	417315
2499	28899	84099	168099	280899	422499
2915	30275	86435	171395	285155	427715
3363	31683	88803	174723	289443	432963
3843	33123	91203	178083	293763	438243
4355	34595	93635	181475	298115	443555
4899	36099	96099	184899	302499	448899
5475	37635	98595	188355	306915	454275
6083	39204	101123	191843	311363	459683
6723	40803	103683	195363	315843	465123
7395	42435	106275	198915	320355	470595
8099	44099	108899	202499	324899	476099
8835	45795	111555	206115	329475	481635
9603	47525	114243	209763	334083	487203
10403	49283	116963	213443	338723	492803
11235	51075	119715	217155	343395	498435
12099	52899	122499	220899	348099	504099
12995	54755	125315	224675	352835	509795
13923	56643	128163	228483	357603	515523

521283	708963	925443	1170723	1444803
527055	715715	933155	1179395	1454435
522899	722499	940899	1188099	1464099
538755	729315	948675	1196835	1473795
544643	736163	956483	1205603	1483523
550563	743043	964323	1214403	1493283
556515	749955	972195	1223235	1503075
562499	756899	980099	1232099	1512899
568515	763875	988035	1240995	1522755
574563	770883	996003	1249923	1532643
580643	777923	1004003	1258883	1542563
586755	784995	1012035	1267875	1552515
592879	792099	1020099	1276899	1562499
599075	799235	1028195	1285955	1572515
605283	806403	1036323	1295043	1582563
611523	813603	1044483	1304163	
617795	820835	1052675	1313315	
624099	828099	1060899	1322499	
630335	835395	1069155	1331715	
636803	842723	1077443	1340963	
643203	850083	1085763	1350243	
649635	857475	1094115	1359555	
656099	864899	1102499	1368899	
662595	872355	1110915	1378275	
669123	879843	1119363	1387683	
675683	887363	1127843	1397123	
682275	894915	1136355	1406595	
688899	902499	1144899	1416099	
695555	910115	1153475	1425635	
702243	917763	1162083	1435203	

On peut changer ces Fractions en nombres entiers, pour les ajouter ensemble, si au lieu de supposer 1 pour le Diametre du Cercle, on suppose 100000000, & alors au lieu du Numerateur commun 8, on aura celui-cy, 800000000, qui étant divisé par les Dénominateurs de la Table precedente, sçavoir premierement par 3, & ensuite par 35, par 99, par 195, par 323,

&c.

etc. on aura en leur place d'autres nombres tels que vous les voyez dans la Table suivante.

Table de 315 parties de la circonférence d'un Cercle dont le Diamètre est 100000000.

266666667	312236366	313178896	313501379
22857143	71206	18852	8544
8080808	66121	18141	8325
4102564	61562	17469	8114
2476780	57459	16834	7911
1656315	53753	16233	7716
305840277	312546467	313266425	313541989
1185185	50394	15663	7528
889878	47340	15123	7346
692641	44556	14611	7171
554400	42010	14124	7003
453772	39677	13661	6840
309616153	312770444	313339607	313577877
378250	37532	13220	6682
320128	35557	12800	6531
274442	33734	12400	6384
237883	32047	12019	6242
208171	30484	11655	6105
311035027	312939798	313401701	313609821
183697	29033	11307	5972
163299	27683	10974	5844
146119	26424	10656	5719
131514	25250	10352	5599
118994	24152	10060	5482
311778650	313072340	313455050	313638437
108181	23125	9780	5369
98778	22161	9513	5260
90549	21257	9255	5153
83307	20407	9009	5050
76901	19606	8772	4950
312236366	313178896	313501379	313664219

313664219	313777588	313848706	313897483
4853	2891	1917	1363
4759	2848	1893	1349
4668	2805	1870	1335
4579	2764	1848	1322
4492	2723	1825	1308
313687570	313791619	313858059	313904160
4408	2684	1804	1295
4327	2645	1782	1282
4247	2607	1761	1269
4170	2569	1740	1256
4095	2533	1720	1244
313708817	313804657	313866866	313910506
4022	2497	1700	1231
3951	2462	1680	1219
3881	2428	1661	1207
3814	2395	1642	1196
3748	2362	1623	1184
313728233	313816801	313875172	313916543
3684	2330	1605	1173
3622	2298	1587	1161
3561	2267	1569	1150
3501	2237	1552	1139
3443	2207	1535	1128
313746044	313828140	313883020	313922294
3387	2178	1518	1118
3332	2150	1501	1107
3278	2122	1485	1097
3226	2095	1469	1087
3175	2068	1453	1077
313762442	313838753	313890446	313927780
3125	2041	1438	1067
3076	2016	1422	1057
3028	1990	1407	1047
2981	1965	1392	1038
2936	1941	1378	1028
313777588	313848706	313897483	313933017

313933017	313956008	313974757	313990339
1019	823	678	569
1010	816	673	565
1001	810	668	561
992	803	664	557
983	797	659	554
313938022	313960057	313978099	313993145
975	790	654	550
966	784	649	546
958	778	645	543
949	772	640	539
941	766	635	536
313942811	313963947	313981322	313995859
933	760	631	532
925	754	627	529
917	748	622	525
909	742	618	522
902	737	613	519
313947397	313967688	313984433	313998486
894	731	609	515
886	726	605	512
879	720	601	509
872	715	597	506
864	709	592	
313951792	313971289	313987437	314000528
857	704	588	
850	699	584	
843	694	580	
836	688	577	
830	683	573	
313956008	313974757	313990339	

Si l'on ajoute ensemble tous ces Nombres , comme nous avons fait icy de cinq en cinq , leur somme 314000528 sera la circonference du Cercle , dont le Diametre est 100000000. Ainsi vous voyez que le Diametre d'un Cercle est à sa circonference , environ comme 100000000 à 314000528 , ou bien

120 **TRAITÉ DE GEOMETRIE. III. PARTIE.**  
 en moindres termes, comme 100 à 314. *Ce qu'il falloit démontrer.*

**S C O L I E.**

Ludolphe de Cologne a trouvé par des Polygones inscrits & circonscrits, à la maniere d'Archimede, que le Diametre du Cercle étant 1000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, la circonference est entre ces deux Nombres,

314, 159, 265, 358, 979, 323, 846, 264, 338, 327, 950.  
 314, 159, 265, 358, 979, 323, 846, 264, 338, 327, 951.

Dans les petits calculs, on peut se servir de la Raison d'Archimede, qui est celle de 7 à 22, & qui differe de celle de 100, à 314, en ce que 22 est un nombre trop grand, & 314 un nombre trop petit; mais ce défaut n'est pas si considerable que l'exces, c'est pourquoy dans la pratique il vaudra mieus se servir de la Raison de 100 à 314, pour les petits calculs, & dans les grands calculs de la Raison de 100000 à 314159, &c.


**T H E O R E M E X V.**

*L'Aire d'un Cercle est au Quarré de son Diametre environ comme 785 est à 1000.*


Plan-  
che 15.  
126. Fig. **J** Edis que l'Aire du Cercle EFGH, est au Quarré ABCD de son Diametre EG, comme 785 est à 1000, c'est à dire que si l'Aire du Cercle EFGH est de 785 pieds quarréz, le Quarré circonscrit ABCD en contiendra environ 1000.

**D E M O N S T R A T I O N.**

Si l'on suppose que le Diametre EG soit de 100 pieds courans, auquel cas l'Aire du Quarré ABCD sera de 10000 pieds quarréz, la circonference EFGH, sera de 314 pieds courans, par Theor. 14. & le Rectangle sous le Diametre & la circonference sera de 31400 pieds quarréz, & sa moitié donnera 15700 pieds quarréz pour le double de l'Aire du Cercle, par Theor. 13. c'est pourquoy en prenant la moitié de cette moitié, on aura 7850 pieds quarréz pour l'Aire du Cercle EFGH. Ainsi vous voyez que l'Aire du Cercle EFGH est au Quarré ABCD de son Diametre EG, comme 7850 à 10000, ou en moindres termes, comme 785 à 1000. *Ce qu'il falloit démontrer.*







## S C O L I E.

Plan-  
che 15,  
126. Fig.

On auroit pû abréger les termes de cette Raison, en les divisant chacun par leur commune mesure 5, mais il vaut mieux les laisser ainsi, parce que le nombre 1000 est plus commode qu'un autre, puisque par son moyen on évite la Multiplication, ou la Division, que dans la pratique on seroit obligé de faire par un autre : c'est pourquoy nous négligerons la Raison de 11 à 14, dont on se sert communément, parce qu'elle n'est pas si commode, ni même si exacte que celle de 785 à 1000; & si vous en voulez une plus exacte, servez-vous de celle de 785398 à 1000000.

## T H E O R E M E .XVI.

*Une Ellipse est égale à un Cercle, dont le Diametre est moyen proportionnel entre les deux Axes de l'Ellipse.*

**J**E dis que l'Ellipse ABCD, dont les deux Axes sont AC, BD, est égale à un Cercle dont le Diametre est moyen proportionnel entre les deux Axes AC, BD, c'est à dire que l'Ellipse est moyenne proportionnelle entre deux Cercles, qui ont les deux Axes AC, BD, pour Diametres. Plan-  
che 16.  
127. Fig.

## P R É P A R A T I O N.

Faites du centre E de l'Ellipse, autour des deux Axes AC, BD, les deux Demi cercles AFC, BLD, & tirez du point I, pris à discretion sur la circonférence de l'Ellipse, les droites IK, GH, parallèles aux deux Axes AC, BD.

## D I M O N S T R A T I O N.

Parce que les droites ED, HI, sont deux ordonnées à l'Axe AC, par Déf. 10. le Rectangle des parties AE, EC ou le Quarré EF, parce que ces deux parties sont égales, est au Rectangle des deux AH, HC, ou au Quarré GH, par 35. 3. comme le Quarré DE, au Quarré IH, par Déf. 35. c'est pourquoy, par 22. 6. les quatre lignes EF, GH, DE, IH, sont proportionnelles, & en doublant la première EF, & la troisième DE, qui sont les antécédens de cette Proportion, l'on connoîtra que la Raison de la ligne GH, qui est une ordonnée dans le Cercle AC, est à l'ordonnée IH de l'Ellipse, comme le grand Axe AC, au petit BD. D'où il est aisé de

Plan- de conclure par 12. 5. en tirant d'autres ordonnées commu-  
che 16. nes au Cercle AC, & à l'Ellipse, que toutes les ordonnées du  
227. Fig. Cercle AC, c'est à dire le Cercle AC, est à toutes les ordon-  
nées de l'Ellipse, ou à l'Ellipse, comme le grand Axe AC,  
au petit BD.

Pareillement parce que les droites CE, IK, sont deux ordonnées à l'Axe BD, par Déf. 10. le Rectangle des parties BE, ED, ou le Quarré BE, parce que ces deux parties sont égales, est au Rectangle des deux BK, DK, ou au Quarré KO, par 35. 3. comme le Quarré CE, au Quarré KI, par Déf. 35. C'est pourquoy par 22. 6. les quatre lignes BE, KO, CE, KI, sont proportionnelles, & en doublant la première BE, & la troisième CE, qui sont les antécédens de cette Proportion, l'on connoitra que la Raison de la ligne KO, qui est une ordonnée dans le Cercle BD, est à l'ordonnée KI dans l'Ellipse, comme le petit Axe BD, au grand AC. D'où il est aisé de conclure par 12. 5. en tirant d'autres ordonnées communes au Cercle BD, & à l'Ellipse, que toutes les ordonnées du Cercle BD, c'est à dire le Cercle BD, est à toutes les ordonnées de l'Ellipse, ou à l'Ellipse, comme le petit Axe BD, au grand AC.

Puisque donc l'Ellipse est au Cercle AC, comme le grand Axe AC, au petit BD, & que le Cercle BC est à l'Ellipse, aussi comme le grand Axe AC, au petit BD, il s'ensuit que l'Ellipse est moyenne proportionnelle entre les deux Cercles AC, BD, & que par conséquent elle est égale au Cercle, dont le Diametre est moyen proportionnel entre les deux Axes AC, BD. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME XVII.

*L'Aire d'une Ellipse, est au Rectangle de ses deux Axes, environ comme 785 est à 1000.*

228. Fig. JE dis que l'Ellipse ABCD est au Rectangle EFGH des deux Axes AC, BD, environ comme 785 à 1000, de sorte que si l'Aire de l'Ellipse ABCD est de 785 pieds quarréz, celle du Rectangle circonscrit EFGH, sera d'environ 1000 pieds quarréz.

### DEMONSTRATION.

Parce qu'un Cercle est au Quarré de son Diametre, comme 785 à 1000, par Theor. 15. si à la place des deux premiers termes, sçavoir du Cercle, & du Quarré de son Diametre, on met une Ellipse, & le Rectangle sous ses deux

Deux Axes, qui sont en même Raison, parce que par Theor. 16. Plan-  
che. 16  
123. Fig.  
une Ellipse est égale à un Cercle, dont le Diametre est moyen proportionnel entre ses deux Axes, & par conséquent tel que le Carré de son Diametre est égal au Rectangle sous les deux Axes, par 17. 6. on connoitra qu'une Ellipse est au Rectangle sous les deux Axes, comme 785 à 1000. Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E.

La Raison de 11 à 14 peut aussi servir, mais elle n'est pas tout-à-fait si exacte, & si vous en voulez une tres-exacte, servez-vous de celle de 785398 à 1000000, comme dans le Cercle. On voit aisément par ce Theorème, que les Ellipses sont entre elles comme les Rectangles sous leurs deux Axes, & que celles qui ont deux Axes égaux, sont entre elles comme les deux autres Axes. D'où il est aisé de conclure que deux Ellipses sont égales entre elles, quand leurs Axes sont reciproquement proportionnels.

## T H E O R E M E XVIII.

*Si l'on coupe un Cylindre droit par un Plan incliné à sa base, la section sera une Ellipse, dont le petit Axe sera égal au Diametre de la base du Cylindre.*

**J**E dis que si l'on coupe le Cylindre droit ABCD, dont la base est le Cercle AEBL, & l'Axe est la ligne TN perpendiculaire à la même base, par le Plan GHCK incliné à cette base, la section GICK sera une Ellipse, dont le petit Axe sera égal au Diametre AB de la base. 129. Fig.

## P R E P A R A T I O N.

Faites passer par l'Axe TN, & par le Diametre AB, un Plan, qui étant perpendiculaire au Plan de la base AEBL, par 18. 11. coupera le Cylindre par le Plan rectangulaire ABCD, & la section GICK, par la ligne droite CG, qui représentera la longueur de la courbe GICK, & qui étant prolongée rencontrera le Diametre AB aussi prolongé en un point comme S, où se fait l'angle de l'inclination des deux Plans GICK, AEBL, & où se termine le Plan triangulaire SBC, qui est perpendiculaire au Plan de la base AEBL, de sorte que tous les points de la ligne CG répondent perpendiculairement à tous les points du Diametre AB, comme tous les points du Plan GICK répondent perpendiculairement à tous les points du Plan AEBL.

Tirez

Plan  
che 16.  
229. Fig. Tirez à volonté dans le Plan GICK, les deux lignes IK, HQ, perpendiculaires à la ligne CG, & sur la Surface du Cylindre par les deux points HI, les deux lignes HE, IF, perpendiculaires à la base AEHL, & enfin dans le Plan du Cercle AEHL, par les points E, F, les deux lignes ER, FL, perpendiculaires au Diamètre AB, qui les divisera en deux également aux points P, N, par 3. 3. Cette construction est équivalente à celle qu'on feroit en coupant le Cylindre par les deux Plans IKLF, HQRE, perpendiculaires à la base AEHL, & au Plan triangulaire SBC, ce qui fait voir que tous les points des communes sections IK, FL, se répondent perpendiculairement les uns aux autres, aussi-bien que ceux des deux communes Sections HQ, ER, & que par conséquent tous les points de la figure mixtiligne HIKQ répondent perpendiculairement à tous les points de la figure mixtiligne EFLR.

## D E M O N S T R A T I O N.

Il est évident par 6. 11. que les deux lignes IK, FL, étant perpendiculaires au même Plan SBC, sont parallèles entre elles, & qu'elles sont aussi égales, par 34. 1. parce que la figure IKLF est un Parallelogramme. On connoitra de la même façon que les deux lignes HQ, ER, sont égales & parallèles entre elles, parce que la figure HQRE est aussi un Parallelogramme.

Il est évident aussi que les deux points I, F, étant également éloignés du Plan SBC, à cause de la ligne IF parallèle à ce Plan, les deux lignes IM, FN, qui ont été faites perpendiculaires au même Plan, sont égales entre elles : & comme la ligne FN est la moitié de la ligne FL, ou IK son égale, la ligne IM sera aussi la moitié de la ligne IK. On démontrera de la même façon, que la ligne HO est la moitié de la ligne HQ. D'où il suit par Déf. 10. que la ligne CG est un Diamètre à l'égard des ordonnées IK, HQ, qui sont parallèles entre elles, par 29. 1. parce que chacune a été faite perpendiculaire au Diamètre CG, lequel par conséquent sera un Axe. Ainsi nous savons que la ligne CG est le grand Axe de la courbe GICK, & par conséquent IK le petit Axe, en supposant que le point M soit au milieu de l'Axe CG, auquel cas le point N sera le centre du Cercle AEHL, dont le Diamètre AB, ou FL, est par conséquent égal au petit Axe IK. Il ne reste donc plus qu'à démontrer, que la courbe GICK est la circonférence d'une Ellipse.

Parce que les deux Plans HQRE, IKLF, sont parallèles entre eux, comme étant perpendiculaires au même Plan AEHL, les deux lignes AB, CG, sont coupées proportionnellement par ces deux Plans, par 17. 11. & parce que le Rectangle

des lignes GO, OC, est par 23. 6. au Rectangle des lignes Plan-  
GM, MC, en Raison composée de la Raison des côtéz che 116.  
GO, GM, ou de la Raison des lignes AP, AN, & de la 129. Fig.  
Raison des côtéz OC, MC, ou de la Raison des lignes PB,  
NB: & que pareillement le Rectangle des lignes AP, PB,  
ou par 35. 3. le Quarré EP, ou HO, est au Rectangle des  
lignes AN, NB, ou au Quarré FN, ou IM, en Raison com-  
posée des mêmes Raisons; il s'ensuit que le Rectangle des li-  
gnes GO, OC, est au Rectangle des lignes GM, MC, comme  
le Quarré HO, est au Quarré IM, & par Déf. 35. que la cour-  
be GICK est la circonference d'une Ellipse. Ce qu'il falloit  
démontrer.

## S C O L I E.

Comme tous les points de l'Ellipse GICK correspondent à  
tous les points du Cercle AEBL, & que les Diametres AB, CG,  
sont coupez proportionnellement par tous les Plans perpen-  
diculaires au Plan SBC, il est aisé de conclure en inscrivant  
à la maniere d'Archimede un Polygone regulier d'une infi-  
nité de côtéz dans le Cercle AEBL, que ce Cercle est à l'El-  
lipse, comme le Diametre AB égal au petit Axe IK, est au  
grand Axe CG, ce que nous avons déjà démontré au Theor. 16.  
& que le Segment d'Ellipse GHQ, est à toute l'Ellipse GICK,  
comme le Segment de Cercle correspondant AER, est à tout  
le Cercle AEBL: & pareillement que le Secteur d'Ellipse  
GQMH est à toute l'Ellipse GICK, comme le Secteur de  
Cercle correspondant ARNE, est à tout le Cercle AEBL, &c.

## T H E O R E M E XIX.

*L'Espace terminé par la Cycloïde & par la circonference  
du Cercle generateur, qui luy sert de base, est triple du  
même Cercle generateur.*

JE dis que l'espace ACB terminé par la Cycloïde ABC, dont 132. Fig.  
l'Axe est BD, & par la base AC, qui est égale à la circonfé-  
rence du Cercle generateur BFDL, dont le Diametre est le  
même Axe BD, est triple du même Cercle generateur BFDL:  
ce que nous aurons démontré, en faisant voir que l'espace  
BFDCH est égal au Cercle generateur. Pour cette fin il faut  
démontrer auparavant, que comme la base AC est égale à  
la circonference BFDL, ou la Demi-base AD à la Demi-circon-  
ference BLD, aussi une ligne droite quelconque ML parallèle  
à la Demi-base AD est égale à l'arc correspondant BL.

Plan-  
che 16.  
132. Fig.

## DEMONSTRATION.

Si l'on donne la disposition MNO au Cercle generateur, en le plaçant en N, en sorte que le Diametre NO soit parallele au Diametre BD, ou perpendiculaire à la base AC, on connoitra par la generation de la Cycloïde, que la partie AN est égale à l'arc correspondant MN, ou DL, & par consequent la partie ND, ou PQ, ou ML, égale à l'arc OM, ou BL. *Ce qu'il falloit premierement démontrer.*

Si l'on divise par pensée la Demi-circonference BFD en une infinité de parties égales aux points E, F, G, &c. en sorte que les arcs BE, BF, BG, &c. soient en progression arithmetique, & que par les points E, F, G, &c. on tire à la base AC, autant de paralleles, comme EH, FI, GK, &c. qui étant égales à leurs arcs correspondans, seront aussi en progression arithmetique; on connoitra *par Theor. 10.* que leur somme, ou l'espace BFDCH, est égal à la moitié du produit sous la plus grande CD égale à la Demi-circonference BFD, & le Diametre BD, qui peut passer pour le nombre de leur multitude, car bien qu'elles ne le divisent pas en parties égales, néanmoins cette inégalité est recompensée par l'uniformité qui se rencontre de part & d'autre depuis le centre Q du Cercle generateur. Or comme le produit sous le Rayon BQ & la Demi-circonference CD est l'aire du Cercle generateur *par Theor. 13.* & que ce même produit est la moitié du produit sous le Diametre BD & la Demi-circonference CD, il s'ensuit que l'espace BFDCH est égal à l'aire du Cercle generateur BFDL. *Ce qu'il falloit démontrer.*

## S C O L I E.

Nous démontrerons icy par occasion ce que nous avons avancé sans aucune preuve dans nôtre *Dictionnaire Mathematique*, sçavoir que deux touchantes correspondantes de la Cycloïde & du Cercle generateur placé au milieu de l'espace terminé par la Cycloïde, comme HR, ER, se coupent au point R, qui appartient à la *Ligne d'évolution* du Demi-cercle BFD, c'est à dire à la courbe BRC, qu'on décriroit en mouvant continuellement l'extremité d'un filet tendu & attaché par son autre extremité au point D, après avoir été appliqué le long de la Demi-circonference BFD, & alors la partie de ce filet, qui seroit tendue, comme ER, toucheroit la courbe BFD au point E, & seroit égale à l'arc correspondant EB, & par consequent à la ligne correspondante EH. Il faut donc démontrer que la touchante ER est égale à la ligne correspondante EH.

Pour

Pour cette fin, imaginez la droite VX parallèle & infiniment proche de la ligne EH, auquel cas les arcs EV, HX, pourront passer pour des lignes droites, & pour des parties des touchantes ER, HR, & la différence des deux parallèles EH, VX, ou des deux arcs BE, BV, sera égale à la ligne EV, & enfin dans les Triangles semblables REH, RVX, on aura par 4. 6. cette Analogie, R.V, R.E:: V.X, EH, & en divisant, on aura celle-cy, EV, R.E:: EV, EH, qui fait connoître que la touchante RE est égale à la ligne EH, & que par conséquent le point R appartient à la Ligne d'évolution BRC. Ce qu'il falloit démontrer. D'où il est aisé de conclure que la touchante HR de la Cycloïde est parallèle à la correspondante BE, qui divise l'angle SER en deux également, &c.

Plan-  
che 16.  
Fig. 132.

## THEOREME XX.

*La Surface convexe d'un Cylindre droit est égale au Rectangle sous sa hauteur & la circonférence de sa base.*

Je dis que la Surface convexe du Cylindre droit ABCD est égale à un Rectangle, qui a pour base la circonférence de la base AEBF, & pour hauteur la hauteur AD, ou BC du Cylindre. 130. Fig.

## DEMONSTRATION.

Si par tous les points de la circonférence AEBF, on imagine autant de lignes parallèles entre elles & à la hauteur AD, ou BC lesquelles seront égales entre elles, on connoitra que la Surface du Cylindre ABCD est composée d'une infinité de petits Rectangles égaux, dont la hauteur commune est la même que celle du Cylindre: & comme la somme de tous ces Rectangles infinis, ou la Surface du Cylindre droit ABCD, est par 1. 2. égale au Rectangle sous la hauteur commune AD, ou BC du Cylindre & la somme des bases des mêmes Rectangles, il s'ensuit que la même Surface est égale au Rectangle sous la hauteur AD, ou BC du Cylindre & la circonférence AEBF du Cercle qui sert de base au Cylindre. Ce qu'il falloit démontrer.

## S C O L I E.

La vérité de ce Theorème sera encore évidente, si l'on dé- plus par pensée la Surface du Cylindre ABCD, en la faisant rouler sur un Plan, car on connoitra aisément par cette circonvolution usitée, que la Surface de ce Cylindre ainsi étendue occupera sur ce Plan un Rectangle, qui aura pour longueur la circonférence AEBF, qui se trouvera étendue en ligne droite, & pour largeur la hauteur AD, ou BC du Cylindre.

THEO.



THEOREME XXI.

*La Surface convexe d'un Cylindre droit est au Rectangle sous sa hauteur & le Diametre de sa base, environ comme 314 est à 100.*

Plan-  
che 16.  
130. Fig.

JE dis que la Surface du Cylindre droit ABCD, est au Rectangle sous sa hauteur AD, ou BC, & le Diametre AB de sa base AEBF, comme 314 est à 100.

DEMONSTRATION.

Parce que la Surface convexe du Cylindre droit ABCD est égale au Rectangle sous sa hauteur AD, ou BC, & la circonference de sa base AEBF, par Theor. 20. ce Rectangle, ou la Surface du Cylindre ABCD sera au Rectangle sous la même hauteur AD, ou BC, & le Diametre AB de sa base, comme la circonference AEBF, est au Diametre AB, par 1. 6. c'est pourquoy si à la place de cette circonference AEBF, & de son Diametre AB, on met 314, & 100, qui sont en même Raison, par Theor. 14. on connoitra que la Surface du Cylindre ABCD, est au Rectangle sous sa hauteur AD, ou BC, & le Diametre AB de sa base, comme 314 est à 100. Ce qu'il falloit démontrer.

THEOREME XXII.

*La Surface convexe d'un Cone droit est égale à la moitié du Rectangle sous le côté du Cone, & la circonference de sa base.*

341 Fig.

JE dis que la Surface convexe du Cone droit ABC, est égale à la moitié du Rectangle sous son côté AC, ou BC, & la circonference de sa Base AEBF.

DEMONSTRATION.

Si par tous les points de la circonference AEBF, on tire des lignes droites à la pointe C, ces lignes droites formeront une infinité de petits Triangles isoscèles égaux entre eux & de même hauteur qui est le côté du Cone: & parce que chacun de ces Triangles égaux est égal à la moitié d'un Rectangle de même base & de même hauteur, par 41. 1. il s'ensuit que leur somme, ou la Surface du Cone est égale à la moitié de la somme de tous les Rectangles, c'est. à dire au seul Rectangle sous le

Le côté du Cone AC ou BC, & la circonference de la base AEBF. *Ce qu'il falloit démontrer.* Plan-  
che 16.  
131. Fig.

Ou bien divisez par pensée le côté AC, ou BC, du Cone en une infinité de parties égales, & décrivez de la pointe C, comme Pole, par les points de division autant de circonférences de Cercle, qui seront en Progression arithmétique : & parce que la somme de toutes ces circonférences, ou quantitez en Progression arithmétique, qui remplissent la Surface du Cone, est égale à la moitié du produit sous la plus grande, qui est la circonference de la base AEBF, & le nombre de leur multitude, qui est le côté AC, ou BC, *par Theor. 10.* il s'ensuit que la Surface du Cone ABC, est égale à la moitié du Rectangle sous son côté AC, ou BC, & la circonference de sa base AEBF. *Ce qu'il falloit démontrer.*

### THEOREME XXIII.

*La Surface convexe du Cone droit est au Rectangle sous son côté & le Diametre de sa base, environ comme 157 est à 100.*

**J**E dis que la Surface convexe du Cone droit ABC, est au Rectangle sous son côté AC, ou BC, & le Diametre AB de sa base AEBF, comme 157 est à 100. 131. Fig.

#### DÉMONSTRATION.

Parce que la Surface du Cone ABC, est *par Theor. 12.* égale à la moitié du Rectangle sous le côté AC, ou BC, & la circonference AEBF de la base, ou égale au Rectangle sous le côté AC, ou BC, & la Demi-circonference AEB, ce Rectangle ; ou la Surface du Cone ABC, sera au Rectangle sous le même côté AC, ou BC, & le Diametre AB de la base, comme la Demi-circonference AEB, au Diametre AB, c'est à dire *par Theor. 14.* comme 157 à 100. *Ce qu'il falloit démontrer.*

## THEOREME XXIV.

*La Surface convexe d'un Cone droit tronqué est égale à la moitié du Rectangle sous son côté, & la somme des circonférences des deux bases opposées & parallèles.*

Plan-  
che 17.  
133. Fig.

JE dis que la Surface convexe du Cone droit tronqué ABCD, est égale à la moitié du Rectangle sous son côté AD, ou BC, & la somme des circonférences des deux bases opposées & parallèles AEBF, CODG.

## DEMONSTRATION.

Si l'on divise par pensée chacune des deux circonférences AEBF, CODG, en autant de parties égales infiniment plus petites l'une que l'autre, & que par les points opposés des divisions on tire autant de lignes droites, qui seront égales entre elles, & au côté AD, ou BC, on connoitra que la Surface du Cone tronqué ABCD, est composée d'une infinité de petits Trapezoïdes égaux entre eux, & de même hauteur qui est le côté AD, ou BC du Cone tronqué, & parce que chacun de ces Trapezoïdes égaux est égal à la moitié du Rectangle sous la même hauteur, ou sous le même côté AD, ou BC, & la somme des deux côtés opposés, & parallèles, par Theor. 4. il s'ensuit que leur somme, ou la Surface du Cone tronqué est égale à la moitié de la somme de tous les Rectangles, c'est à dire au seul Rectangle sous le côté AD, ou BC, du Cone tronqué, & la somme des deux circonférences opposées AEBF, CODG. Ce qu'il fallait démontrer.

## THEOREME XXV.


*La Surface convexe d'un Cone droit tronqué est au Rectangle sous son côté & la somme des Diamètres de ses deux bases opposées, environ comme 157 est à 100.*


133. Fig.

JE dis que la Surface convexe du Cone droit tronqué ABCD, est au Rectangle sous son côté AD, ou BC, & la somme des Diamètres AB, CD, des deux bases opposées AEBF, CODG, comme 157 est à 100.

## DEMONSTRATION.

Parce que la Surface du Cone droit tronqué ABCD, est égale





égale à la moitié du Rectangle sous le côté AD, ou BC, & la somme des deux circonférences AEBF, CODG, ou égale au Rectangle sous le côté AD, ou BC, & la moitié de la somme des deux circonférences AEBF, CODG, par Theor. 2. ce Rectangle, ou la Surface du Cone droit tronqué ABCD, sera au Rectangle sous le même côté AD, ou BC, & la somme des deux Diamètres AB, CD, comme la somme des deux Demi-circonférences AEB, COD, à la somme des deux Diamètres AB, CD, c'est à dire par Theor. 14. comme 157 est à 100. Ce qu'il falloit démontrer.

Plan.  
che 17.  
133. Fig.

## THEOREME XXVI.

Si l'on décrit un Cercle qui touchant les deux côtés égaux d'un Triangle isoscèle, les divise en deux également aux points d'atouchement, La Surface du Cone droit, qui a pour côté l'un des deux côtés égaux du Triangle, & pour base un Cercle dont le Diamètre soit égal à la base du même Triangle, est égale au Rectangle sous la hauteur du Triangle & la circonférence du Cercle qui touche les deux côtés.

Je dis que si l'on divise en deux également aux points E, F, chacun des deux côtés égaux AB, BC, du Triangle isoscèle ABC, dont la hauteur BD divise la base AC en deux également au point D, & que par le point E, l'on tire au côté AB, la perpendiculaire EG, qui rencontre icy la hauteur BD prolongée au point G, duquel comme centre on décrit le Cercle EFH, qui touche les deux côtés AB, BC, aux deux points E, F; la Surface du Cone droit qui a la ligne AB, ou BC, pour côté, & AC pour le Diamètre de sa base, est égale au Rectangle sous la hauteur BD, & la circonférence EFH.

134. Fig.

### PREPARATION.

Tirez par le point A, à la ligne EG, la parallèle AI, qui rencontrant la hauteur BD prolongée au point I, sera double du Rayon GE du Cercle EFH, & par conséquent égale à son Diamètre HK, à cause de AB double de BE, & des deux Triangles semblables ABI, EBG, &c.

### DEMONSTRATION.

Parce que par S. 6. les deux Triangles Rectangles ABD, I A

ADI,

Plan-  
che 16.  
134. Fig.

ADI, qui composent le Triangle rectangle ABI, sont semblables, & que par 4. 6. la Raison des deux lignes AB, BD, est égale à celle de la ligne AI, ou KH, à la ligne AD, si à la place des deux dernières lignes KH, AD, considérées comme les Diamètres de deux Cercles, on met leurs circonférences qui sont en même Raison, on connoitra que la Raison des deux lignes AB, BD, est égale à la Raison de la circonférence EFH, à la circonférence du Diamètre AD, moitié de la circonférence du Diamètre double AC, & par 16. 6. que le Rectangle sous AB, & la circonférence du Diamètre AD, c'est à dire par Theor. 22. la circonférence du Cone droit ABC, est égale au Rectangle sous BD, & la circonférence EFH. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME XXVII.

Si l'on décrit un Cercle, qui touchant les deux côtes égaux, & le plus petit des deux autres côtes parallèles d'un Trapezoïde isoscèle, divise chacun de ces trois côtes en deux également aux points d'attouchement, la Surface du Cone droit tronqué, qui a pour côté l'un des deux côtes égaux du Trapezoïde, & pour base un Cercle dont le Diamètre est égal au plus grand des deux côtes parallèles, est égale au Rectangle sous la ligne perpendiculaire tirée entre les deux côtes parallèles, & la circonférence du Cercle qui touche les trois côtes.

135. Fig. JE dis que si l'on divise en deux également aux points E, F, G, chacun des deux côtes égaux AB, CD, & le plus petit BC des deux côtes parallèles AD, BC, du Trapezoïde isoscèle ABCD, & qu'on décrive par les trois points E, F, G, le Cercle EGFK, qui touchera les trois côtes AB, BC, CD, aux mêmes points E, F, G, & qui aura son centre dans la ligne GH, qui divise à angles droits & en deux également les deux côtes parallèles AD, BC; la Surface du Cone droit tronqué qui a la ligne AB ou CD, pour côté, & AD pour le Diamètre de sa base, est égale au Rectangle sous la hauteur GH, & la circonférence EGFK.

## P R É P A R A T I O N.

Tirez par le point E, le Diamètre EK, qui sera perpendiculaire au côté AB, par 18. 3. & par les deux points E, F, la droite EF qui étant parallèle aux deux côtes AD, BC, coupera à angles droits & en deux également au point O,

la droite GH, tirez encore du point A, au côté BC prolongé, la perpendiculaire AL, qui sera égale à la ligne GH, & fera le Triangle rectangle ALB semblable au Triangle rectangle EOI, comme il sera aisé à connoître à celui, qui considérera que l'angle L étant droit, les deux autres LAB, LBA, sont ensemble égaux à un droit, par 32. 1. & par conséquent aux deux LAB, BAH, ou EIO, ou LBA, &c. D'où il suit que le Triangle rectangle ALB est aussi semblable au Triangle EFK, qui est rectangle en F, par 31. 3.

## DEMONSTRATION.

Parce que la ligne EF divise les deux côtés AB, CD, en deux également, & qu'ainsi elle est moyenne arithmétique entre les deux côtés AD, BC, auxquels elle est parallèle, elle sera égale à la moitié de leur somme, par Prop. 3. Chap. 4. L. 1. Trigon. C'est pourquoy en considérant ces trois lignes arithmétiquement proportionnelles BC, EF, AD, comme des circonférences de Cercle, la circonférence de la moyenne EF sera égale à la moitié de la somme des circonférences des deux extrêmes AD, BC.

Dans les Triangles semblables ALB, EFK, on connoît par 4. 6. que la ligne AB est à la ligne AL, ou GH, son égale, comme le Diametre EK, est au Diametre EF: c'est pourquoy si à la place de ces deux Diametres EF, EK, on met leurs circonférences qui sont en même Raison, on connoitra que la ligne AB est à la ligne GH, comme la circonférence EGKF, est à la circonférence EF, ou à la moitié des deux AD, BC, & par 16. 6. que le Rectangle sous le côté AB, & la moitié de la somme des deux circonférences AD, BC, est égal au Rectangle sous la hauteur GH, & la circonférence EGFK, c'est à dire par Theor. 24. à la Surface du Cone droit tronqué ABCD. Ce qu'il falloit démontrer.



## THEOREME XXVIII.

Si autour d'un Cercle on circonscrit un Polygone régulier d'un nombre pair de côtes, & que l'on fasse tourner ce Cercle avec son Polygone autour d'un Diamètre qui passe par deux angles opposés le Cercle formera par cette circonvolution entiere une Sphère, & le Polygone un corps terminé par plusieurs Surfaces convexes, dont la somme sera égale au Rectangle sous la circonférence du Cercle & la ligne droite ou Axe tiré par les deux angles opposés du Polygone.

Plap. 136.  
Fig. 136.

JE dis que si autour du Cercle, dont le centre est L, & le Diamètre est OP, on circonscrit un Polygone régulier d'un nombre pair de côtes, par exemple le Decagone ABCDEFGHIK, & qu'autour de la ligne AF, comme Axe, on fasse rouler ce Polygone, il se formera par cette circonvolution entiere un corps, dont les Surfaces convexes qui le bornent, sçavoir telles des deux Cônes droits EFG, BAK, des deux Cônes droits tronqués DEGH, BCIK; & du Cylindre CDHI, sont ensemble égales au Rectangle sous l'Axe AF, & la circonférence du Cercle generateur, dont le Diamètre est OP.

## DEMONSTRATION.

Parce que par Theor. 16. la Surface du Cone droit EFG est égale au Rectangle sous la circonférence du Diamètre OP, & la partie de l'Axe FM, & pareillement la Surface du Cone droit BAK égale au Rectangle sous la circonférence du Diamètre OP, & la partie correspondante de l'Axe AN; & que par Theor. 27. la Surface du Cone droit tronqué DEGH est égale au Rectangle sous la circonférence du même Diamètre OP; & la partie correspondante de l'Axe MQ, & pareillement la Surface du Cone droit tronqué BCIK, égale au Rectangle sous la circonférence du Diamètre OP, & la partie de l'Axe RN: & qu'enfin par Theor. 10. la Surface du Cylindre CDHI est égale au Rectangle sous la circonférence du Diamètre de sa base CI, égal au Diamètre OP, & sa hauteur CD, ou la partie correspondante de l'Axe QR; il est aisé de conclure par 1. 2. que toutes ces Surfaces sont ensemble égales au Rectangle sous la circonférence du Diamètre OP, & tout l'Axe AF. Ce qu'il falloit démontrer.

THEO.

## THEOREME XXIX.

*La Surface d'une Sphere est égale au Rectangle sous son Diametre, & la circonference du Cercle de ce Diametre.*

JE dis que la Surface de la Sphere ABCD, dont le Diametre est AC, est égale au Rectangle sous ce Diametre AC, & la circonference ABCD du Cercle de ce Diametre, qui est la même que celle du grand Cercle de la Sphere. Plan-  
che 17,  
137.Fig.

## DEMONSTRATION.

Parce que le Cercle peut être considéré comme un Polygone regulier d'une infinité de côtes, & que la Sphere est produite par la circonvolution entiere du Cercle ou Polygone ABCD, autour de son Diametre AC, comme Axe, toutes les Surfaces convexes qui sont produites par cette circonvolution, étant ensemble les mêmes que celles de la Sphere, seront égales, par Theor. 18. au Rectangle sous l'Axe AC, & la circonference du Cercle generateur ABCD. Ce qu'il falloit démontrer.

## COROLLAIRE I.

Il suit de ce Theorème, que la Surface d'une Sphere est quadruple de celle de son grand Cercle, parce que le Rectangle sous son Diametre & sa circonference, auquel la Surface de la Sphere est égale, est quadruple du Cercle de ce Diametre, puisque par Theor. 13. ce Cercle est égal à la moitié du Rectangle sous sa circonference & son Diametre. *voyez.*

## COROLLAIRE II.

Il s'ensuit aussi que la Surface de la Sphere ABCD, est égale à celle du Cylindre circonscrit EFGH, dont la hauteur EH, ou FG est égale au Diametre AC de la Sphere, & la base EIEK a pour Diametre la ligne EF égale au même Diametre AC; parce que par Theor. 10. la Surface de ce Cylindre sous est comme la Surface de la Sphere, égale au Rectangle sous la hauteur EH, ou AC, & la circonference du Cercle EIEK, dont le Diametre EF est égal au même Diametre AC de la Sphere.

Plan-  
che 17.  
137.Fig.

## COROLLAIRE III.

Il s'en suit encore que la Surface de la Sphere  $ABCD$ , est au Quarré  $EFGH$ , de son Diamètre  $AC$ , environ comme 314. est à 100, parce que par Theor. 21. la Surface du Cylindre circonscrit  $EFGH$ , est au même Quarré  $EFGH$ , qui est le Rectangle sous la hauteur  $EH$ , & le Diamètre  $EF$  de sa base  $EIFK$ , dans la même Raison de 314 à 100.

## COROLLAIRE IV.

Il s'en suit encore, que si l'on coupe la Sphere  $ABCD$ , & le Cylindre circonscrit  $EFGH$  par un Plan perpendiculaire à l'Axe  $AC$ , comme par le Plan  $LMNO$ , la Surface de la partie Cylindrique  $HLMNG$ , est égale à celle de la portion correspondante de la Sphere  $PQC$ , & pareillement la partie du Cylindre  $LEIFNO$  est égale à la portion correspondante de la Sphere  $PAQ$ .

## COROLLAIRE V.

D'où il suit que la Surface d'un Segment de Sphere, comme  $PCQ$ , est égale au Rectangle sous la hauteur  $CR$ , & la circonference  $ABCD$  du grand Cercle de la même Sphere, parce que la Surface du Cylindre  $HLMNG$ , auquel elle est égale, par Coroll. 4. est égale à un semblable Rectangle, par Theor. 20. & que par conséquent la Surface du même Segment de Sphere  $PCQ$ , est au Rectangle  $HLNG$ , sous la hauteur  $CR$ , & le Diamètre  $LN$  de la Sphere, environ comme 314 est à 100, parce que la Surface du Cylindre  $HLMNG$ , auquel elle est égale, par Coroll. 4. est au même Rectangle  $HLNG$ , dans la même Raison de 314 à 100; par Theor. 21.

## THEOREME XXX.

*La Surface d'un Segment de Sphere est égale à un Cercle, dont le Rayon est égal à la corde de la moitié de l'arc de ce Segment.*

137.Fig. JE dis que la Surface du Segment de Sphere  $PCQ$ , est égale au Cercle, dont le Rayon est égal à la corde  $CP$ , ou  $CQ$  de la moitié de l'arc  $PCQ$ : & que pareillement la Surface du Segment de Sphere  $ADPQB$  est égale au Cercle, dont le Rayon est égal à la corde  $AP$ , ou  $AQ$  de la moitié de l'arc  $PAQ$ .

D  
E

## D E M O N S T R A T I O N .

Parce que l'angle APC est droit, *par 31. 3.* & que la ligne PR est perpendiculaire à l'hypoténuse AC du Triangle rectangle APC, on connoît *par 8. 6.* que chacun des deux Triangles rectangles ARP, CRP, est équiangle au grand APC, & *par 4. 6.* que la ligne CP est moyenne proportionnelle entre les deux AC, CR, & pareillement la ligne AR moyenne proportionnelle entre les deux AC, AR; c'est pourquoy *par 17. 6.* le Quarré CP sera égal au Rectangle des lignes AC, CR, & pareillement le Quarré AP sera égal au Rectangle des lignes AC, AR: & comme ces deux Rectangles ont une même hauteur AC, ils seront entre eux comme leurs bases CR, AR, *par 1. 6.* Ainsi le Quarré CP, sera au Quarré AP, comme CR est à AR, ou comme LH est à LE, & si à ces deux dernières lignes LH, LE, considérées comme des hauteurs, on donne la circonférence ABCD du grand Cercle de la Sphere pour base commune, on connoîtra *par 1. 6.* que le Quarré CP est au Quarré AP, comme le Rectangle sous LH, & la circonférence ABCD, est au Rectangle sous LE, & la même circonférence ABCD, c'est à dire *par Coroll. 5. Theor. 29.* comme la Surface du Segment de Sphere PCQ, est à la Surface du Segment de Sphere ADPQB.

Puisque donc le Quarré CP est au Quarré AP, comme la Surface du Segment PCQ, est à la Surface du Segment ADPQB, on connoîtra *en composant*, que le Quarré AC est au Quarré AP, comme la Surface de la Sphere ABCD, est à la Surface du Segment ADPQB: & si à la place des Quarrés des lignes AC, AP, considérées comme des Rayons de Cercle, on met les aires de ces Cercles, qui sont en même Raison, *par 2. 12.* on connoîtra que le Cercle du Rayon AC, est au Cercle du Rayon AP, comme la Surface de la Sphere ABCD, est à la Surface du Segment ADPQB; & parce que les deux antecédens sont égaux, sçavoir le Cercle du Rayon AC, & la Surface de la Sphere ABCD, parce que *par 2. 12.* le Cercle du Rayon AC est quadruple du grand Cercle de la Sphere, dont le Rayon n'est que la moitié du Rayon AC, & que la Surface de la Sphere ABCD est aussi quadruple de l'aire de son grand Cercle, *par Coroll. 1. Theor. 29.* il s'ensuit que les deux Consequens sont aussi égaux, sçavoir le Cercle du Rayon AP, & la Surface du Segment ADPQB, & que par conséquent le Cercle du Rayon CP est aussi égal à la Surface du Segment PQC. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME XXXI.

*La Surface d'une Zone est égale à celle d'un Cylindre de même hauteur, & ayant pour base le grand Cercle de la Sphere.*

Plan-  
che 71.  
137. Fig. JE dis que si l'on coupe la Sphere ABCD, & le Cylindre circonscrit EFGH, par les deux Plans LMNO, SZTY, perpendiculaires à l'Axe AC, la Surface de la Zone VPQX est égale à celle du Cylindre LSZTNO, dont la hauteur LS est égale à la hauteur RK de la Zone, & la base SZTY est égale au grand Cercle de la Sphere.

## DEMONSTRATION.

Parce que la Surface du Segment de Sphere CPQ est égale à celle du Cylindre HLMNG, par Coroll. 4. Theor. 19. & que pareillement la Surface du Segment VPCQX, est égale à celle du Cylindre correspondant HSZTG, la difference des Surfaces des deux Segmens, qui est la Surface de la Zone VPQX, sera égale à la difference des Surfaces des deux Cylindres, qui est la Surface du Cylindre LSZTNO. Ce qu'il falloit démontrer.

## COROLLAIRE.

Il s'ensuit de ce Theorème, que la Surface d'une Zone, comme VPQX, est égale au Rectangle sous sa hauteur RQ, & la circonference ABCD du grand Cercle de la Sphere, parce que la Surface du Cylindre LSZTNO, à laquelle elle est égale, est égale au même Rectangle, par Theor. 20.

## SCOLIE.

138. Fig. En finissant cette Theorie, je desabuseray icy en passant plusieurs qui croient que comme la Surface de la Zone AMNC de l'Hemisphere ABC, dont le centre est O, & le Diametre est AC, est égale à la Surface du Cylindre correspondant AGHC: de même la Surface de la Zone AILC du Demi-sphéroïde ADC, dont le petit Axe est le même Diametre AC de l'Hemisphere ABC, & la moitié du grand Axe est OD, est égale à la Surface du même Cylindre AGHC de même base & de même hauteur que l'Hemisphere, & que le Demi-sphéroïde, & que par conséquent les Surfaces des

des deux Zones AILC, AMNC, sont égales entre elles, ce qui n'est pas vray, étant certain que celle de la Zone AILC du Demi-sphéroïde est plus petite que celle de la Zone AMNC de l'Hémisphère, ou que celle de la Zone AGHG du Cylindre, comme il a été très bien démontré par le R. P. Nicolas de la Compagnie de Jesus, qui est le plus habile Geometre que je connoisse de ce temps. D'où il est aisé de conclure que la Surface du Cylindre At FC est plus grand que la Surface du Demi-sphéroïde inscrit ADC, & qu'ainsi il n'est pas vray ce qu'un Auteur moderne a avancé dans un Livre qu'il a publié à Paris en l'année 1691. & aussi Errard dans sa *Geom. L. 3. Chap. 19.* sçavoir que la Surface d'un Sphéroïde long est à la Surface d'une Sphere inscrite dans le même Sphéroïde, comme le grand Axe est au petit. Voyez la fin de la *Seçt. 2. Chap. 3. Liv. 2. Méc.*

## CHAPITRE II.

### Des Problèmes.

**A**Près avoir expliqué la Theorie à part, nous viendrons à la pratique, sans y mettre d'autre démonstration qu'en citant le Theorème d'où elle dépend, afin qu'étant ainsi dégagée de la Theorie, elle en soit plus agreable & plus propre pour ceux qui se contentent de la seule pratique.

## PROBLEME I.

### Mesurer un Triangle.

**L**'Aire d'un Triangle se peut connoître en deux façons, sçavoir par le moyen d'un de ses côtez connus, & de sa perpendiculaire, qu'on peut mesurer mécaniquement sur le terrain: ou bien au moyen de ses trois côtez connus, sans aucune perpendiculaire, comme vous allez voir.

Pour donc mesurer l'Aire du Triangle ABC, par le moyen du côté connu AB, qui soit par exemple de 28 toises, & de sa perpendiculaire CD, que nous supposerons de 24 toises: multipliez ensemble ces deux nombres 28 & 24 du côté AB, & de sa perpendiculaire CD, & la moitié du produit 672, donnera 336 toises quarrées pour l'Aire du Triangle proposé ABC, parce qu'en multipliant le côté AB par sa perpendiculaire CD, le produit 672 est l'aire du Rectangle

AEFB,

140 TRAITE' DE GEOMETRIE. III. PARTIE.

Plan- AEF D, de même base & de même hauteur, qui est double  
che 17. de celle du Triangle ABC, par 41. 1.

Fig. Pour mesurer le même Triangle ABC, par le moyen de  
ses trois côtez connus AB, que nous

		42	42	42
côtez {	28	28	26	30
	26	—	—	—
	30	14	16	12
	—	—	—	—

84 contour du Triangle.

42 moitié du contour.

14 premier excés.

588 premier produit.

16 second excés.

9408 second produit.

12 troisième excés.

11 | 28 | 96 troisième produit.

3 | | ( 336 Aire du Triangle.

228

63

3996

666

000

Supposons de 28 toises, AC de 26 toises, & BC de 30 toises, ajoutez ensemble ces trois nombres 28, 26, 30, & la somme 84 sera le contour du Triangle ABC, dont la moitié est 42. Otez séparément de cette moitié 42 les côtez 28, 26, 30, pour avoir les trois excés 14, 16, 12. Multipliez la même moitié 42 par l'un des trois excés precedens, comme par le premier 14, & le produit 588 par l'un des deux autres excés, 16, 12, comme par 16, & le second produit 9408 par le dernier excés 12, pour avoir un troisième produit 112896, dont la Racine quarrée donnera 336 toises quarrées pour le contenu du Triangle proposé ABC, comme il est évident par Theor. 2.

## Remarques sur la premiere Methode.

Plat.  
che 17.  
139. Fig.

Il est évident qu'au lieu de multiplier la base AB par la hauteur CD, & prendre la moitié du produit pour avoir l'Aire du Triangle ABC, on peut multiplier la base AB par la moitié de la perpendiculaire CD : ou bien la moitié de la base AB par la perpendiculaire CD : mais dans la pratique, il est plus commode de multiplier ensemble ces deux lignes, & de prendre la moitié de leur produit, parce qu'elles n'auront pas toujours exactement leurs moitiés, & que la multiplication des Fractions est toujours moins commode que celle des Nombres entiers.

Lorsque la perpendiculaire CD ne sera pas bien longue, on la pourra mesurer très-facilement par le moyen d'un cordeau attaché au point C, en l'étendant jusqu'à ce qu'il touche & taze le côté AB, pour avoir dans la longueur de ce cordeau ainsi rendu, celle de la perpendiculaire CD : autrement, savoir lorsque la perpendiculaire CD sera bien longue, auquel cas on ne peut pas si commodément étendre le cordeau, on trouvera par le moyen du Bâton de l'Arpenteur, ou autrement le point D de la perpendiculaire, comme nous avons enseigné dans notre *Introduction aux Mathématiques*, après quoy il ne sera pas difficile de mesurer avec une chaîne & plusieurs Piquets, la longueur de la perpendiculaire CD, au cas qu'on la puisse parcourir, soit qu'elle tombe au dedans ou au dehors du Triangle, mais dans la pratique il sera plus facile de la faire tomber en dedans, parce qu'on est délivré de la peine de prolonger en dehors le côté sur lequel on veut tirer cette perpendiculaire.

Si l'on ne peut pas mesurer actuellement la longueur de la perpendiculaire CD, & qu'on puisse mesurer les trois côtés AB, AC, BC, on pourra-connoître par leur moyen la perpendiculaire CD, par 13. 2. lorsqu'elle tombe au dedans du Triangle ABC, ou par 12. 2. lorsqu'elle tombe en dehors. 140. Fig.

Que si l'on ne peut mesurer que deux côtés, comme les deux AB, AC, que l'on mesure à la place du troisième côté BC, l'angle A, afin que la perpendiculaire CD se puisse trouver par Probl. 2. Chap. 3. L. 2. Trig. & ensuite l'Aire du Triangle ABC, qui se peut aussi connoître par Theor. 1.

Lorsque le Triangle ABC sera isoscèle, comme si les deux côtés AC, BC, sont égaux entre eux, il ne sera pas besoin de calcul pour trouver les Segmens AD, BD, dont l'un doit être connu pour connoître la perpendiculaire CD, parce que chacun est égal dans ce cas à la moitié de la base AB. 141. Fig.

Il sera encore moins besoin de calcul pour l'invention de la perpendiculaire, lorsque le Triangle sera rectangle, car si par exemple l'angle A est droit, le côté AC servira de perpendiculaire 142. Fig.



Plan-  
che 17.  
142. Fig.

142. **TRAITS DE GEOMETRIE. III. PARTIE.**  
diculaire à l'égard de la base AB ; ainsi il n'y aura qu'à multiplier ensemble les deux côtes AB, AC, & prendre la moitié du produit, pour avoir l'Aire du Triangle proposé ABC. Comme si le côté AC est de 15 toises, & le côté AB de 20, multipliant ensemble ces deux nombres 15, & 20, & prenant la moitié de leur produit 300, on aura 150 toises quarrées pour l'Aire du Triangle rectangle ABC.

Si les deux côtes AB, AC, sont exprimez par des toises & par des pieds, on les reduira en pieds, en multipliant les toises par 6, parce qu'une toise courante a six pieds courans, & en ajoutant au produit les pieds de surplus, & l'on trouvera l'Aire en pieds quarrés, que l'on reduira si l'on veut en toises quarrées, en les divisant par 36, parce qu'une toise quarrée a 36 pieds quarrés. Ceci s'entendra mieux dans le Problème suivant.

*Remarques sur la seconde Methode.*


Si l'on ne peut pas exactement prendre la moitié de tous les côtes, en sorte qu'il reste 1 ; il ne faut pas negliger ce reste, parce que l'Aire du Triangle se trouveroit tres-imparfaite : & alors pour éviter les fractions, c'est à dire pour faire qu'il ne reste rien, on doublera tous les côtes, & par ces côtes doubles on cherchera l'Aire du Triangle qui sera quadruple de celle du Triangle proposé, par 19. 6. c'est pourquoy si l'on divise cette Aire trouvée par 4, on aura celle qu'on cherche.

143. Fig. Comme si le côté AB est de 6 Perches, le côté AC de 11, & le côté BC de 12, en doublant ces trois côtes on a 12, 22, 24, pour les côtes d'un Triangle quadruple, dont l'Aire se trouvera d'environ 135 Perches quarrées, dont le quart donne 33  $\frac{3}{4}$  Perches quarrées pour l'Aire du Triangle proposé ABC.






Si les côtes du Triangle à mesurer sont exprimez par des fractions de diverse espee, on reduira ces fractions en même dénomination ; après quoy on negligera leur Dénominateur commun, ayant seulement égard aux Numerateurs considerez comme les côtes du Triangle, & alors l'Aire qu'on trouvera doit être divisée par le quarré du Dénominateur commun, pour avoir l'Aire du Triangle proposé.

Comme si le côté AB est de  $3\frac{1}{2}$ , ou  $\frac{7}{2}$  pieds, AC de  $4\frac{1}{3}$ , ou  $\frac{14}{3}$  pieds, & BC de  $5\frac{2}{3}$ , ou  $\frac{16}{3}$  pieds, on reduira ces trois fractions impropres  $\frac{7}{2}$ ,  $\frac{14}{3}$ ,  $\frac{16}{3}$ , en ces trois au-

tres



73



êtres de même dénomination,  $\frac{42, 56, 69}{12}$  & en négligeant le Plan-  
che 17.  
140. Fig.  
Dénominateur commun 12, on cherchera l'Aire d'un Trian-  
gle ; dont les trois côtez soient 42, 56, 69, laquelle se  
trouvera d'environ 4702 pieds quarréz, qui étant divisez  
par le quarré 144 du Dénominateur commun 12, on aura  
 $32 \frac{47}{144}$  pieds quarréz pour l'Aire du Triangle proposé ABC.

Lorsque le Triangle proposé sera rectangle, comme ABC, 142. Fig.  
qui est Rectangle en A, il suffira d'ôter de la moitié du  
contour du Triangle chacun des deux côtez AB, AC, &  
de multiplier ensemble les deux excés : ou plus facilement  
il suffira d'ôter l'hypoténuse BC, & de multiplier l'excés  
par la moitié du contour, car par l'une de ces deux Metho-  
des on aura l'Aire du Triangle rectangle ABC, comme il  
est évident par Theor. 3.

Comme si le côté AB est de 20 toises, le côté AC de 15  
toises ; & par conséquent l'hypoténuse BC de 25 toises : la  
moitié du contour est 30, auquel ôtant chacun des deux  
côtés AB, AC, on a les deux excés 10, 15, dont le pro-  
duit 150 est l'Aire du Triangle ABC. Ou bien ôtant du  
Demi contour 30 l'hypoténuse BC, on a l'excés 5, par le-  
quel multipliant le demi-contour 30, il vient 150 toises  
quarrées comme auparavant pour l'Aire du Triangle pro-  
posé ABC.

Si le Triangle à mesurer est équilatéral, on en connoitra  
l'Aire en multipliant le quarré-quarré de l'un de ses côtez  
égaux toujours par 3, & en divisant la Racine quarrée du  
produit toujours par 4. Comme si chacun des côtez est de  
6 perches, le quarré-quarré de 6 est 1296, & la Racine-  
quarrée de son triple 3888 est environ 62, dont le quart  
est  $15 \frac{1}{2}$  Perches quarrées pour l'Aire d'un Triangle équi-  
lateral, dont chaque côté est de 6 Perches.

## PROBLEME II.

*Mesurer un Parallelogramme.*

IL est évident que si le Parallelogramme proposé est un Plan-  
Rectangle, comme ABCD, il n'y a qu'à multiplier sa Plan-  
longueur AB, par sa largeur AC, pour avoir son Aire. 143. Fig.  
comme si la longueur AB est de 125 toises, & la largeur  
AC de 64 toises, en multipliant ensemble ces deux nom-  
bres 125, 64, on aura 8000 toises quarrées pour l'Aire du  
Rectangle proposé ABCD.

Plan-  
che 18.  
244-Fig.

Il est évident aussi que si le Parallelogramme proposé est *obliquangle*, comme ABCD, dont les angles sont obliques, il faut multiplier l'un de ses côtez comme AB par sa perpendiculaire DE, qui part de l'angle opposé D, pour avoir son Aire, parce que par cette Multiplication, on a l'Aire du Rectangle DEFC, qui est égal au proposé ABCD, *par* 36. 1. Nous n'en donnons pas un exemple particulier, parce que la chose est trop facile à comprendre.

## S C O L I E.

Comme tout l'attitude de ce Problème se réduit à multiplier ensemble deux lignes. & qu'il arrive souvent que ces lignes sont exprimées par des fractions, j'ay crû qu'il étoit à propos de donner icy quelques exemples des difficultez qui peuvent arriver, pour ceux qui manquent de pratique, & qui ne sont pas assez vertez dans l'Arithmetique.

Pour trouver l'Aire du Parallelogramme ABCD, dont la base AB soit par exemple de 5 toises & 2 pieds, & la hauteur ED de 4 toises, réduisez ces 4 toises en pieds, en les multipliant par 6, pour avoir en leur place 24 pieds. Réduisez aussi la base AB en pieds, en multipliant par 6 les 5 toises qu'elle contient, pour avoir en leur place 30 pieds, auxquels on ajoutera les 2 pieds qui sont de surplus, & l'on aura 32 pieds pour la base AB, laquelle étant multipliée par la hauteur DE de 24 pieds, on aura 768 pieds quarrés, qui sont 21 toises quarrées & 12 pieds quarrés pour l'Aire du Parallelogramme proposé ABCD.

Ou bien sans reduire les côtez en pieds, multipliez premierement les 5 toises de la base AB, par les 4 toises de la hauteur ED, & vous aurez 20 toises quarrées : & ensuite les 2 pieds de la base AB, par les 4 toises, qui valent 24 pieds, de la même hauteur ED, & vous aurez 48 pieds quarrés, ou 1 toise quarrée & 12 pieds quarrés, tellement qu'on aura en tout 21 toises quarrées & 12 pieds quarrés, comme auparavant, pour la superficie qu'on cherche.

On peut aussi faire cette Multiplication par les parties aliquotes, en cette sorte. Ayant multiplié comme auparavant 5 toises par 4 toises, pour avoir 20 toises quarrées, il reste à multiplier encore 2 pieds par 4 toises, ce qui se fera en divisant 4 par 3, parce que 2 pieds sont la troisième partie de la toise qui vaut 6 pieds, & il viendra 1 toise quarrée & 2 pieds de toise quarrée, ce qui fait en tout 21 toises quarrées, & 2 pieds de toise quarrée, ou 12 pieds quarrés, parce qu'un pied de toise quarrée vaut 6 pieds quarrés, savoir autant que la toise courante a de pieds contrans, comme nous avons dit ailleurs.

Mais

Plan-  
che 18.  
144-Fig.  
Mais comme la memoire se trouve chargée par cette Methode, & qu'il est facile de s'y tromper, j'aime mieux redire les côtez qu'il faut multiplier ensemble, en la plus basse espee, quand il y a des especes differentes. Comme si la base AB étoit de 3 toises & 2 pieds, & la hauteur ED de 3 toises & 3 pieds, il faudroit réduire chacune de ces deux lignes en pieds, & multiplier les 20 pieds de la base AB, par les 15 pieds de la hauteur ED. & le produit donneroit 300 pieds quarréz, qui font 8 toises quarrées & 12 pouces quarréz pour l'Aire du Parallelogramme ABCD, comme l'on connoît en divisant par 36 les 300 pieds quarréz trouvez, parce qu'une toise quarrée a 36 pieds quarréz.

Pareillement si la base AB, & la hauteur ED, étoient exprimées en toises, pieds, & poutés, il les faudroit reduire en la plus basse espee, sçavoir en poutés, en multipliant premièrement les toises par 6; parce qu'une toise courante a 6 pieds courans, pour avoir des pieds, auxquels on ajoutera les pieds de surplus; & en multipliant la somme de ces pieds par 12, parce qu'un pied courant a 12 poutés courans, & l'on aura des poutés, auxquels on ajoutera les poutés de surplus, après quoy on multipliera les poutés de la base AB, par les poutés de la hauteur ED, pour avoir l'Aire qu'on cherche en poutés quarréz, que l'on pourra réduire si l'on veut en pieds quarréz; en les divisant par 144, parce qu'un pied quarré a 144 poutés quarréz, & les pieds quarréz en toises quarrées; en les divisant par 36, parce qu'une toise quarrée a 36 pieds quarréz.

Comme si la base AB étoit par exemple de 5 toises, 3 pieds, & 6 poutés, & la hauteur ED de 2 toises, 4 pieds, & 8 poutés; en réduisant chacune de ces deux lignes en poutés, on aura 402 poutés pour la base AB, & 200 poutés pour la hauteur ED: & si l'on multiplie ensemble ces deux nombres 402, 200, on aura 80400 poutés quarréz pour l'Aire du Parallelogramme ABCD, si l'on réduit ces 80400 poutés quarréz trouvez en pieds quarréz, en les divisant par 144, on aura 558 pieds quarréz, & 48 poutés quarréz; & encore si l'on réduit ces 558 pieds quarréz en toises quarrées, en les divisant par 36, on aura 15 toises quarrées, & 18 pieds quarréz, & en tout 15 toises quarrées, 18 pieds quarréz, & 48 poutés quarréz pour l'Aire qu'on cherche.

On peut venir tout d'un coup aux toises, en divisant les 80400 poutés quarréz trouvez par 5184, qui est la valeur d'une toise quarrée en poutés quarréz, parce qu'une toise courante a 72 poutés courans, & l'on aura 15 toises quarrées; & le reste 2640 sera pris pour des pieds quarréz, lesquels étant divisez par 144, on aura 18 pieds quarréz, & le

Plan-  
che 18.  
244 Fig. reste de la division donnera 48 pouces quarréz comme au-  
paravant.

## S C O L I E.

Il ne sera pas besoin de mesurer aucune perpendiculaire, lorsque le Parallelogramme proposé sera un Rhombe, parce que son Aire est égale à la moitié du produit sous les deux Diagonales, comme il est aisé à démontrer.

## P R O B L E M E III.

*Mesurer un Trapeze.*

135. Fig. **P**Remierement si le Trapeze proposé est un Trapezoïde, comme ABCD, dont les deux côtez opposez AB, CD, sont paralleles, mesurez exactement la longueur de chacun de ces deux côtez paralleles AB, CD, & aussi celle de leur perpendiculaire DE, & multipliez la somme des deux mêmes côtez AB, CD, par cette perpendiculaire DE, pour avoir en la moitié du produit l'Aire du Trapezoïde proposé, ABCD, par Theor. 4. Comme si la perpendiculaire DE est de 24 toises, le côté AB de 25, & l'autre côté parallele CD de 16 : la somme de ces deux côtez paralleles AB, CD, est 41, laquelle étant multipliée par la perpendiculaire DE, que nous avons supposé de 24 toises, la moitié du produit 984, donnera 492 toises quarrées pour l'Aire qu'on cherche.

146. Fig. Mais si le Trapeze proposé n'a point de côtez paralleles, comme ABCD, dont le côté AB sera supposé de 21 toises, BC de 15, CD de 8, & AD de 10, on le reduira en deux Triangles par la Diagonale BD, qui soit par exemple de 17 toises. Dans cette supposition, l'Aire du Triangle BCD, dont les trois côtez sont connus, sera de 60 toises quarrées, & celle du Triangle ADB se trouvera de 84 toises quarrées, par Probl. 1. C'est pourquoy si l'on ajoûte ensemble ces deux Aires trouvées 60, 84, on aura 144 toises quarrées pour la Surface du Trapeze proposé ABCD.

## S C O L I E.

Quand on voudra mesurer les deux Triangles ABD, BCD, par leurs perpendiculaires, on les pourra tirer de tel angle que l'on voudra sur son côté opposé, selon la commodité : comme icy on a tiré la perpendiculaire DE de l'angle D, sur son côté opposé AB, & la perpendiculaire CF de l'angle

l'angle C, sur son côté opposé ou Diagonale BD. Mais quand on le pourra commodément, il sera bon de tirer les deux perpendiculaires sur la même Diagonale BD, parce que cette Diagonale BD étant multipliée par la somme de ses deux perpendiculaires, on aura en la moitié du produit l'Aire du Trapeze proposé ABCD, comme il est évident par 1. 2.

Plan-  
che 18.  
146. Fig.

La Diagonale BD se doit mesurer sur le terrain, parce qu'elle n'a point de rapport déterminé avec les quatre côtes, excepté quand le Quadrilatere ABCD est dans un Cercle, auquel cas si l'on nomme  $a$  le côté AB,  $b$  le côté BC,  $c$  le côté CD, &  $d$  le côté AD, le carré de la Diagonale BD sera proportionnel aux trois Plans  $ad+bc$ ,  $ab+cd$ ,  $ac+bd$ , & le carré de l'autre Diagonale AC sera proportionnel aux trois Plans  $ab+cd$ ,  $ac+bd$ ,  $ad+bc$ . Ainsi quand les quatre côtes seront connus, les Diagonales seront aussi connues, & par conséquent l'Aire du Trapeze ABCD. Mais cette Aire se peut trouver indépendamment de la Diagonale AC, ou BD, par cette règle qui a sa démonstration.

147. Fig.

Ayant ajouté ensemble les quatre côtes AB, BC, CD, AD, & séparément de la moitié de leur somme chaque côté, & multiplié ensemble les quatre excès, pour avoir en la Racine quarrée de leur produit plan-plan l'Aire qu'on cherche. Comme si le côté AB est de 100 pieds, le côté BC de 63, le côté CD de 45, & le côté AD de 80, la moitié de la somme de ces quatre côtes 100, 63, 45, 80, est 144, de laquelle ôtant séparément les mêmes côtes 100, 63, 45, 80, il reste ces quatre nombres ou excès 44, 64, 81, 99, dont le produit plan-plan est 22581504, duquel la Racine quarrée donne 4752 pieds quarez pour l'Aire du Quadrilatere proposé ABCD.

Pareillement si le côté AB est de 18 toises, BC de 11, CD de 2, & AD de 23, son contour sera de 54 toises, & la moitié par conséquent de 27 toises, d'où ôtant séparément les quatre côtes 18, 11, 2, 23, il reste ces quatre nombres 9, 16, 25, 4, qui se rencontrant quarez, leur produit plan-plan sera aussi un nombre quarré, sçavoir 14400; dont la Racine quarrée donnera 120 toises quarrées pour l'Aire qu'on cherche.

Si le terrain ne vous permet pas de mesurer commodément aucune des deux Diagonales, décrivez autour du Quadrilatere ABCD le Parallelogramme EBCF, dont l'Aire étant mesurée par Probl. 1. aussi bien que celles des deux Triangles AED, CFD, on ôtera la somme de ces deux Aires de celle du Parallelogramme, pour avoir au reste la superficie du Trapeze proposé ABCD.

148. Fig.



## PROBLEME IV.

*Mesurer un Polygone regulier.*Plan-  
che 18.  
449. Fig.

**P**OUR trouver la superficie d'un Polygone regulier, comme de l'Exagone ABCDEF, dont le centre G est le même que celui du cercle circonscrit, tirez de ce centre G, sur le milieu d'un des côtez, comme de AB, la perpendiculaire GH, qu'il faudra connoître avant toute autre chose par le moyen du côté connu AB, que nous supposerons de 120 toises, en cette sorte.

Divisez le cercle entier, ou 360 degrez par le nombre des côtez du Polygone, comme icy par 6, le quotient donnera 60 degrez pour l'angle du centre AGB, c'est pourquoy la moitié, ou l'angle AGH sera de 30 degrez, dont le complement GAH, qui est la moitié de l'angle du Polygone, sera par conséquent de 60 degrez. Ainsi dans le Triangle rectangle AGH, on connoît outre les angles, le côté AH de 60 toises, comme étant la moitié du côté AB, que nous avons supposé de 120 toises, c'est pourquoy on pourra trouver l'autre côté, ou la perpendiculaire GH, par cette Analogie,

<i>Comme le Sinus Total</i>	100000
<i>A la Tangente de la moitié de l'angle du Polygone</i>	173205
<i>Ainsi la moitié du côté du Polygone</i>	60
<i>A la perpendiculaire GH</i>	103. 5. 6.

qui se trouvera de 103 toises, 5 pieds, & d'environ 6 pouces, par laquelle multipliant le contour de l'Exagone, qui est de 720 toises, la moitié du produit donnera 37410 toises quarrées pour l'Aire de l'Exagone proposé ABCDEF, dont la démonstration est évidente par Theor. 5.

## S C O L I E.

Tant soit peu qu'on s'éloigne de la veritable longueur de la perpendiculaire, en négligeant les fractions, on s'éloignera sensiblement de la veritable Aire du Polygone, sur tout quand son côté sera d'une grandeur considerable; car pour avoir icy négligé les fractions de pouces dans la longueur de la perpendiculaire, nous nous sommes manqué de deux toises quarrées dans l'Aire de l'Exagone, comme vous connoîtrez en suivant cette Regle particuliere pour trouver  
autant

autant exactement qu'il est possible l'Aire d'un Polygone régulier, dont le côté est connu.

Plan-  
che 18.  
149. Fig.

*Multipliez la Tangente de la moitié de l'angle du Polygone par le costé du même Polygone, & multipliez le produit par le contour du Polygone, pour avoir un second produit, dont le quart étant divisé par le Sinus Total, on aura l'Aire qu'on cherche. Comme dans cet exemple, la moitié de l'angle du Polygone étant de 60 degrez, si l'on multiplie la Tangente 173203 par le côté du Polygone, que nous avons supposé de 120 toises, on aura ce premier produit 20784600, lequel étant multiplié par le contour du Polygone, qui est de 720 toises, on aura ce second produit 14964912000, dont le quart 3741228000 étant divisé par le Rayon 100000, on aura 37412 toises quarrées pour la superficie de l'Exagone proposé ABCDEF.*

C'est par ce Canon que nous avons supputé la Table suivante, qui montre les Aires des Polygones réguliers, depuis le Triangle jusqu'au Dodecagone, le côté du Polygone étant par tout supposé de 1000 toises, ayant choisi ce nombre 1000 plutôt qu'un autre, parce qu'il est plus commode non-seulement pour la supputation de la Table,

Triangle	433013
Quarré	1000000
Pentagone	1720477
Exagone	2398075
Eptagone	3633526
Octogone	4828427
Enneagone	6181824
Decagone	7694209
Endécagone	9363808
Dodecagone	11196132

mais encore pour son usage, qui est que par son moyen, l'on peut aisément connoître l'Aire d'un Polygone proposé, dont le côté est plus grand & plus petit que de 1000 toises, ou que de 1000 pieds, &c. car comme les Polygones semblables sont entre eux comme les Quarrez de leurs côtés homologues, par 20. 6. on connoît aisément qu'il n'y a qu'à multiplier le quarré du côté du Polygone proposé par l'Aire qui luy répond dans la Table precedente, & diviser le produit par le quarré de 1000, qui est 1000000, ce qui se fera en retranchant de ce produit six figures à la droite. Comme icy, on multipliera l'Aire de l'Exagone que l'on trouve dans la Table precedente, sçavoir 2398075, par le quarré 14400 du côté de l'Exagone, que nous avons supposé de 120 toises, & l'on divisera le produit

150. Plan- che 18. 149. Fig. **TRAITS DE GEOMETRIE. III. PARTIE.**  
 duit 37412280000 par 100000, le quotient donnera, com-  
 me auparavant, 37412 toises quarrées pour l'Aire qu'on  
 cherche.

## PROBLEME V.

*Mesurer un Polygone irregulier.*

150. Fig. **U**N Polygone irregulier se mesurera comme le Trapeze, que nous avons reduit en deux Triangles par une Diagonale, sçavoir en reduisant le Polygone irregulier en Triangles par plusieurs Diagonales tirées comme l'on voudra d'un angle à l'autre, & en mesurant *par Probl. 1.* les Aires de tous ces Triangles, parce que leur somme donnera celle du Polygone proposé. C'est ainsi que nous avons reduit le Pentagone ABCDE, aux trois Triangles ABE, BDE, BCD, par les deux Diagonales BE, BD: & c'est de la même façon que l'on pourra reduire en Triangles l'Eptagone irregulier ABCDEFG, ou bien si on le trouve plus commode, on menera une ligne droite par les deux angles les plus éloignez, comme CG, qu'on appelle communément *Ligne fondamentale*, à laquelle on tirera de tous les autres angles autant de perpendiculaires qui diviseront la figure proposée en des Triangles rectangles, & en des Trapezoïdes, dont on pourra connoître les Aires par les *Probl. 1. 2.* pour avoir en leur somme l'Aire qu'on cherche.
151. Fig.

## SCOLIE.

152. Fig. Lorsque'il n'est pas libre de tirer des Diagonales au dedans du Polygone à mesurer, comme de l'Exagone ABCDEF, pour le reduire en Triangles, on décrira tout autour le Parallelogramme AGHI, dont l'Aire se pourra connoître *par Probl. 2.* de laquelle si l'on ôte les aires de tous les Triangles qui se forment autour de la figure, & qui se pourront aisément mesurer *par Probl. 1.* le reste sera l'Aire de l'Exagone proposé ABCDEF.

Il est évident que par cette maniere on peut aisément lever par le dehors un Plan accessible sur la terre, comme ABCDEF, parce qu'ayant mesuré bien exactement les côtes de tous les Triangles qui se forment au dedans du Parallelogramme AGHI, il sera facile en prenant les mesures de toutes ces lignes sur une échelle particulière, ou sur les parties égales du Compas de proportion, de raccourcir tous ces Triangles, & avoir ainsi la figure reduite en petit volume sur le papier.

Comme

Comme il arrive souvent que les Terres que l'on veut arpenter sont bornées par des lignes courbes, on prendra ces lignes courbes pour droites, quand la difference sera petite; ou bien on les divisera en plusieurs petites parties, qui pourront passer pour des lignes droites, en considerant la figure comme un Polygone de plusieurs petits côtez, que l'on mesurera, comme il vient d'être enseigné, sans que l'erreur puisse être considerable: ou bien encore en tirant des lignes droites au travers des lignes courbes, en sorte qu'à la veüe elles recompensent en dehors ce qu'elles retrancheront de la figure, sans que l'erreur puisse être sensible, sur tout lorsqu'on veut mesurer sur une carte particuliere le contenu d'un Lac, ou de quelque Province.

Plan-  
che 18.  
152. Fig.

153. Fig.

## PROBLEME VI.

*Mesurer la circonference d'un Cercle par son Diametre connu.*

POUR trouver la circonference du Cercle ABCD, dont le Diametre AC soit par exemple de 125 pieds, on multipliera ce Diametre 125 toujours par 314, & l'on divisera le produit 39250 toujours par 100, & le quotient donnera 392 pieds, 6 pouces, pour la circonference ABCD qu'on cherche, comme il est évident par Theor. 14. qui nous apprend qu'on pourroit aussi multiplier le Diametre 125 par 22, & diviser le produit 2750 par 7, & l'on auroit 392 pieds, 10 pouces pour la circonference ABCD, qui se rencontre plus grande qu'auparavant, parce que comme nous avons remarqué, le nombre 22 est plus grand qu'il ne faut à l'égard du Diviseur 7, comme le nombre 314 est moindre qu'il ne faut à l'égard du Diviseur 100, mais la difference n'est pas si grande. C'est pourquoy la circonference ABCD approchera plus de 392 pieds, 6 pouces, que de 392 pieds 10 pouces: & pour l'avoir encore plus proche, multipliez le Diametre 125 par 314159, & divisez le produit 39269875 par 100000, & alors la circonference ABCD se trouvera de 392 pieds, & d'environ 8 pouces.

154. Fig.

## PROBLEME VII.

*Mesurer le Diametre d'un cercle par sa circonference connue.*

Plan-  
che 18.  
354.Fig.

**P**OUR trouver le Diametre AC d'un cercle, dont la circonference ABCD soit par exemple de 125 toises, multipliez cette circonference 125 toujours par 100, & divisez le produit 12500 toujours par 314, le quotient donnera 39 toises & environ 5 pieds pour le Diametre AC qu'on cherche, comme il est évident par Theor. 14. où nous avons dit que pour les grands calculs on doit se servir de la Raison de 100000 à 314159, comme pour trouver le Diametre de la Terre, dont la circonference est de 7200 lieues de Marine, parce qu'on a remarqué qu'un degré de la circonference de la Terre est de 20 lieues de Marine, on multipliera cette circonference 7200 par 100000, & l'on divisera le produit 720000000, par 314159, le quotient donnera environ 2292 lieues pour le Diametre qu'on cherche, ou pour la distance qu'il y a d'ici à nos Antipodes, dont la moitié donne 1146 lieues pour le Demi-diametre de la Terre, ou pour la distance qu'il y a d'icy au centre de la Terre.

## PROBLEME VIII.

*Mesurer l'Aire d'un Cercle par son Diametre connu.*

354.Fig.

**P**OUR trouver l'Aire du Cercle ABCD, dont le Diametre AC soit par exemple de 125 pieds; on multipliera ce Diametre 125 par sa circonference, qui par Probl. 6. a été trouvée de 392 pieds, 8 pouces, ou de 4712 pouces; & le quart du produit donnera 12270 pieds quarréz, & environ 120 pouces quarréz pour l'Aire du cercle proposé ABCD, comme il est évident par Theor. 13.

## S C O L I E.

Pour éviter les fractions qui arrivent à la circonference du cercle, après avoir multiplié le Diametre 125 par 314, ne divisez pas encore le produit 39250 par 100; comme il faudroit faire pour avoir la circonference, mais multipliez-le par le même Diametre 125, pour avoir un second produit

duit 4906250, dont le quart 1226562 <sup>1</sup> — étant divisé par 100, <sup>Plan-</sup>che 18.  
vous aurez 12265 pieds quarez & 90 pouces quarez pour 154-Fig.  
l'Aire du cercle proposé ABCD.

Ou bien parce que par *Theor. 15.* le carré du Diametre d'un cercle est à l'Aire du même cercle, environ comme 1000 à 785, si vous multipliez le Diametre 125 par luy-même, pour avoir son carré 15625, & ce carré 15625 toujours par 785, & que vous divisez le produit 12265625 toujours par 1000, vous aurez comme auparavant 12265 pieds quarez, & 90 pouces quarez pour l'aire qu'on cherche.

Cette Aire se trouve plus facilement que la premiere, où nous avons négligé les fractions de pouce: & si vous en voulez une troisième plus exacte, servez-vous de la Raison de 1000000 à 785398, au lieu de celle de 100 à 785, c'est à dire, multipliez le carré 15625 du Diametre 125 par 785398, & divisez le produit 12271843750 par 1000000, le quotient donnera 12271 pieds quarez, & environ 121 pouces quarez pour la superficie du cercle proposé ABCD.

C'est par cette maniere que nous avons construit la Table suivante, qui montre en nombres entiers & en parties cent-millièmes qui sont séparées des entiers par un point à la droite, les Aires des cercles, dont les Diametres sont connus depuis 1 jusqu'à 100.

Table des Aires des Cercles pour un Diametre d'une grandeur connue, depuis 1, jusqu'à 100.

Diam.	Aires.	Diam.	Aires.
1	0.78540	31	754.76763
2	3.14159	32	804.24771
3	7.06858	33	855.29859
4	12.56637	34	907.92027
5	19.63495	35	962.11275
6	28.27433	36	1017.87601
7	38.48451	37	1075.21008
8	50.26548	38	1134.11494
9	63.61725	39	1194.59060
10	78.53981	40	1256.63706
11	95.03317	41	1320.25431
12	113.09733	42	1385.44230
13	132.73228	43	1452.20120
14	153.93804	44	1520.53084
15	176.7458	45	1590.43128
16	201.06192	46	1661.90251
17	226.98006	47	1734.94454
18	254.46900	48	1809.55736
19	283.52873	49	1885.74099
20	314.15926	50	1963.49540
21	346.36059	51	2042.82062
22	380.13271	52	2123.71663
23	415.47562	53	2206.18344
24	452.38934	54	2290.22104
25	490.87385	55	2375.82944
26	530.92915	56	2463.00864
27	572.55526	57	2551.75863
28	615.75216	58	2642.07942
29	660.51985	59	2733.97100
30	706.85834	60	2827.43338

Diam.

<i>Diam.</i>	<i>Aires.</i>	<i>Diam.</i>	<i>Aires.</i>
61	2922.46656	81	5152.99735
62	3019.07054	82	5281.01725
63	3117.24531	83	5410.60794
64	3216.99087	84	5541.76944
65	3318.30724	85	5674.50173
66	3421.19439	86	5808.80481
67	3525.65235	87	5944.67869
68	3631.68110	88	6082.12337
69	3739.28065	89	6221.13885
70	3848.45100	90	6361.72512
71	3959.19214	91	6503.88219
72	4071.50407	92	6647.01005
73	4185.38681	93	6792.90871
74	4300.84034	94	6939.77817
75	4417.86466	95	7088.21842
76	4536.45979	96	7238.22947
77	4656.62571	97	7389.81131
78	4778.36242	98	7542.96396
79	4901.06993	99	7697.68739
80	5026.54824	100	7853.98163

Ainsi l'on connoît par cette Table, que l'Aire d'un cercle qui a 56 pieds de Diametre, est de 2463 pieds quarré, & 864 centmillièmes parties, qui valent environ 1 ponce quarré, comme l'on connoît en multipliant le Numérateur 864 par 144, parce qu'un pied quarré a 144 ponces quarré, & en divisant le produit 124416 par le Dénominateur 100000.



## PROBLEME IX.

*Mesurer l'Aire d'un Cercle par sa circonference connue.*

Plan-  
che 18.  
154. Fig.

**P**OUR trouver la superficie du cercle, dont le Diametre est AC, par sa circonference connue ABCD, qui soit par exemple de 125 toises, comme seroit le contour du Bassin d'une Fontaine, on multipliera cette circonference 125 par le Diametre AC, qui par Probl. 7. a été trouvé de 39 toises 5 pieds, ou de 239 pieds, & le quart du produit donnera 1244 toises quarrées, & environ 28 pieds quarréz pour l'Aire du cercle proposé ABCD.

## S C O L I E.

Pour éviter les fractions qui arrivent au Diametre du cercle, après avoir multiplié la circonference 125 par 100, ne divisez pas encore le produit 12500 par 314, comme il faudroit faire pour avoir le Diametre, mais multipliez-le par la même circonference 125, pour avoir un second produit 1562500, dont le quart 390625 étant divisé par 314, vous aurez 1244 toises quarrées, & environ 1 pied quarré pour l'Aire qu'on cherche.

Comme le second produit 1562500 n'est autre chose que le produit sous le quarré de la circonference & 100, & que la Raison de 100000 à 314159 est plus exacte que celle de 100 à 314, comme nous avons reconnu au Probl. 14. on aura l'Aire qu'on cherche, encore plus exactement qu'au paravant, si on multiplie par 100000 le quarré 15625 de la circonference 125, & qu'on divise le quart 390625000 du produit 1562500000, par 314159, le quotient donnera 1243 toises quarrées, & environ 14 pieds quarréz pour l'Aire exacte du cercle proposé ABCD.

FIN

## PROBLEME X.

Mesurer le Diametre d'un Cercle, par son Aire connue.

PARce que par Theor. 13. l'Aire d'un cercle est égale à la moitié du Rectangle sous sa circonférence & son Rayon, & par consequent au quart du Rectangle sous sa circonférence & son Diametre, il s'ensuit que si par le moyen du Problème suivant, on trouve la circonférence, & que par cette circonférence on divise le quadruple de l'Aire connue, on aura le Diametre répondant à cette Aire. Mais comme nous n'avons pas la circonférence, on fera ainsi.

- Pour trouver le-Diametre AC du cercle ABCD, dont l'Aire soit par exemple. de 125 pieds quarréz, il faut se souvenir de ce que nous avons démontré au Theor. 15. sçavoir que l'Aire d'un Cercle est au quarré de son Diametre, environ comme 785 à 1000: c'est pourquoy si l'on multiplie l'Aire 125 par 1000, & qu'on divise le produit 125000 par 785, la Racine quarrée du quotient 159 donnera 12 pieds; & environ 7 poudes pour le Diametre qu'on cherche.

Plan-  
che 18.  
154. Fig.

## S C O L I E.

Comme la Raison de 785398 à 1000000 est plus exacte que celle de 785 à 1000, en se servant de cette seconde Raison plus exacte, on trouvera aussi plus exactement le Diametre AC. Si donc on multiplie l'Aire donnée 125 par 1000000, & qu'on divise le produit 125000000 par 785398, la Racine quarrée du quotient 159, donnera 12 pieds & environ 7 poudes pour le Diametre AC.

C'est par cette maniere que nous avons supputé la Table suivante, qui montre en nombres entiers & en parties cent-millièmes qui sont séparées des entiers par un point à la droite, les Diametres des cercles, dont les Aires sont connus depuis 1 jusqu'à 100.

Table des Diametres des Cercles, dont les Aires sont connues depuis 1 jusqu'à 100.

Aires.	Diamet.	Aires.	Diamet.
1	1.12838	31	6.28254
2	1.59576	32	6.38304
3	1.95441	33	6.48204
4	2.25676	34	6.57952
5	2.52313	35	6.67558
6	2.76395	36	6.77028
7	2.98541	37	6.86366
8	3.19192	38	6.95579
9	3.38514	39	7.04673
10	3.56824	40	7.13648
11	3.74240	41	7.22515
12	3.90882	42	7.31272
13	4.06843	43	7.39928
14	4.22200	44	7.48480
15	4.37019	45	7.56939
16	4.51352	46	7.65304
17	4.65242	47	7.73578
18	4.78728	48	7.81764
19	4.91849	49	7.89865
20	5.04626	50	7.97885
21	5.17088	51	8.05824
22	5.29256	52	8.13686
23	5.41151	53	8.21481
24	5.52790	54	8.29185
25	5.64190	55	8.36829
26	5.75362	56	8.44400
27	5.86323	57	8.51907
28	5.97082	58	8.59347
29	6.07650	59	8.66724
30	6.18038	60	8.74038

Aires.	Diamet.	Aires.	Diamet.
61	8.81292	81	10.15541
62	8.88487	82	10.21790
63	8.95623	83	10.28001
64	9.02703	84	10.34176
65	9.09727	85	10.40314
66	9.16700	86	10.46416
67	9.23618	87	10.52482
68	9.30484	88	10.58512
69	9.37302	89	10.64516
70	9.44069	90	10.70474
71	9.50789	91	10.76405
72	9.57456	92	10.82302
73	9.64072	93	10.88169
74	9.70668	94	10.94004
75	9.77205	95	10.99806
76	9.83698	96	11.05581
77	9.90148	97	11.11325
78	9.96557	98	11.17038
79	10.02924	99	11.22723
80	10.09253	100	11.28379

Ainsi l'on connoît par cette Table , que le Diametre d'un cercle , dont l'Aire contient 30 pieds quarréz , est de 6 pieds , & 18038 centmillièmes parties d'un pied , qui valent environ 2 pouces que l'on a trouvez en multipliant le Numérateur 18038 par 12 , parce qu'un pied courant a 12 pouces courans , & en divisant le produit 216456 par le Dénominateur 100000.

## PROBLEME XI.

*Mesurer la circonference d'un Cercle, par son Aire connue.*

Plan.  
che 18.  
154. Fig.

**P**ARce que par Theor. 13. l'Aire d'un cercle est égale à la moitié du Rectangle sous la circonference & son Demi-diametre, & par conséquent le quadruple de l'Aire, égal au Rectangle sous la circonference & le Diametre, il s'ensuit que si l'on divise le quadruple de l'Aire connue par son Diametre, qui se peut trouver par Probl. 10. on aura la circonference du Cercle.

Comme si l'on donne 125 pieds quarréz pour l'Aire du Cercle ABCD, dont le Diametre AC a été trouvé au Probl. 10. de 12 pieds, 7 pouces, ou de 151 pouces, en divisant 500 pieds quarréz, ou 72000 pouces quarréz, qui est le quadruple de l'Aire proposée 125, par le Diametre 151, on aura 477 pouces, ou 39 pieds, 9 pouces pour la circonference ABCD, du Cercle; dont l'Aire est de 125 pieds quarréz.

## S C O L I E.

On peut trouver immédiatement cette circonference, sçavoir en multipliant le quadruple 500 de l'Aire donnée 125, toujours par 314, & en divisant la Racine quarrée 396 du produit 157000 toujours par 10, le quotient donnera 39 pieds & environ 7 pouces pour la quantité de la circonference ABCD; qui est plus exacte que la première: & l'on en peut avoir une troisième encore plus exacte, en multipliant le quadruple 500 de l'Aire donnée 125, toujours par 3141592, & en divisant la Racine quarrée 39633 du produit 1570756000 toujours par 1000, le quotient donnera 39 pieds, & environ 7 pouces, comme auparavant, pour la circonference qu'on cherche.

## PROBLEME XII.

*Mesurer un Secteur de Cercle, moindre qu'un Demi-cercle.*

154. Fig.

**P**OUR trouver l'Aire du Secteur de Cercle CEDF, moindre que le Demi-cercle ADC, par son Diametre connu AC, qui soit par exemple de 125 pieds; & par son angle

angle connu CED, ou l'arc CFD, que nous supposons de <sup>Plan</sup> 80 degrez; l'Aire de tout le Cercle ABCD se trouvera par <sup>cho. 10.</sup> Probl. 8. de 12271 pieds quarez & d'environ 121 poudes <sup>154. Fig.</sup> quarez, & parce que l'Aire du Secteur CEDF est telle partie de celle de tout le Cercle ABCD, que son arc CFD de toute la circonference ABCD, c'est à dire que 80 de 360, on connoit aisément qu'on aura l'Aire de ce Secteur, en multipliant l'Aire du Cercle, qui est de 12271 pieds quarez, & 121 poudes quarez, par le nombre 80 des degrez de l'arc CFD, ou de l'angle CED, & en divisant le produit 981747 pieds quarez & 34 poudes quarez par le nombre 360 des degrez de la circonference du Cercle, car le quotient donnera 2727 pieds quarez, & environ 10 poudes quarez pour l'Aire du Secteur proposé CEDF.

## S C O L I E.

Pour éviter les fractions qui arrivent ordinairement à l'Aire du Cercle, multipliez le quarré 15625 du Diametre 125, toujours par 21816 —, & multipliez encor le produit 340882812 —

par le nombre 80 des degrez de l'angle du Secteur, pour avoir un second produit 27270625000, qu'il faudra toujours diviser par 10000000, & le quotient donnera 2727 pieds quarez, & 9 poudes quarez pour le contenu du Secteur CEDF.

Comme en multipliant la circonference ABCD, par le Rayon AE, ou EC, on a en la moitié du produit l'Aire du Cercle, par Theor. 13. De même en multipliant l'Arc CFD par le Rayon EC, ou ED, on aura en la moitié du produit l'Aire du Secteur CEDF. Ainsi vous voyez que pour connoître cette Aire indépendamment de celle du Cercle, il ne faut que sçavoir mesurer l'Arc CFD; & qui se fera en cette sorte.

Parce que l'arc CFD est telle partie de la circonference ABCD, que le nombre 80 des degrez qu'il contient, du nombre 360 des degrez que contient la circonference du Cercle; ayant trouvé par Probl. 6. la circonference du Cercle ABCD de 392 pieds, 8 poudes, il la faut multiplier par le nombre 80 des degrez de l'arc CFD, & diviser le produit 31413 pieds, 4 poudes, par le nombre 360 des degrez de la circonference du Cercle, le quotient donnera 87 pieds & environ 3 poudes pour la quantité de l'arc CFD.

Cer arc CFD se peut aussi trouver assez exactement, en ajoutant au double de la corde EC, ou ED, de la moitié de l'arc CFD, le tiers de l'excès de ce double sur la corde de l'arc entier CD. Le double de la corde CE se trou-

Plas-  
ché 18.  
194-195.

# 192. TRAITE' DE GEOMETRIE. III. PARTIE.

vera de 85 pieds, 6 poudces, d'où étant la corde CD, qui se  
trouvera de 80 pieds, 4 poudces, il restera 5 pieds, 2 poudces,  
dont le tiers 1 pied, 9 poudces étant ajouté au double de la  
corde CF, ou à 85 pieds, 6 poudces, on a 87 pieds, 3 poudces  
pour l'arc CED, comme auparavant.

Le double de la corde CF, ou FD, a été trouvé par cette  
Analogie,

Comme le Sinus Total	100000
Au double du Diametre AC	500
Ainsi le Sinus du quart de l'angle CED	34202
Au double de la corde CF	85.8.

& la corde CD a été trouvée par cette autre Analogie,

Comme le Sinus Total	100000
Au Diametre AC	125
Ainsi le Sinus de la moitié de l'angle CED	64278
A la corde CD	80.4.

On tire de ces deux Analogies le Canon suivant, pour  
trouver avec facilité & avec justesse l'arc CED. Ôtez le Si-  
nus 64278 de la moitié de l'angle du Secteur, de l'Ordre  
273616 du Sinus 34202 du quart du même angle, & multi-  
pliez le reste 209338 par le Diametre 125, pour avoir le pro-  
duit 26167250, dont le tiers 8722417 étant divisé par le Sinus  
Total 100000, le quotient donnera 87 pieds & environ 3 pou-  
ces pour la quantité de l'arc CED.

## PROBLEME XIII.

Mesurer un Secteur de Cercle, plus grand qu'un  
demi cercle.

194. Fig. POUR trouver l'Aire du Secteur de Cercle EDABCE, qui  
est plus grand que le Demi cercle ABC, dont le Diami-  
tre AC soit par exemple de 125 pieds, & l'arc DABC de 180  
degrez, ôtez ces 180 degrez de 360 d grez, & il restera 80  
degrez pour l'arc CED. Cherchez par Probl. 13. l'Aire du  
Secteur CEDF, qui se trouvera de 2727 pieds quarrtez, &  
9 poudces quarrtez, & ôtez la de l'Aire du Cercle entier, qui  
par Probl. 8. se trouvera de 12271 pieds quarrtez, & 122 pou-  
ces quarrtez, le reste donnera 9544 pieds quarrtez, & 112  
poudces quarrtez pour l'Aire du grand Secteur de Cercle  
EDABCE.

## PROBLEME XIV.

*Mesurer un Segment de Cercle, moindre qu'un Demi-cercle.*

**P**OUR trouver l'Aire du Segment de Cercle CDF, qui est <sup>Plan- che 18. 154. Fig.</sup> moindre que le Demi-cercle ACD, par son Diametre connu AC, qui soit par exemple de 123 pieds, & par son arc connu CFD, que nous supposerons de 80 degrez; l'Aire du Secteur CEDF se trouvera par Probl. 12. de 2727 pieds quarréz, & d'environ 9 pieds quarréz, de laquelle on ôtera l'Aire du Triangle isoscèle DEC, que l'on connoitra en cette sorte.

Ayant tiré de l'angle E sur la base CD, la perpendiculaire EG, qui divisera cette base CD, & l'angle du Segment CED, en deux également, cherchez la longueur de cette perpendiculaire EG, en faisant dans l'un des deux Triangles rectangles EGC, EGD, cette Analogie,

Comme le Sinus Total 100000

Au Demi-diametre EC, ou ED 62 —

Ainsi le Sinus du complement de la moitié de l'angle CED 79604

A la ligne EG 47. 10

qui se trouvera de 47 pieds, & d'environ 10 poudes, & qui étant multipliée par la ligne DG, ou CG, de 40 pieds, 2 poudes, moitié de la ligne CD, qui au Probl. 13. a été trouvée de 80 pieds, 4 poudes, on aura 1921 pieds quarréz & 44 poudes quarréz pour l'Aire du Triangle CED.

Ou bien tirez de l'un des deux angles C, D, comme de l'angle C, sur son côté opposé DE, la perpendiculaire CH, dont la longueur se connoitra en faisant dans le Triangle rectangle CHE, cette Analogie,

Comme le Sinus Total 100000

Au Demi-diametre EC 62 —

Ainsi le Sinus de l'angle CED 98480

A la perpendiculaire CH 61. 6.

qui se trouvera de 61 pieds & d'environ 6 poudes, & qui étant multipliée par la moitié 31 — du Rayon ED, ou par le quart du Diametre AC, que nous avons supposé de 123 pieds, on aura 1921 pieds quarréz & 26 poudes quarréz pour l'Aire du Triangle CED.

E 2

Comme



Plan-  
che 18.  
154. Fig.

Cette Aire trouvée par ces deux manieres, n'est pas trop exacte, parce que nous y avons negligé les fractions de poudes. C'est pourquoy pour l'avoir tres-exactement, suivez ce Canon, qui se tire de l'Analogie precedente; Multipliez la huitième partie, 12310 du Sinus 98480 de l'angle CED, par le quarré 15625 du Diametre 125, & divisez le produit 192343750 par le Sinus Total 100000, le quotient donnera 1923 pieds quarez & 63 poudes quarez pour l'Aire du Triangle CED, laquelle étant ôtée de celle du Secteur CED, qui a été trouvée de 2727 pieds quarez, & 9 poudes quarez, il restera 803 pieds quarez & 90 poudes quarez pour l'Aire du Segment proposé CDF.

## S C O L I E.

Si le Segment CDF étoit séparé de son Cercle, auquel cas on ne connoitroit pas le Diametre AC, ou FI, il faudroit mesurer sa base ou corde CD, & sa hauteur FG, qu'on appelle *Flèche*, par laquelle divisant le quarré de la demi-base CG, ou DG, on aura l'autre partie GF du Diametre FI, parce que l'angle ICF étant droit par 31. 3. la ligne CG, qui est perpendiculaire au Diametre FI, est moyenne proportionnelle entre les deux parties GI, GF, par 8. 6. outre que par 25. 3. le quarré CG est égal au Rectangle sous les deux parties GI, GF. Ainsi en ajoutant ensemble ces deux parties GI, GF, le Diametre FI sera connu, & par consequent le Demi-diametre EC, dont le quarré étant diminué du quarré CG, ou du Rectangle sous les parties GI, GF, le reste sera par 47. 1. le quarré EG, &c.

## P R O B L E M E X V.

*Mesurer un Segment de Cercle plus grand qu'un Demi-cercle.*

145. Fig. Pour trouver l'Aire du Segment de Cercle CDAB, qui est plus grand que le Demi-cercle ABC, dont le Diametre AC soit par exemple de 125 pieds, & l'arc DABC de 280 degrez, auquel cas l'arc CFD sera de 80 degrez; ôtez de l'Aire de tout le Cercle ABCD, qui par Probl. 8. se trouvera de 12271 pieds quarez & 121 poudes quarez, l'Aire du petit Segment CDF, qui par Probl. 14. se trouvera de 803 pieds quarez & 90 poudes quarez, & le reste donnera 11468 pieds quarez & 31 poudes quarez pour l'Aire du grand Segment CDAB, qu'on auroit aussi trouvé en ajoutant à l'Aire du grand Secteur CEDAB, qui par Probl. 13, se trouvera de

de 9544 piéds quarréz & 112 poudes quarréz, l'Aire du Triangle CED, qui par Probl. 14. se trouvera de 1923 piéds quarréz & 63 poudes quarréz.

Plan-  
che 18.  
154. Fig.

## PROBLEME XVI.

*Mesurer un espace terminé par une Cycloïde.*

**P**OUR trouver l'Aire de l'espace ABCD, terminé par la Cycloïde ABC, & par la droite AC, qui est égale à la circonférence du Cercle generateur, dont le Diametre est l'Axe BD, qui soit par exemple de 12 poudes, auquel cas la circonférence du Cercle generateur, ou la base AC se trouvera par Probl. 6. de 37 poudes, 8 lignes, & l'Aire du Cercle generateur se trouvera par Probl. 8. de 113 poudes quarréz & 14 lignes quarrées; triplez cette Aire trouvée, & vous aurez 339 poudes quarréz, & 42 lignes quarrées pour l'Aire de la Cycloïde ABCD; dont la démonstration est évidente par Theor. 19.

Ou bien multipliez le carré 144 de l'Axe 12 toujours par 2356194, & divisez le produit 339291936 toujours par 1000000, & le quotient donnera comme auparavant 339 piéds quarréz, & environ 42 lignes quarrées, pour l'Aire qu'on cherche.

## S C O L I E.

Parce que par Theor. 19. l'Aire ABCD de la Cycloïde est triple de celle du Cercle generateur BGD, on voit aisément que l'espace BGDCE est égal au Cercle generateur, & par conséquent de 113 poudes quarréz & 14 lignes quarrées, dont la moitié donnera 56 poudes quarréz & 79 lignes quarrées pour l'Aire du Segment BCE, parce que ce Segment BCE est égal à la moitié de l'espace BCE, ou de la moitié de l'espace BDAH, terminé par la courbe BHA décrite par le moyen des touchantes de la Cycloïde BEC, par Theor. 8. où nous avons démontré que le Segment BCE est la moitié de l'espace BDAH, qui est égal à l'espace BGDCE, chacun étant composé d'un nombre égal de lignes égales, comme il est aisé de conclure par la propriété de la touchante EF qui est parallèle à la corde correspondante BG, comme il a été démontré au Theor. 19. où nous avons démontré aussi, que la ligne GE, ou EF, ou IH, est égale à l'arc correspondant BOG.

## PROBLEME XVII.

*Mesurer une Couronne.*Plan-  
che 18.  
156. Fig.

IL est évident que pour trouver l'Aire de la Couronne terminée par les deux circonferences de Cercles concentriques ABCD, EFGH, dont les Diametres AC, EF, seront connus, comme AC de 18 toises, & EG de 12 toises, il n'y a qu'à ôter l'Aire du Cercle EFGH, qui par Probl. 2. se trouvera de 113 toises quarrées & d'environ 3 pieds quarréz, de celle du Cercle ABCD, qui se trouvera de 254 toises quarrées & d'environ 17 pieds quarréz, pour avoir au reste 141 toises quarrées, & 14 pieds quarréz pour l'Aire de la Couronne proposée.

Cette Aire se peut trouver en plusieurs autres manieres, mais la plus facile de toutes est celle-cy; Multipliez la somme 30 des deux Diametres 18, 12, par leur difference 6, & multipliez le produit 180 toujours par 785398, pour avoir un second produit 141371640, lequel étant divisé toujours par 1000000, on aura 141 toises quarrées, & environ 13 pieds quarréz pour l'Aire qu'on cherche.


La démonstration de cet abrégé sera évidente à celuy qui sentira que la Couronne AFC est égale au Cercle HIBD, dont le Rayon GB est perpendiculaire au Diametre AC, & par conséquent moyen proportionnel entre les lignes AG, GC, par 13. 6. car puisque le Quarré de cette moyenne proportionnelle est par 17. 6. égal au Rectangle des lignes AG, GC, qui font la somme & la difference des deux Rayons OC, OG; c'est à dire par 5. 2. à la difference des Quarréz des deux mêmes Rayons OC, OG; & que les Cercles sont entre eux comme les Quarréz de leurs Rayons, par 2. 12. il s'ensuit que le Cercle HIBD, dont le Rayon est GB, est égal à la difference des Cercles, dont les Rayons sont OC, OG, c'est à dire à la Couronne AFCH, &c.



## PROBLEME XVIII.

*Mesurer une Ellipse.*

127. Fig.

POUR trouver l'Aire de l'Ellipse ABCD, dont le grand Axe, ou la longueur AC soit par exemple de 20 toises, & le petit Axe, ou la largeur BD de 12 toises; multipliez ensemble ces deux Axes 20, 12, pour avoir le produit 240, qu'il faudra multiplier toujours par 785, & diviser le produit 188400 toujours par 1000, & le quotient donnera 188 toises quarrées, & environ 14 pieds quarréz pour l'Aire de l'Ellipse.





L'Ellipse proposée ABCD, dont la démonstration est évi-  
dente par Theor. 17.

Plan-  
che 28.  
157. Fig.

S O L U T I O N.

Pour avoir une Aire plus exacte, au lieu de la Raison de 1000 à 785, servez-vous de celle de 1000000 à 785398, c'est à dire multipliez le produit 240 des deux Axe. 20, 12, toujours par 785398, & divisez le produit 188495520 toujours par 1000000, le quotient donnera 188 toises quarrées & environ 18 pieds quarrés pour l'Aire qu'on cherche.

S'il falloit mesurer un Segment d'Ellipse, comme AEF, qui est terminé par la droite EF perpendiculaire au grand Axe AC, il faudroit mesurer la partie AG, & diviser le petit Axe BD au point H, de la même façon que le grand AC est divisé au point G, sçavoir en cherchant aux trois lignes AC, AG, BD, une quatrième proportionnelle BH: après quoy il faudroit tirer par le point H à l'Axe BD, la perpendiculaire HI, qui sera terminée en I, par le Demi-cercle BID décrit du centre O, autour du petit Axe BD. Cela étant fait, si par Probl. 14. on mesure le Segment de Cercle, dont BHI en représente la moitié, & par Probl. 8. le Cercle dont BOI en est la moitié, ce Segment sera telle partie de son Cercle, que le Segment AEF est de l'Ellipse ABCD, par Theor. 18. C'est pourquoy si à l'Aire du Cercle, à celle de son Segment, & à celle de l'Ellipse, on trouve une quatrième proportionnelle, on aura celle du Segment proposé AEF. On se servira d'un semblable raisonnement pour trouver l'Aire du Secteur d'Ellipse EOFA; mais au lieu de l'Aire du Cercle & de l'Ellipse, on peut mettre le petit Axe BD, & le grand AC, qui sont en même Raison, par Theor. 16.

P R O B L E M E X I X.

*Mesurer une Hyperbole.*

Pour trouver l'Aire de l'Hyperbole ABC, dont la base AC est perpendiculaire à l'Axe BD, & dont les deux Asymptotes sont EF, EG, qui se coupent au centre R de l'Hyperbole, par des angles égaux, de part & d'autre à l'égard de l'Axe BD; tirez du point C, la droite CP parallèle à l'Asymptote EG, & par le sommet B, à la même Asymptote EG, la parallèle BH, qui sera égale à la ligne EF. Divisez par pensée la partie FH en une infinité de parties égales aux points I, K, L, & menez par ces points les droites

Plan-  
che 29.  
158. Fig.

droites IM, KN, LO, parallèles entre elles & à la ligne BH, ou à la ligne CF.

Cette préparation étant faite, si l'on met  $a$  pour la ligne EH, ou BH,  $b$  pour la ligne HF, &  $x$  pour la partie HI, ou IK, ou KL, &c. auquel cas on aura HK  $\propto 2x$ , HL  $\propto 3x$ , & ainsi ensuite jusqu'à la plus grande HF, que nous avons appelée  $b$ , & par conséquent EI  $\propto a+x$ , EK  $\propto a+2x$ , EL  $\propto a+3x$ , &c. & parce que par la propriété des Asymptotes le Rectangle des lignes EH, BH, ou le carré  $aa$  est égal au Rectangle des lignes FI, IM, & aussi au Rectangle des lignes EK, KN, & pareillement au Rectangle des lignes EL, LO, on aura

$$\begin{array}{l}
 \text{IM} \propto \frac{aa}{a+x} \propto a - x + \frac{1xx}{4xx} - \frac{x^3}{8x^3} + \frac{x^4}{16x^4} - \frac{x^5}{32x^5} \&c. \\
 \text{KN} \propto \frac{aa}{a+2x} \propto a - 2x + \frac{a}{4xx} - \frac{aa}{8x^3} + \frac{a^3}{16x^4} - \frac{a^4}{32x^5} \&c. \\
 \text{LO} \propto \frac{aa}{a+3x} \propto a - 3x + \frac{aa}{9xx} - \frac{27x^3}{27x^3} + \frac{81x^4}{81x^4} - \frac{243x^5}{243x^5} \&c. \\
 \hline
 \text{BCEH} \propto \frac{ab}{2} - \frac{bb}{3a} + \frac{b^3}{4aa} - \frac{b^4}{5a^3} + \frac{b^5}{6a^4} \&c.
 \end{array}$$

où l'on voit que tous les infinis  $a$  valent  $ab$ , parce que la lettre  $b$ , ou la ligne HF représente le nombre de leur multitude: & par Theor. 10. que tous les infinis  $x$ ,  $2x$ ,  $3x$ , &c. dont le plus grand est GK, ou  $b$ , valent  $bb$ , & par Theor. 11. que tous les quarrés infinis  $xx$ ,  $4xx$ ,  $9xx$ , &c. dont le plus grand est  $bb$ , valent  $b^3$ : & enfin par Theor. 12. que tous les cubes infinis  $x^3$ ,  $8x^3$ ,  $27x^3$ , &c. dont le plus grand est  $b^3$ , valent  $b^4$ : & pareillement que tous les quarré-quarrez infinis  $x^4$ ,  $16x^4$ ,  $81x^4$ , &c. dont le plus grand est  $b^4$ , valent  $b^5$ , & ainsi ensuite; & que par conséquent la somme de toutes les parallèles infinies IM, KN, LO, &c. ou l'espace Hyperbolique BCEH vaut  $ab - \frac{bb}{3a} + \frac{b^3}{4aa} - \frac{b^4}{5a^3} + \frac{b^5}{6a^4} - \frac{b^6}{7a^5} + \frac{b^7}{8a^6} - \frac{b^8}{9a^7} + \frac{b^9}{10a^8} - \frac{b^{10}}{11a^9} + \frac{b^{11}}{12a^{10}} - \frac{b^{12}}{13a^{11}} + \frac{b^{13}}{14a^{12}} - \frac{b^{14}}{15a^{13}} + \frac{b^{15}}{16a^{14}} - \frac{b^{16}}{17a^{15}} + \frac{b^{17}}{18a^{16}} - \frac{b^{18}}{19a^{17}} + \frac{b^{19}}{20a^{18}} - \frac{b^{20}}{21a^{19}} + \frac{b^{21}}{22a^{20}} - \frac{b^{22}}{23a^{21}} + \frac{b^{23}}{24a^{22}} - \frac{b^{24}}{25a^{23}} + \frac{b^{25}}{26a^{24}} - \frac{b^{26}}{27a^{25}} + \frac{b^{27}}{28a^{26}} - \frac{b^{28}}{29a^{27}} + \frac{b^{29}}{30a^{28}} - \frac{b^{30}}{31a^{29}} + \frac{b^{31}}{32a^{30}} - \frac{b^{32}}{33a^{31}} + \frac{b^{33}}{34a^{32}} - \frac{b^{34}}{35a^{33}} + \frac{b^{35}}{36a^{34}} - \frac{b^{36}}{37a^{35}} + \frac{b^{37}}{38a^{36}} - \frac{b^{38}}{39a^{37}} + \frac{b^{39}}{40a^{38}} - \frac{b^{40}}{41a^{39}} + \frac{b^{41}}{42a^{40}} - \frac{b^{42}}{43a^{41}} + \frac{b^{43}}{44a^{42}} - \frac{b^{44}}{45a^{43}} + \frac{b^{45}}{46a^{44}} - \frac{b^{46}}{47a^{45}} + \frac{b^{47}}{48a^{46}} - \frac{b^{48}}{49a^{47}} + \frac{b^{49}}{50a^{48}} - \frac{b^{50}}{51a^{49}} + \frac{b^{51}}{52a^{50}} - \frac{b^{52}}{53a^{51}} + \frac{b^{53}}{54a^{52}} - \frac{b^{54}}{55a^{53}} + \frac{b^{55}}{56a^{54}} - \frac{b^{56}}{57a^{55}} + \frac{b^{57}}{58a^{56}} - \frac{b^{58}}{59a^{57}} + \frac{b^{59}}{60a^{58}} - \frac{b^{60}}{61a^{59}} + \frac{b^{61}}{62a^{60}} - \frac{b^{62}}{63a^{61}} + \frac{b^{63}}{64a^{62}} - \frac{b^{64}}{65a^{63}} + \frac{b^{65}}{66a^{64}} - \frac{b^{66}}{67a^{65}} + \frac{b^{67}}{68a^{66}} - \frac{b^{68}}{69a^{67}} + \frac{b^{69}}{70a^{68}} - \frac{b^{70}}{71a^{69}} + \frac{b^{71}}{72a^{70}} - \frac{b^{72}}{73a^{71}} + \frac{b^{73}}{74a^{72}} - \frac{b^{74}}{75a^{73}} + \frac{b^{75}}{76a^{74}} - \frac{b^{76}}{77a^{75}} + \frac{b^{77}}{78a^{76}} - \frac{b^{78}}{79a^{77}} + \frac{b^{79}}{80a^{78}} - \frac{b^{80}}{81a^{79}} + \frac{b^{81}}{82a^{80}} - \frac{b^{82}}{83a^{81}} + \frac{b^{83}}{84a^{82}} - \frac{b^{84}}{85a^{83}} + \frac{b^{85}}{86a^{84}} - \frac{b^{86}}{87a^{85}} + \frac{b^{87}}{88a^{86}} - \frac{b^{88}}{89a^{87}} + \frac{b^{89}}{90a^{88}} - \frac{b^{90}}{91a^{89}} + \frac{b^{91}}{92a^{90}} - \frac{b^{92}}{93a^{91}} + \frac{b^{93}}{94a^{92}} - \frac{b^{94}}{95a^{93}} + \frac{b^{95}}{96a^{94}} - \frac{b^{96}}{97a^{95}} + \frac{b^{97}}{98a^{96}} - \frac{b^{98}}{99a^{97}} + \frac{b^{99}}{100a^{98}} - \frac{b^{100}}{101a^{99}} + \frac{b^{101}}{102a^{100}} - \frac{b^{102}}{103a^{101}} + \frac{b^{103}}{104a^{102}} - \frac{b^{104}}{105a^{103}} + \frac{b^{105}}{106a^{104}} - \frac{b^{106}}{107a^{105}} + \frac{b^{107}}{108a^{106}} - \frac{b^{108}}{109a^{107}} + \frac{b^{109}}{110a^{108}} - \frac{b^{110}}{111a^{109}} + \frac{b^{111}}{112a^{110}} - \frac{b^{112}}{113a^{111}} + \frac{b^{113}}{114a^{112}} - \frac{b^{114}}{115a^{113}} + \frac{b^{115}}{116a^{114}} - \frac{b^{116}}{117a^{115}} + \frac{b^{117}}{118a^{116}} - \frac{b^{118}}{119a^{117}} + \frac{b^{119}}{120a^{118}} - \frac{b^{120}}{121a^{119}} + \frac{b^{121}}{122a^{120}} - \frac{b^{122}}{123a^{121}} + \frac{b^{123}}{124a^{122}} - \frac{b^{124}}{125a^{123}} + \frac{b^{125}}{126a^{124}} - \frac{b^{126}}{127a^{125}} + \frac{b^{127}}{128a^{126}} - \frac{b^{128}}{129a^{127}} + \frac{b^{129}}{130a^{128}} - \frac{b^{130}}{131a^{129}} + \frac{b^{131}}{132a^{130}} - \frac{b^{132}}{133a^{131}} + \frac{b^{133}}{134a^{132}} - \frac{b^{134}}{135a^{133}} + \frac{b^{135}}{136a^{134}} - \frac{b^{136}}{137a^{135}} + \frac{b^{137}}{138a^{136}} - \frac{b^{138}}{139a^{137}} + \frac{b^{139}}{140a^{138}} - \frac{b^{140}}{141a^{139}} + \frac{b^{141}}{142a^{140}} - \frac{b^{142}}{143a^{141}} + \frac{b^{143}}{144a^{142}} - \frac{b^{144}}{145a^{143}} + \frac{b^{145}}{146a^{144}} - \frac{b^{146}}{147a^{145}} + \frac{b^{147}}{148a^{146}} - \frac{b^{148}}{149a^{147}} + \frac{b^{149}}{150a^{148}} - \frac{b^{150}}{151a^{149}} + \frac{b^{151}}{152a^{150}} - \frac{b^{152}}{153a^{151}} + \frac{b^{153}}{154a^{152}} - \frac{b^{154}}{155a^{153}} + \frac{b^{155}}{156a^{154}} - \frac{b^{156}}{157a^{155}} + \frac{b^{157}}{158a^{156}} - \frac{b^{158}}{159a^{157}} + \frac{b^{159}}{160a^{158}} - \frac{b^{160}}{161a^{159}} + \frac{b^{161}}{162a^{160}} - \frac{b^{162}}{163a^{161}} + \frac{b^{163}}{164a^{162}} - \frac{b^{164}}{165a^{163}} + \frac{b^{165}}{166a^{164}} - \frac{b^{166}}{167a^{165}} + \frac{b^{167}}{168a^{166}} - \frac{b^{168}}{169a^{167}} + \frac{b^{169}}{170a^{168}} - \frac{b^{170}}{171a^{169}} + \frac{b^{171}}{172a^{170}} - \frac{b^{172}}{173a^{171}} + \frac{b^{173}}{174a^{172}} - \frac{b^{174}}{175a^{173}} + \frac{b^{175}}{176a^{174}} - \frac{b^{176}}{177a^{175}} + \frac{b^{177}}{178a^{176}} - \frac{b^{178}}{179a^{177}} + \frac{b^{179}}{180a^{178}} - \frac{b^{180}}{181a^{179}} + \frac{b^{181}}{182a^{180}} - \frac{b^{182}}{183a^{181}} + \frac{b^{183}}{184a^{182}} - \frac{b^{184}}{185a^{183}} + \frac{b^{185}}{186a^{184}} - \frac{b^{186}}{187a^{185}} + \frac{b^{187}}{188a^{186}} - \frac{b^{188}}{189a^{187}} + \frac{b^{189}}{190a^{188}} - \frac{b^{190}}{191a^{189}} + \frac{b^{191}}{192a^{190}} - \frac{b^{192}}{193a^{191}} + \frac{b^{193}}{194a^{192}} - \frac{b^{194}}{195a^{193}} + \frac{b^{195}}{196a^{194}} - \frac{b^{196}}{197a^{195}} + \frac{b^{197}}{198a^{196}} - \frac{b^{198}}{199a^{197}} + \frac{b^{199}}{200a^{198}} - \frac{b^{200}}{201a^{199}} + \frac{b^{201}}{202a^{200}} - \frac{b^{202}}{203a^{201}} + \frac{b^{203}}{204a^{202}} - \frac{b^{204}}{205a^{203}} + \frac{b^{205}}{206a^{204}} - \frac{b^{206}}{207a^{205}} + \frac{b^{207}}{208a^{206}} - \frac{b^{208}}{209a^{207}} + \frac{b^{209}}{210a^{208}} - \frac{b^{210}}{211a^{209}} + \frac{b^{211}}{212a^{210}} - \frac{b^{212}}{213a^{211}} + \frac{b^{213}}{214a^{212}} - \frac{b^{214}}{215a^{213}} + \frac{b^{215}}{216a^{214}} - \frac{b^{216}}{217a^{215}} + \frac{b^{217}}{218a^{216}} - \frac{b^{218}}{219a^{217}} + \frac{b^{219}}{220a^{218}} - \frac{b^{220}}{221a^{219}} + \frac{b^{221}}{222a^{220}} - \frac{b^{222}}{223a^{221}} + \frac{b^{223}}{224a^{222}} - \frac{b^{224}}{225a^{223}} + \frac{b^{225}}{226a^{224}} - \frac{b^{226}}{227a^{225}} + \frac{b^{227}}{228a^{226}} - \frac{b^{228}}{229a^{227}} + \frac{b^{229}}{230a^{228}} - \frac{b^{230}}{231a^{229}} + \frac{b^{231}}{232a^{230}} - \frac{b^{232}}{233a^{231}} + \frac{b^{233}}{234a^{232}} - \frac{b^{234}}{235a^{233}} + \frac{b^{235}}{236a^{234}} - \frac{b^{236}}{237a^{235}} + \frac{b^{237}}{238a^{236}} - \frac{b^{238}}{239a^{237}} + \frac{b^{239}}{240a^{238}} - \frac{b^{240}}{241a^{239}} + \frac{b^{241}}{242a^{240}} - \frac{b^{242}}{243a^{241}} + \frac{b^{243}}{244a^{242}} - \frac{b^{244}}{245a^{243}} + \frac{b^{245}}{246a^{244}} - \frac{b^{246}}{247a^{245}} + \frac{b^{247}}{248a^{246}} - \frac{b^{248}}{249a^{247}} + \frac{b^{249}}{250a^{248}} - \frac{b^{250}}{251a^{249}} + \frac{b^{251}}{252a^{250}} - \frac{b^{252}}{253a^{251}} + \frac{b^{253}}{254a^{252}} - \frac{b^{254}}{255a^{253}} + \frac{b^{255}}{256a^{254}} - \frac{b^{256}}{257a^{255}} + \frac{b^{257}}{258a^{256}} - \frac{b^{258}}{259a^{257}} + \frac{b^{259}}{260a^{258}} - \frac{b^{260}}{261a^{259}} + \frac{b^{261}}{262a^{260}} - \frac{b^{262}}{263a^{261}} + \frac{b^{263}}{264a^{262}} - \frac{b^{264}}{265a^{263}} + \frac{b^{265}}{266a^{264}} - \frac{b^{266}}{267a^{265}} + \frac{b^{267}}{268a^{266}} - \frac{b^{268}}{269a^{267}} + \frac{b^{269}}{270a^{268}} - \frac{b^{270}}{271a^{269}} + \frac{b^{271}}{272a^{270}} - \frac{b^{272}}{273a^{271}} + \frac{b^{273}}{274a^{272}} - \frac{b^{274}}{275a^{273}} + \frac{b^{275}}{276a^{274}} - \frac{b^{276}}{277a^{275}} + \frac{b^{277}}{278a^{276}} - \frac{b^{278}}{279a^{277}} + \frac{b^{279}}{280a^{278}} - \frac{b^{280}}{281a^{279}} + \frac{b^{281}}{282a^{280}} - \frac{b^{282}}{283a^{281}} + \frac{b^{283}}{284a^{282}} - \frac{b^{284}}{285a^{283}} + \frac{b^{285}}{286a^{284}} - \frac{b^{286}}{287a^{285}} + \frac{b^{287}}{288a^{286}} - \frac{b^{288}}{289a^{287}} + \frac{b^{289}}{290a^{288}} - \frac{b^{290}}{291a^{289}} + \frac{b^{291}}{292a^{290}} - \frac{b^{292}}{293a^{291}} + \frac{b^{293}}{294a^{292}} - \frac{b^{294}}{295a^{293}} + \frac{b^{295}}{296a^{294}} - \frac{b^{296}}{297a^{295}} + \frac{b^{297}}{298a^{296}} - \frac{b^{298}}{299a^{297}} + \frac{b^{299}}{300a^{298}} - \frac{b^{300}}{301a^{299}} + \frac{b^{301}}{302a^{300}} - \frac{b^{302}}{303a^{301}} + \frac{b^{303}}{304a^{302}} - \frac{b^{304}}{305a^{303}} + \frac{b^{305}}{306a^{304}} - \frac{b^{306}}{307a^{305}} + \frac{b^{307}}{308a^{306}} - \frac{b^{308}}{309a^{307}} + \frac{b^{309}}{310a^{308}} - \frac{b^{310}}{311a^{309}} + \frac{b^{311}}{312a^{310}} - \frac{b^{312}}{313a^{311}} + \frac{b^{313}}{314a^{312}} - \frac{b^{314}}{315a^{313}} + \frac{b^{315}}{316a^{314}} - \frac{b^{316}}{317a^{315}} + \frac{b^{317}}{318a^{316}} - \frac{b^{318}}{319a^{317}} + \frac{b^{319}}{320a^{318}} - \frac{b^{320}}{321a^{319}} + \frac{b^{321}}{322a^{320}} - \frac{b^{322}}{323a^{321}} + \frac{b^{323}}{324a^{322}} - \frac{b^{324}}{325a^{323}} + \frac{b^{325}}{326a^{324}} - \frac{b^{326}}{327a^{325}} + \frac{b^{327}}{328a^{326}} - \frac{b^{328}}{329a^{327}} + \frac{b^{329}}{330a^{328}} - \frac{b^{330}}{331a^{329}} + \frac{b^{331}}{332a^{330}} - \frac{b^{332}}{333a^{331}} + \frac{b^{333}}{334a^{332}} - \frac{b^{334}}{335a^{333}} + \frac{b^{335}}{336a^{334}} - \frac{b^{336}}{337a^{335}} + \frac{b^{337}}{338a^{336}} - \frac{b^{338}}{339a^{337}} + \frac{b^{339}}{340a^{338}} - \frac{b^{340}}{341a^{339}} + \frac{b^{341}}{342a^{340}} - \frac{b^{342}}{343a^{341}} + \frac{b^{343}}{344a^{342}} - \frac{b^{344}}{345a^{343}} + \frac{b^{345}}{346a^{344}} - \frac{b^{346}}{347a^{345}} + \frac{b^{347}}{348a^{346}} - \frac{b^{348}}{349a^{347}} + \frac{b^{349}}{350a^{348}} - \frac{b^{350}}{351a^{349}} + \frac{b^{351}}{352a^{350}} - \frac{b^{352}}{353a^{351}} + \frac{b^{353}}{354a^{352}} - \frac{b^{354}}{355a^{353}} + \frac{b^{355}}{356a^{354}} - \frac{b^{356}}{357a^{355}} + \frac{b^{357}}{358a^{356}} - \frac{b^{358}}{359a^{357}} + \frac{b^{359}}{360a^{358}} - \frac{b^{360}}{361a^{359}} + \frac{b^{361}}{362a^{360}} - \frac{b^{362}}{363a^{361}} + \frac{b^{363}}{364a^{362}} - \frac{b^{364}}{365a^{363}} + \frac{b^{365}}{366a^{364}} - \frac{b^{366}}{367a^{365}} + \frac{b^{367}}{368a^{366}} - \frac{b^{368}}{369a^{367}} + \frac{b^{369}}{370a^{368}} - \frac{b^{370}}{371a^{369}} + \frac{b^{371}}{372a^{370}} - \frac{b^{372}}{373a^{371}} + \frac{b^{373}}{374a^{372}} - \frac{b^{374}}{375a^{373}} + \frac{b^{375}}{376a^{374}} - \frac{b^{376}}{377a^{375}} + \frac{b^{377}}{378a^{376}} - \frac{b^{378}}{379a^{377}} + \frac{b^{379}}{380a^{378}} - \frac{b^{380}}{381a^{379}} + \frac{b^{381}}{382a^{380}} - \frac{b^{382}}{383a^{381}} + \frac{b^{383}}{384a^{382}} - \frac{b^{384}}{385a^{383}} + \frac{b^{385}}{386a^{384}} - \frac{b^{386}}{387a^{385}} + \frac{b^{387}}{388a^{386}} - \frac{b^{388}}{389a^{387}} + \frac{b^{389}}{390a^{388}} - \frac{b^{390}}{391a^{389}} + \frac{b^{391}}{392a^{390}} - \frac{b^{392}}{393a^{391}} + \frac{b^{393}}{394a^{392}} - \frac{b^{394}}{395a^{393}} + \frac{b^{395}}{396a^{394}} - \frac{b^{396}}{397a^{395}} + \frac{b^{397}}{398a^{396}} - \frac{b^{398}}{399a^{397}} + \frac{b^{399}}{400a^{398}} - \frac{b^{400}}{401a^{399}} + \frac{b^{401}}{402a^{400}} - \frac{b^{402}}{403a^{401}} + \frac{b^{403}}{404a^{402}} - \frac{b^{404}}{405a^{403}} + \frac{b^{405}}{406a^{404}} - \frac{b^{406}}{407a^{405}} + \frac{b^{407}}{408a^{406}} - \frac{b^{408}}{409a^{407}} + \frac{b^{409}}{410a^{408}} - \frac{b^{410}}{411a^{409}} + \frac{b^{411}}{412a^{410}} - \frac{b^{412}}{413a^{411}} + \frac{b^{413}}{414a^{412}} - \frac{b^{414}}{415a^{413}} + \frac{b^{415}}{416a^{414}} - \frac{b^{416}}{417a^{415}} + \frac{b^{417}}{418a^{416}} - \frac{b^{418}}{419a^{417}} + \frac{b^{419}}{420a^{418}} - \frac{b^{420}}{421a^{419}} + \frac{b^{421}}{422a^{420}} - \frac{b^{422}}{423a^{421}} + \frac{b^{423}}{424a^{422}} - \frac{b^{424}}{425a^{423}} + \frac{b^{425}}{426a^{424}} - \frac{b^{426}}{427a^{425}} + \frac{b^{427}}{428a^{426}} - \frac{b^{428}}{429a^{427}} + \frac{b^{429}}{430a^{428}} - \frac{b^{430}}{431a^{429}} + \frac{b^{431}}{432a^{430}} - \frac{b^{432}}{433a^{431}} + \frac{b^{433}}{434a^{432}} - \frac{b^{434}}{435a^{433}} + \frac{b^{435}}{436a^{434}} - \frac{b^{436}}{437a^{435}} + \frac{b^{437}}{438a^{436}} - \frac{b^{438}}{439a^{437}} + \frac{b^{439}}{440a^{438}} - \frac{b^{440}}{441a^{439}} + \frac{b^{441}}{442a^{440}} - \frac{b^{442}}{443a^{441}} + \frac{b^{443}}{444a^{442}} - \frac{b^{444}}{445a^{443}} + \frac{b^{445}}{446a^{444}} - \frac{b^{446}}{447a^{445}} + \frac{b^{447}}{448a^{446}} - \frac{b^{448}}{449a^{447}} + \frac{b^{449}}{450a^{448}} - \frac{b^{450}}{451a^{449}} + \frac{b^{451}}{452a^{450}} - \frac{b^{452}}{453a^{451}} + \frac{b^{453}}{454a^{452}} - \frac{b^{454}}{455a^{453}} + \frac{b^{455}}{456a^{454}} - \frac{b^{456}}{457a^{455}} + \frac{b^{457}}{458a^{456}} - \frac{b^{458}}{459a^{457}} + \frac{b^{459}}{460a^{458}} - \frac{b^{460}}{461a^{459}} + \frac{b^{461}}{462a^{460}} - \frac{b^{462}}{463a^{461}} + \frac{b^{463}}{464a^{462}} - \frac{b^{464}}{465a^{463}} + \frac{b^{465}}{466a^{464}} - \frac{b^{466}}{467a^{465}} + \frac{b^{467}}{468a^{466}} - \frac{b^{468}}{469a^{467}} + \frac{b^{469}}{470a^{468}} - \frac{b^{470}}{471a^{469}} + \frac{b^{471}}{472a^{470}} - \frac{b^{472}}{473a^{471}} + \frac{b^{473}}{474a^{472}} - \frac{b^{474}}{475a^{473}} + \frac{b^{475}}{476a^{474}} - \frac{b^{476}}{477a^{475}} + \frac{b^{477}}{478a^{476}} - \frac{b^{478}}{479a^{477}} + \frac{b^{479}}{480a^{478}} - \frac{b^{480}}{481a^{479}} + \frac{b^{481}}{482a^{480}} - \frac{b^{482}}{483a^{481}} + \frac{b^{483}}{484a^{482}} - \frac{b^{484}}{485a^{483}} + \frac{b^{485}}{486a^{484}} - \frac{b^{486}}{487a^{485}} + \frac{b^{487}}{488a^{486}} - \frac{b^{488}}{489a^{487}} + \frac{b^{489}}{490a^{488}} - \frac{b^{490}}{491a^{489}} + \frac{b^{491}}{492a^{490}} - \frac{b^{492}}{493a^{491}} + \frac{b^{493}}{494a^{492}} - \frac{b^{494}}{495a^{493}} + \frac{b^{495}}{496a^{494}} - \frac{b^{496}}{497a^{495}} + \frac{b^{497}}{498a^{496}} - \frac{b^{498}}{499a^{497}} + \frac{b^{499}}{500a^{498}} - \frac{b^{500}}{501a^{499}} + \frac{b^{501}}{502a^{500}} - \frac{b^{502}}{503a^{501}} + \frac{b^{503}}{504a^{502}} - \frac{b^{504}}{505a^{503}} + \frac{b^{505}}{506a^{504}} - \frac{b^{506}}{507a^{505}} + \frac{b^{507}}{508a^{506}} - \frac{b^{508}}{509a^{507}} + \frac{b^{509}}{510a^{508}} - \frac{b^{510}}{511a^{509}} + \frac{b^{511}}{512a^{510}} - \frac{b^{512}}{513a^{511}} + \frac{b^{513}}{514a^{512}} - \frac{b^{514}}{515a^{513}} + \frac{b^{515}}{516a^{514}} - \frac{b^{516}}{517a^{515}} + \frac{b^{517}}{518a^{516}} - \frac{b^{518}}{519a^{517}} + \frac{b^{519}}{520a^{518}} - \frac{b^{520}}{521a^{519}} + \frac{b^{521}}{522a^{520}} - \frac{b^{522}}{523a^{521}} + \frac{b^{523}}{524a^{522}} - \frac{b^{524}}{525a^{523}} + \frac{b^{525}}{526a^{524}} - \frac{b^{526}}{527a^{525}} + \frac{b^{527}}{528a^{526}} - \frac{b^{528}}{529a^{527}} + \frac{b^{529}}{530a^{528}} - \frac{b^{530}}{531a^{529}} + \frac{b^{531}}{532a^{530}} - \frac{b^{532}}{533a^{531}} + \frac{b^{533}}{534a^{532}} - \frac{b^{534}}{535a^{533}} + \frac{b^{535}}{536a^{534}} - \frac{b^{536}}{537a^{535}} + \frac{b^{537}}{538a^{536}} - \frac{b^{538}}{539a^{537}} + \frac{b^{539}}{540a^{538}} - \frac{b^{540}}{541a^{539}} + \frac{b^{541}}{542a^{540}} - \frac{b^{542}}{543a^{541}} + \frac{b^{543}}{544a^{542}} - \frac{b^{544}}{545a^{543}} + \frac{b^{545}}{546a^{544}} - \frac{b^{546}}{547a^{545}} + \frac{b^{547}}{548a^{546}} - \frac{b^{548}}{549a^{547}} + \frac{b^{549}}{550a^{548}} - \frac{b^{550}}{551a^{549}} + \frac{b^{551}}{552a^{550}} - \frac{b^{552}}{553a^{551}} + \frac{b^{553}}{554a^{552}} - \frac{b^{554}}{555a^{553}} + \frac{b^{555}}{556a^{554}} - \frac{b^{556}}{557a^{555}} + \frac{b^{557}}{558a^{556}} - \frac{b^{558}}{559a^{557}} + \frac{b^{559}}{560a^{558}} - \frac{b^{560}}{561a^{559}} + \frac{b^{561}}{562a^{560}} - \frac{b^{562}}{563a^{561}} + \frac{b^{563}}{564a^{562}} - \frac{b^{564}}{565a^{563}} + \frac{b^{565}}{566a^{564}} - \frac{b^{566}}{567a^{565}} + \frac{b^{567}}{568a^{566}} - \frac{b^{568}}{569a^{567}} + \frac{b^{569}}{570a^{568}} - \frac{b^{570}}{571a^{569}} + \frac{b^{571}}{572a^{570}} - \frac{b^{572}}{573a^{571}} + \frac{b^{573}}{574a^{572}} - \frac{b^{574}}{575a^{573}} + \frac{b^{575}}{576a^{574}} - \frac{b^{576}}{577a^{575}} + \frac{b^{577}}{578a^{576}} - \frac{b^{578}}{579a^{577}} + \frac{b^{579}}{580a^{578}} - \frac$

Si  $a$  vaut 1, & que  $b$  vaille  $\frac{1}{10}$  — on connoitra que l'espace Plan- che 19. 153. Fig.

$$BCFH \text{ vaut } \frac{1}{10} - \frac{1}{100} + \frac{1}{3000} - \frac{1}{48000} + \frac{1}{500000} - \frac{1}{6000000}$$

&c. ou  $\frac{571861}{6000000}$ . Il y a plusieurs belles remarques à faire là-dessus, mais ce n'est pas icy le lieu d'en dire davantage. Je diray seulement que l'espace BCFH étant connu, le reste est facile à connoître.

## PROBLEME XX.

*Mesurer une Parabole quarrée.*

Pour trouver l'Aire de la Parabole quarrée ABC, dont l'Axe BD, qui divise à angles droits & en deux également la base AC, soit par exemple de 124 pieds, & la base AC de 135 pieds: multipliez ensemble les valeurs 124, 135, de ces deux lignes BD, AC, pour avoir leur produit 16740, dont le double 33480 étant divisé par 3, on aura 11160 pieds quarrés pour l'Aire de la Parabole proposée ABC, dont la démonstration est évidente *par Theor. 9.* qui fournit aussi la Methode de mesurer les Paraboles plus élevées, sans qu'il soit besoin d'en parler davantage. 159. Fig.

## S C O L I E.

Si l'on vouloit connoître l'Aire du Segment Parabolique ECF, il faudroit outre la Parabole ABC, mesurer encore la Parabole GBE, terminée par la ligne GE perpendiculaire à l'Axe BD, & le Trapezoïde DHEC: car si de la Demi-parabole DBC, on ôte la Demi-parabole HBE, & le Trapezoïde DHEC, il restera l'Aire du Segment Parabolique ECF.

Si l'on vouloit connoître la longueur de la circonférence de la Parabole ABC, cela se pourroit faire par le moyen de la Quadrature de l'Hyperbole, en cette sorte.

Pour trouver la quantité de la circonférence de la Demi-parabole ABC, dont l'Axe est AD, & la base est CD perpendiculaire à l'Axe AD; tirez par le point C, la ligne CE parallèle à l'Axe AD, & par le sommet A, la droite AH perpendiculaire au même Axe AD. Prenez sur cet Axe AD prolongé de part & d'autre, les lignes AF, DG, égales chacune à la moitié du Paramètre, qui est une ligne troisième proportionnelle aux deux AD, CD, & faites HE égale à CG, ou à HF. Pareillement tirez du point B pris à discrétion sur la ligne Parabolique ABC, 160. Fig.



Man-  
che 19.  
160. f. 17.

ABC, la droite BN parallèle à l'Axe AD, & après avoir fait BK perpendiculaire à l'Axe AD, & KL égale à DG, on a AF, c'est à dire à la moitié du Paramètre, faites PN égale à BL ou à PF. Enfin décrivez par les points F, N, E, & par une infinité d'autres que l'on peut trouver de la même façon, la courbe FNE, qui sera la circonférence d'une Hyperbole, comme nous le démontrerons en après.

Cette préparation étant faite, imaginons que la partie, CI, de la ligne Parabolique ABC, est infiniment petite, & par conséquent une ligne droite, & que par le point I infiniment proche du point C, il passe la ligne IM parallèle à la base CD, & la ligne SO parallèle à la ligne CE, ou à l'Axe AD; & alors on connoitra par 4. 6. dans les Triangles équiangles CIS, CDG, que les quatre lignes CI, CS, CG, DG, sont proportionnelles, & par 16. 6. que le Rectangle des deux extrêmes CI, DG, est égal au Rectangle des deux moyennes CS, CG, ou des deux HR, HE, c'est à dire à la figure RHEO, qui peut passer pour un Rectangle, parce que la ligne RH est supposée infiniment petite. D'où il est aisé de conclure par la méthode des Indivisibles, que l'espace Hyperbolique AHEF est égal au Rectangle sous la ligne droite CG, & la courbe ABC. Si donc, par Probl. 19. on mesure l'Aire de l'espace Hyperbolique AHEF, & qu'on la divise par la droite CG, on aura la longueur de la ligne Parabolique ABC.

Pour démontrer que la courbe FNE est une ligne Hyperbolique, tirez du point E, pris à discretion sur cette Courbe, la droite ET perpendiculaire à l'Axe AD prolongé, & alors si l'on met  $x$  pour AF,  $x$  pour AT; ou pour HE, ou pour HF, &  $y$  pour ET, ou pour AH, on trouvera dans le Triangle rectangle AHF, cette Equation,  $ax + yy = xx$ , ou  $xx - ax = yy$ , qui est un Lieu à une Hyperbole équilatère, dont le centre est A, &c.

Il faut aussi démontrer, que les deux Triangles rectangles CIS, CDG, sont équiangles, parce que cela n'est pas évident de soy-même. Pour cette fin, prenez sur l'Axe AD prolongé, la ligne AV égale à la partie AD, & menez la droite VC, qui touchera au point C, la ligne Parabolique ABC, par Theor. 4. Parce que par la nature de la Parabole le Quarré CD est égal au Rectangle sous AD, & le Paramètre, c'est à dire le double de DG, ou au Rectangle sous la simple DG, & le double de AD, c'est à dire la ligne DV, on connoît par 17. 6, que les trois lignes DV, DG, CG, sont proportionnelles, & par 6. 6. que les deux Triangles rectangles CDV, CDG, sont équiangles. D'où il est aisé de conclure, que le Triangle GCV est rectangle en C, & par 8. 6, que le Triangle CDG, aussi bien que le Triangle

CIS luy est semblable, & qu'ainsi ces deux Triangles CDE, CIS, sont équiangles. Ce qu'il falloit démontrer.

Plan.  
che 19.  
160. Fig.

## PROBLEME XXI.

*Mesurer la Surface convexe d'un Cylindre droit.*

**P**OUR trouver l'Aire de la Surface convexe du Cylindre droit ABCD, dont la hauteur AD, ou BC, soit par exemple de 24 pieds, & la circonference AEBF de sa base de 132 pieds; on multipliera ensemble ces deux lignes 24, 132, & leur produit donnera 3168 pieds quarréz pour la Surface convexe du Cylindre proposé ABCD, dont la démonstration est évidente par Theor. 20. Fig. 161.

### SCOLIA.

Si au lieu de connoître la circonference de la base AEBF, l'on connoît son Diametre AB, ou CD, ce qui semble plus facile, on trouvera la circonference AEBF, par Probl. 6. pour trouver ensuite la Surface du Cylindre, comme il vient d'être enseigné. Mais pour éviter les fractions qui peuvent arriver à la circonference, multipliez le Diametre AB par la hauteur AD, pour avoir leur produit, qu'il faudra multiplier toujours par 314, & diviser le second produit toujours par 100, le Quotient donnera la Surface qu'on cherche, par Theor. 21. comme si le Diametre AB est de 12 poudes, & la hauteur AB de 9 poudes, le produit de ces deux lignes 12, 9, sera 108, qui étant multiplié par 314, & le produit 33912 étant divisé par 100, on aura 339 poudes quarréz, & environ 17 lignes quarrées pour la Surface convexe du Cylindre proposée ABCD.

## PROBLEME XXII.

*Mesurer la Surface convexe d'un Cone droit.*

**P**OUR trouver l'Aire de la Surface convexe du Cone droit ABC, dont le côté AC, ou BC, soit par exemple de 42 pieds, & la circonference de sa base ADBE de 112 pieds; on multipliera ensemble ces deux lignes 42, 112, & la moitié de leur produit 4704, donnera 2352 pieds quarréz pour la Surface convexe du Cone proposé ABC, par Theor. 22. 162. Fig.

S c o

## S C O L I E.

Si au lieu de connoître la circonférence de la base  $ADBE$ , l'on connoît son Diamètre  $AB$ , on trouvera la circonférence  $ADBE$ , par *Probl. 6.* pour trouver ensuite la Surface du Cone, comme il vient d'être enseigné. Mais pour éviter les fractions qui peuvent arriver à la circonférence, Multipliez le Diamètre  $AB$  par le côté  $AC$ , pour avoir leur produit, qu'il faudra multiplier toujours par 157, & diviser ce second produit toujours par 100, le Quotient donnera la Surface qu'on cherche, par *Theor. 23.* Comme si le Diamètre  $AB$  est de 36 pieds, & le côté  $AC$  de 32, le produit de ces deux lignes 36, 32, sera 1152, qui étant multiplié par 157, & le produit 180864 étant divisé par 100, le Quotient donnera 1808 pieds quarrés, & environ 92 pouces quarrés pour la Surface convexe du Cone proposé  $ABC$ .

## P R O B L E M E XXIII.

*Mesurer la Surface d'un Cone droit tronqué.*

165. Fig. **P**our trouver l'Aire de la Surface convexe du Cone droit tronqué  $ABCD$ , dont le côté  $AD$ , ou  $BC$ , soit par exemple de 12 pieds, la circonférence de sa plus grande base  $AEBF$  de 108 pieds, & la circonférence de sa plus petite base  $DGCH$  de 72 pieds; ajoutez ensemble ces deux circonférences 108, 72, & multipliez leur somme 180 par le côté 12, & la moitié du produit 2160, donnera 1080 pieds quarrés pour la Surface convexe de la figure proposée  $ABCD$ , par *Theor. 24.*

## S C O L I E.

Si au lieu de connoître les circonférences  $AEBF$ ,  $DGCH$ , on connoît leurs Diamètres  $AB$ ,  $CD$ , on pourra trouver les circonférences  $AEBF$ ,  $DGCH$ , par *Probl. 6.* & ensuite la Surface qu'on cherche, comme il vient d'être enseigné. Mais pour éviter les fractions qui peuvent arriver aux circonférences, ajoutez ensemble les deux Diamètres  $AB$ ,  $CD$ , pour avoir leur somme, qu'il faudra multiplier toujours par 157, & diviser le produit toujours par 100, le Quotient donnera la Surface qu'on cherche, par *Theor. 25.* Comme si le grand Diamètre  $AB$  est de 24 pieds, & le petit  $CD$  de 18 pieds, on multipliera leur somme 42 par le côté  $AD$  que je suppose de 12 pieds, le produit sera 504, qui étant multiplié par

par 157, & le produit 79128 étant divisé par 100, on aura 791 pieds quarréz, & environ 40 pouces quarréz pour la Surface convexe du Cone tronqué ABCD. 167. Fig.

## PROBLEME XXIV.

*Mesurer la Surface d'une Sphere.*

Pour trouver la Surface de la Sphere ABCD, dont le Diametre AC soit par exemple de 18 pouces, multipliez ce Diametre 18 par sa circonférence, qui par Probl. 6. se trouvera de 56 pouces & d'environ 6 lignes, & le produit donnera 1017 pouces quarréz pour la Surface de la Sphere proposée ABCD, par Theor. 29. 164. Fig.

Ou bien, ce qui revient au même, multipliez par 4 l'Aire du grand Cercle de la Sphere ABCD, qui par Probl. 8. se trouvera de 254 pouces quarréz, & d'environ 49 lignes quarrées, & le produit donnera 1017 pouces quarréz & 52 lignes quarrées pour l'Aire de la Surface proposée ABCD.

Ou bien encore pour éviter les fractions, multipliez le quarré 324 du Diametre 18, toujours par 314, & divisez le produit 101734 toujours par 100, le Quotient donnera 1017 pouces quarréz & environ 49 lignes quarrées pour la Surface qu'on cherche, comme il est évident par Coroll. 3. Theor. 29.

## S C O L I E.

Au lieu de vous servir de la Raison de 100 à 314, servez-vous de celle de 100000 à 314159 dans les grandes supputations, pour avoir plus exactement la Surface qu'on cherche; comme pour connoître la Surface de la Terre, dont le Diametre a été trouvé au Probl. 7. de 2292 lieues de Marine, multipliez le quarré 5253264 de ce Diametre 2292 par 314159, & divisez le produit 1650360164976 par 100000, le quotient donnera environ 16503601 lieues quarrées pour la Surface qu'on cherche.

Le Diametre d'une Sphere se peut connoître en le prenant avec un Compas Spherique, pour le porter sur une ligne divisée en pieds ou en pouces, &c. Mais si l'on trouve quelque difficulté à connoître ce Diametre, on appliquera un filet tout autour de la Sphere, & ce filet étant étendu en donnera la circonférence, au moyen de laquelle on pourra connoître le Diametre par Probl. 7. & ensuite la Surface de la Sphere, comme il vient d'être enseigné: ou bien on pourra connoître par Probl. 9. l'Aire du grand Cercle de la Sphere,

Planch. 19.  
164. Fig.

Sphère, dont le quadruple sera la Surface de la Sphère; par Theor. 28. Ou bien encore servez-vous de ce Canon, qui a sa démonstration; Multipliez le *Quarré* de la *circonférence* toujours par 100, & divisez le produit toujours par 314. Comme si la circonférence est de 56 pieds, son quarré sera 3136, lequel étant multiplié par 100, & le produit 313600 étant divisé par 314, on aura 998 pieds quarréz, & environ 104 pouces quarréz pour la Surface de la Sphère qui a 56 pieds de circonférence.

## PROBLEME XXV.

*Mesurer la Surface d'une portion de Sphère.*

164. Fig. **P**OUR connoître l'Aire de la Surface du Segment ou Portion de Sphère EFD, dont l'arc BDF soit par exemple de 100 degrez, par le Diametre connu AC, que nous supposerons de 18 pouces, auquel cas la circonférence du grand Cercle ABCD, se trouvera par Probl. 6, de 56 pouces & d'environ 6 lignes: on multipliera cette circonférence par la Flèche DH: qui se trouvera de 3 pouces & d'environ 3 lignes, par cette Analogie;

Comme le Sinus Total	100000
Au Sinus versé de la moitié de l'Arc EDF	35721
Ainsi le Demi-diametre AC	9
A la Flèche DG	3. 3.

& le produit donnera 183 pouces quarréz & environ 90 lignes quarrées pour l'Aire du Segment proposé EFD, par Coroll. 5. Theor. 18.

Ou bien trouvez la corde DE de la moitié de l'arc EDF, par cette Analogie;

Comme le Sinus Total	100000
Au Sinus du quart de l'arc EDF	41261
Ainsi le Diametre AC	18
A la corde DE	7. 7.

qui se trouvera de 7 pouces & d'environ 7 lignes & —, & la considérez comme le Rayon d'un Cercle, dont l'Aire se trouvera par Probl. 8. de 152 pouces quarréz, & d'environ 94 lignes quarrées, laquelle par Theor. 39. est égale à la Surface de la Portion de Sphère EFD.

SCOLI 2.

Pour éviter les Fractions, qui étant négligées empêchent d'avoir l'Aire qu'on cherche, bien exactement, Multipliez le quarré 324 du Diametre 18 par le Sinus versé 35721 de la moitié de l'arc EDF, & multipliez le produit 11573604 108-jours par 157, pour avoir un second produit 1817055828, lequel étant divisé par le centuple du Sinus Total, c'est à dire par 10000000, on aura 181 pouces quarréz, & environ 102 lignes quarrées pour l'Aire assez exacte de la Surface proposée EFD.

Ce Canon est tres-commode pour trouver l'Aire de la Surface de cette partie de la Terre, qu'on appelle Zone froide, & qui est terminée par l'un des Cercles Polaires, & dont l'arc est de 47 degrez, comme étant le double de la plus grande Declinaison du Soleil, que l'on suppose ordinairement de 23 degrez & 30 minutes, parce que le Diametre de la Terre est connu, sçavoir de 2292 lieues de Marine, &c.

PROBLEME XXVI.

*Mesurer la Surface d'une Zone.*

IL est évident que pour connoître la Surface de la Zone 164. Fig. AEFC, terminée par les deux circonferences AC, EF, dont on connoît les distances DA, DE, ou DC, DF, de leur Pole commun D, il n'y a qu'à mesurer par Probl. 25. les Surfaces des deux Portions de Sphere ACD, EFD, & ôter la plus petite de la plus grande; mais cela se peut faire plus facilement, sçavoir en multipliant la circonférence du grand Cercle de la Sphere par la partie GH de l'Axe commun GD, car ainsi on aura la Surface de la Zone proposée AEFC, par Theor. 31. Cette partie GH étant égale à la différence des Sinus versés des deux distances DA, DE, se trouvera aisément par cette Analogie,

Comme le Sinus Total,

A la difference des Sinus versés des distances DA,  
DE;

Ainsi le Demi-diametre de la Sphere;

A la partie GH.

Comme si la distance DE est de 24 degrez, & la distance DA de 36, & que le Diametre de la Sphere ABCD, soit par

Mem.  
che. 19.  
164. Fig.

par exemple de 18 poudes, les Sinus verbes des arcs DE, DA, seront 8646, 19090, & leur difference sera 10453, au moyen de laquelle & du Diametre de la Sphere, que nous avons supposé de 18 poudes, la partie GH se trouvera par l'Analogie précédente de 11 lignes, par laquelle multipliant la circonference du grand Cercle de la Sphere ABCD, qui par Probl. 6. se trouvera de 56 poudes & d'environ 6 lignes, on aura 51 poudes quarréz & 114 lignes quarrées pour l'Aire qu'on cherche.

## PROBLEME XXVII.

*Mesurer la Surface d'un Spheroïde.*


Q UELques Geometres modernes nous ont donné des Methodes qu'ils ont crû geometriques, pour mesurer la Surface d'un Spheroïde : mais comme ces Methodes sont trop speculatives, & d'une longue execution, j'aime mieux vous enseigner icy la maniere qui est commune parmi les Arpenteurs pour trouver l'Aire de la Surface d'un Spheroïde, quoy qu'elle ne soit pas dans une juste precision, comme nous avons déjà remarqué au Theor. 31. & qui sert à la mesure des Voutes en Ovale.

163. Fig. Pour donc mesurer l'Aire de la Surface du Spheroïde ABCD, dont le grand Axe AC soit l'Axe de circonvolution, c'est à dire celui autour duquel on a fait rouler une Ellipse pour produire le Spheroïde. Supposons que ce grand Axe AC soit de 45 pieds, & le petit BD de 35, la Surface de la Sphere qui aura ce petit Axe 35 pour Diametre, se trouvera par Probl. 24 de 3846 pieds quarréz, & d'environ 72 poudes quarréz : & comme cette Surface est à celle du Spheroïde, à peu près comme le petit Axe 35, au grand Axe 45, si l'on multiplie cette Surface trouvée de Sphere, c'est à dire 3846 pieds quarréz, & 72 poudes quarréz par le nombre 45 du grand Axe, & qu'on divise le produit 173087 pieds quarréz & 72 poudes quarréz, par le nombre 35 du Diametre du petit Axe, on aura 4945 pieds quarréz & environ 51 poudes quarréz pour la Surface du Spheroïde proposé ABCD.


## S C O R I E.

Parce que comme nous avons déjà dit, ce Problème est tres utile pour la mesure des Voutes en Ovale, j'ajouteray icy pour ceux qui aiment la pratique un Canon aisé, pour trouver la Surface concave, d'une Voute en Ovale. en supposant que cette Surface est justement la moitié d'un Spheroïde.

*Adm.*







Multipliez ensemble les deux Axes AC, BD, pour avoir leur produit, qu'il faudra multiplier toujours par 157, & diviser ce second produit toujours par 100, pour avoir la Surface qu'on cherche. Comme icy, où nous avons supposé le grand Axe AC de 45 pieds, & le petit BD, de 35, leur produit sera 1575, lequel étant multiplié par 157, & le produit 247275 étant divisé par 100, on a 2472 pieds quarréz & 108 pouces quarréz pour la Surface proposée.

Plan-  
che 19.  
163. Fig.

## PROBLEME XXVIII.

*Mesurer un espace terminé par une ligne spirale.*

**A**rchimede nous a laissé un Traité particulier de la Spirale, dont nous n'avons pas voulu parler icy, pour ne pas grossir inutilement ce Volume, parce que l'usage de cette ligne n'est pas de grande consequence dans la pratique, & que même les Arpenteurs du commun ne la connoissent pas, & la savent encore moins décrire. C'est pourquoy je me contenteray de vous enseigner ici en peu de mots la simple pratique pour mesurer l'espace compris par la premiere Spirale, par le moyen duquel il sera facile de juger du contenu des autres, parce que par Prop. 27. *Archim. des Spirales*, l'espace de la seconde Spirale contient six fois celuy de la premiere, comme étant double du Cercle de la premiere revolution, lequel est triple de la premiere Spirale: que l'espace de la troisième Spirale contient douze fois celuy de la premiere, comme étant double de la seconde, & quadruple du Cercle de la premiere revolution, ou égal au Cercle de la seconde revolution: que l'espace de la quatrième Spirale contient dix-huit fois celuy de la premiere, comme étant triple de celuy de la seconde, & sextuple du Cercle de la premiere revolution, & ainsi ensuite.

Comme si la ligne AD, qui répond à la premiere Spirale ABCD, & qui à cause de cela est appelée *Ligne de premiere revolution*, est de 12 pieds, auquel cas le Diametre du Cercle DIKL, qu'on appelle *Cercle de premiere revolution*, sera de 24 pieds; l'Aire de ce Cercle de premiere revolution se trouvera par Probl. 8. d'environ 452 pieds quarréz, dont le tiers donnera environ 151 pieds quarréz pour l'Aire du premier Plan Spiral ABCD, dont le sextuple donne environ 904 pieds quarréz pour le contenu du second espace Spiral ABCDEFGH, &c.

Plan-  
che 20.  
169. Fig.



## QUATRIÈME PARTIE

### DE LA STEREOMETRIE.

**L**A Stereométrie, qu'on appelle aussi *Toisé*, comme nous avons déjà dit ailleurs, enseigne à mesurer ou toiser un corps; & comme dans la Planimétrie nous avons mesuré les Plans par des Plans plus petits, de même dans la Stereométrie on mesure les Solides par des Solides plus petits, qui sont ordinairement des Cubes, & quelquefois des Parallelepipedes rectangles plus longs que larges, en conservant toujours l'angle droit, parce qu'il est invariable, certain, & unique dans son espèce, & d'ailleurs plus commode.

Le nombre des mesures cubiques qui sont contenues dans un Solide, se trouve toujours par la Multiplication, parce qu'on le conçoit ordinairement égal à un Parallelepipede rectangle, dont la Solidité se trouve en multipliant ensemble deux de ses dimensions, pour avoir l'Aire de l'une de ses faces, qui peut passer pour la base du corps, & en multipliant cette base par la hauteur, c'est à dire par la troisième dimension.

**Plan-** Comme si du Parallelepipede rectangle ABCDEF, on multi-  
che 19. plie la longueur AB, que je suppose de 6 toises, par la lar-  
166. Fig. geur BC de 2 toises, on aura 12 toises quarrées pour la base ABC de ce Corps, qui étant multipliée par la hauteur CD de 3 toises, on a 36 toises cubiques pour la solidité de ce Parallelepipede, lesquelles sont produites par les intersections de certains Plans tirez en long & en travers par les divisions des côtes opposez.

D'où il suit qu'une Toise courante ayant 6 Pieds courans, une Toise cubique aura 216 Pieds cubiques, parce qu'en multipliant 6 par 6, on a 36 Pieds quarrés pour la Toise quarrée qui sert de base à la Toise cubique, & qu'en multipliant cette base 36 encore par 6, qui est la hauteur de la Toise cubique, on a 216 Pieds cubiques pour la valeur d'une Toise cube. On connoitra par un semblable raisonnement qu'un Pied courant ayant 12 Pouces courans, un pied cube aura 1728 Pouces cubes, &c.

C'est pourquoy quand on aura des Toises cubiques à reduire

en

en Pieds cubiques, au lieu de les multiplier par 6, on les doit multiplier par 216. Ainsi ayant connu que la Solidité du Parallelepiped ABCDEF est de 36 Toises cubes, si l'on veut sçavoir combien elles sont de Pieds cubes, on les multipliera par 216, & l'on aura 7776 Pieds cubes pour la capacité du Parallelepiped ABCDEF. Tout au contraire quand on aura des Pieds cubiques à reduire en toises cubiques, au lieu de les diviser par 6, on les divisera par 216. Ainsi des autres.

Nous avons dit que les Solides se mesurent quelquefois par des Parallelepipedes rectangles plus longs que larges, ce qui se fait principalement pour avoir un calcul plus aisé, lorsqu'il y a des especes differentes à multiplier ensemble: & alors on appelle *Pied de toise cube* un Parallelepiped rectangle, qui contient 36 Pieds cubes, comme la Toise quarrée contient 36 Pieds quarrés, ce Solide rectangle étant mis dans la pratique à la place d'une Toise cube qui vaut 216 Pieds cubes; & ayant été appelé *Pied de Toise cube*, parce qu'il a un Pied de hauteur sur une Toise quarrée pour base.

Pareillement on appelle *Pouce de Pied cube* un Solide rectangle, qui contient 144 Ponces cubes, comme le Pied quarré contient 144 Ponces quarrés, ce Solide étant mis dans la pratique à la place d'un Pied cube qui vaut 1728 Ponces cubes, & ayant été appelé *Pouce de Pied cube*, parce qu'il a un Pouce de hauteur sur un Pied quarré pour base.

On appelle de la même façon *Ligne de Pouce cube*, un Solide rectangle, qui contient 144 Lignes cubes, comme le Pouce quarré contient 144 Lignes quarrées, ce Solide étant mis dans la pratique à la place d'un Pouce cube qui vaut 1728 Lignes cubes, & ayant été appelé *Ligne de Pouce cube*, parce qu'il a une Ligne de hauteur sur un Pouce quarré de base.

On doit appeller de la même maniere, *Pouce de Toise cube*, un Solide rectangle, dont la hauteur est d'un Pouce, & la base une Toise quarrée qui vaut 5184 Ponces quarrés, parce qu'une Toise courante a 72 Ponces courans, & dont la Solidité est par consequent de 5184 Ponces cubes: & *Ligne de Toise cube* un Solide rectangle, dont la hauteur est d'une Ligne, & la base une Toise quarrée qui vaut 746496 Lignes quarrées, parce qu'une Toise courante a 864 Lignes courantes, & dont la Solidité est par consequent 746496 Lignes cubes. Ainsi des autres.

Cela fait dire aux Arpenteurs, que des Toises quarrées multipliées par des Toises courantes, produisent des *Toises cubes*: & que pareillement des Pieds quarrés multipliez par des Pieds courans, produisent des *Pieds cubes*: & ainsi des autres. Mais que des Toises quarrées multipliées par des Pieds courans, produisent des *Pieds de toise cube*: & que pareillement des Pieds quarrés multipliez par des Ponces

de long, c'est à dire par des Pouces courans, produisent des Pouces de pied cube: & que de la même façon des Pouces quarréz multipliez par des Lignes de long, produisent des Lignes de Pouce cube, &c.

## CHAPITRE I.

### *Des Theorèmes.*

**N**ous ferons comme dans la Trigonometrie & dans la Planimetrie, precéder la Theorie, afin que la pratique s'en trouvant dégagée, soit plus facile à comprendre, & qu'étant appuyée sur les Theorèmes que nous allons démontrer, elle puisse plaire par son évidence aux plus & aux moins habiles.

### THEOREME I.

*La Solidité d'une Sphere est le tiers de celle d'un Prisme, qui a pour base un Plan égal à la Surface de la Sphere, & dont la hauteur est égale au Rayon de la même Sphere.*

Plan-  
che 20.  
170. Fig.

**J**E dis que la Sphere ABCD est égale à la troisiéme partie d'un Prisme, comme par exemple du Cylindre AEFG, dont la hauteur AE, ou FG, est égale au Rayon AE, ou EC de la Sphere, & la base AHGI est un Cercle égal à la Surface de la Sphere, duquel par consequent le Diametre AG est double du Diametre AC de la même Sphere.

### DEMONSTRATION.

Si l'on divise par pensée toute la Surface de la Sphere en une infinité de parties égales, elles pourront passer pour des Plans égaux, & pour les bases d'autant de Cones, dont les pointes conviennent au centre E de la Sphere, & dont la hauteur commune est par consequent égale au Rayon EK, ou EL de la même Sphere. D'où il est aisé de conclure que comme par 10. 12. l'un de ces Cones est égal au tiers d'un Prisme de même base & de même hauteur, aussi la Sphere ABCD est égale au tiers d'un Prisme, qui a pour base la somme des bases de tous ces Cones, c'est à dire la Surface de la Sphere, & pour hauteur le Rayon de la même Sphere. *Ce qu'il falloit démontrer.*

## S C O L I E.

Plan.  
che 20.  
170. Fig.

On démontrera de la même façon qu'un Secteur de Sphere, comme KELB, est égal au tiers d'un Prisme qui a pour base la Surface KBL, qui sert de base au Secteur, & le Rayon de la Sphere EK, ou EL, qui est le côté de ce Secteur, pour hauteur; & comme un Prisme est triple d'une Pyramide de même base & de même hauteur, il s'ensuit qu'une Sphere est égale à un Cone, dont la hauteur est égale au Rayon de la Sphere, & la base un Cercle, dont le Diametre est double de celui de la Sphere: & qu'un Secteur de Sphere est égal à un Cone, dont la hauteur est égale au Rayon de la Sphere, & la base un Cercle, dont le Rayon est égal à la corde de la moitié de l'arc du Secteur, parce que ce Cercle est égal à la Surface Sphérique qui sert de base au Secteur de Sphere.

## T H E O R E M E II.

*La Solidité d'une Sphere est à celle du Cube de son Diametre, environ comme 157 est à 300.*

J E dis que la Solidité de la Sphere ABCD est à celle du Cube de son Diametre AC, environ comme 157 est à 300, c'est à dire que si le Cube du Diametre AC contenoit par exemple 300 pieds Cubes, la Sphere ABCD en contiendrait presque 157. 170. Fig.

## D E M O N S T R A T I O N.

Si l'on suppose que le Diametre AC soit de 30 pieds, la Surface de la Sphere ABCD où l'Aire de la base AHGI, se trouvera par Probl. 2. Chap. 2. Part. 3. de 2826 pieds quarréz, lesquels étant multipliez par la hauteur AE, qui est de 15 pieds, on aura 42390 pieds cubiques pour la Solidité du Cylindre AEFG, lequel étant triple de la Sphere ABCD, par Theor. 1. le tiers de ce produit 42390, donnera 14130 pieds cubes pour la Solidité de la Sphere ABCD, dont le Diametre AC est de 30 pieds, & le cube de ce Diametre est par conséquent de 27000 pieds cubes. Nous savons donc que la Sphere ABCD est au cube de son Diametre AC, comme 14130 est à 27000, ou en divisant chaque terme par 90, comme 157 est à 300. Ce qu'il falloit démonstrer.

## THEOREME III.

*Si un Plan coupe une Sphere en deux parties inégales, l'une de ces deux Portions sera égale à un Cone, dont la base est la même que celle de la Portion, & dont la hauteur est composée de celle de la même Portion, & d'une ligne qui est quatrième proportionnelle à trois autres, dont la troisième est le Rayon de la Sphere, la deuxième est la hauteur de la même Portion, & la première est la hauteur de l'autre Portion.*





Plan-  
che 21.  
172. Fig.

J E dis que si le Plan AECF coupe la Sphere ABCD, dont le centre est G, & le Diametre BD, est perpendiculaire au Plan coupant AECF, & par conséquent à la ligne AC qui est dans ce Plan, en deux parties inégales AECB, AFCD, l'une de ces deux Portions, comme AECB est égale au Cone AECH, dont la base AECF est la même que celle du Segment AECB, & la hauteur HI est composée de la hauteur BE, du même Segment AECB, & de la ligne BH, qui est quatre proportionnelle aux trois DI, BI, BG, ou AG. Tirez les droites AB, AD, CG,


## DEMONSTRATION.

Parce que par constr. les quatre lignes BI, DI, BH, BG, sont proportionnelles, en composant, les quatre BD, DI, GH, BG, seront aussi proportionnelles; ainsi à la place des deux BD, DI, on pourra mettre quand on voudra, les deux GH, BG, qui sont en même Raïson; & parce que l'angle BAD est droit; par 31. 3. & que la ligne AI est perpendiculaire à la ligne BD, on connoît par 8. 6. que les trois Triangles rectangles DAI, DAB, BAI, sont équiangles, & par 4. 6. que les trois lignes BD, AD, DI, sont proportionnelles: c'est pourquoy par 20. 6. la première BD sera à la troisième DI, comme le carré de la première BD, au carré de la seconde AD, ou comme le carré AB, au carré AI, à cause des quatre proportionnelles BD, AD, AB, AI, par 4. 6. & si à la place des deux premiers termes BD, DI, on met les deux GH, AG, qui sont en même Raïson, comme vous avez vu, on connoîtra que la ligne GH, est à la ligne AG, comme le carré AB, au carré AI, ou par 2. 12. comme le Cercle dont le Rayon est AB, au Cercle dont le Rayon est AI, c'est à dire au Cercle AECF. Or si l'on considère le Cercle AB comme la base d'un Cone dont la hauteur est AG, & le Cercle AEFC, comme la base d'un Cone dont la hauteur est GH, on

con







convoittra par 13. 11. que ces deux Cones qui ont leurs bases & leurs hauteurs en raison reciproque, sont égaux entre eux, c'est à dire que le Cone dont la base est le Cercle AECF, & la hauteur est GH, est égal au Cone dont la base est le Cercle AB, & la hauteur est AG, c'est à dire par Theor. 1. au Secteur AGCB: & comme le Cone dont la base est le Cercle AECF, & la hauteur GH, est égal à la somme HAGC, des deux Cones AECH, AFCG, parce que leurs hauteurs HI, GI, sont ensemble égales à la hauteur GH, & que la base AECF est commune à ces trois Cones; il s'ensuit que tout le Solide HAGC est égal au Secteur AGCF, c'est pourquoy si de chacun de ces deux Solides égaux on ôte le Cone commun AFCG, il restera le Cone AECH égal au Segment AECB. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME IV.

*Un Sphéroïde est à une Sphere, dont le Diametre est égal à l'Axe de circonvolution, comme le Quarré de l'autre Axe, au Quarré du même Axe de circonvolution.*

J E dis que le Sphéroïde ABCD, dont l'Axe de circonvolution est AC, est à la Sphere circonscrite AFCG, dont le Diametre est égal au même Axe de circonvolution AC, comme le Quarré de l'autre Axe BD, est au quarré de l'Axe de circonvolution AC. 173. Fig.

## PREPARATION.

Décrivez du centre E du Sphéroïde, dans le Plan de l'Ellipse ABCD, qui par sa circonvolution a produit le Sphéroïde, autour del'Axe de circonvolution AC, le Cercle AFCG; & tirez dans le Plan de ce Cercle une ligne quelconque HIK, perpendiculaire à l'Axe de circonvolution AC.

## DEMONSTRATION.

Lorsqu'on fait tourner autour de l'Axe AC la demi-Ellipse ABC, pour produire le Sphéroïde ABCD, & le Demi-cercle AFC, pour produire la Sphere AFCG, les perpendiculaires KH, KI, & une infinité d'autres que l'on peut imaginer, produisent des Cercles, dont les centres sont dans l'Axe de circonvolution AC: tellement qu'on peut considerer le Sphéroïde ABCD, & la Sphere AFCG, comme des sommes d'autant de Cercles infinis l'une que l'autre, & comme tous ces Cercles infinis sont par 2. 12. entre eux comme les quarrés de leurs Rayons KH, KI, qui sont proportionnels aux deux EF, EB, & par conséquent aux deux Axes AC, BD, par Theor. 16. Chap. 1.

Plan-  
che 21.  
473. Fig.

Part. 3. il s'ensuit que la somme de tous les Cercles du Spheroïde ABCD, ou le Spheroïde ABCD est à la somme de tous les Cercles de la Sphere ACFG, ou à la Sphere ACFG, comme le Quarré de l'Axe BD, au Quarré de l'Axe AC. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME V.

*Un Spheroïde est au Solide sous l'Axe de circonvolution & le Quarré de l'autre Axe, environ comme 157 est à 300.*

173. Fig. JE dis que le Spheroïde ABCD, dont l'Axe de circonvolution est AC, est au Parallelepipedé rectangle dont la hauteur est égale à l'Axe de circonvolution AC, & la base est le Quarré de l'autre Axe BD, environ comme 157 est à 300.

### DEMONSTRATION.

Parce que par Theor. 4. le Spheroïde ABCD est à la Sphere ACFG, comme le Quarré BD, au Quarré AC, si l'on donne à ces deux Quarréz BD, AC, considérez comme les bases de deux Solides, l'Axe de circonvolution AC pour hauteur commune, on connoitra par 32. 11. que le Spheroïde ABCD, est à la Sphere ACFG, comme le Solide sous l'Axe de circonvolution AC, & le Quarré de l'autre Axe BD, est au Cube de l'Axe de circonvolution AC, & en permutant, que le Spheroïde ABCD, est au Solide sous l'Axe de circonvolution AC, & le Quarré de l'autre Axe BD, comme la Sphere ACFG, au Cube AC, ou par Theor. 2. comme 157 est à 300. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME VI.

*Un Segment de Spheroïde, dont la hauteur est une partie de l'Axe de circonvolution, est au Segment de Sphere correspondant comme le Cone inscrit dans le Segment de Spheroïde, est au Cone inscrit dans le Segment de Sphere.*

173. Fig. JE dis que le Segment de Spheroïde LMA, dont l'Axe de circonvolution est AC, est au Segment de Sphere correspondant NRA, comme le Cone LOMA, est au Cone NFRA, la hauteur AS étant commune à ces quatre Solides.

## D É M O N S T R A T I O N .

Plan-  
che 11.  
173. Fig.

Car on démontrera comme dans le *Theor.* 4. que la Portion du Sphéroïde LMA, est à la Portion correspondante de Sphere NRA, comme le Quarré de l'Axe BD, est au Quarré de l'Axe de circonvolution AC, ou comme le Quarré MS, au Quarré RS, ou par 2. 12. comme le Cercle LOM, au Cercle NPR: C'est pourquoy si à ces deux Cercles considérez comme les bases de deux Cones, on donne la hauteur commune AS, on connoitra par 11. 12. que le Segment LMA, est au Segment NRA, comme le Cone LOMA, est au Cone NPRA. Ce qu'il falloit démontrer.

## C O R O L L A I R E .

Il suit de cette Proposition, que le Segment de Sphéroïde LMA est égal à un Cone, dont la base est la même que celle du Segment, sçavoir le Cercle LOM, & la hauteur est égale à la ligne AQ composée de la hauteur AS du Segment & de la ligne SQ quatrième proportionnelle à trois autres, dont la troisième est le Demi-axe AE, de circonvolution, la seconde est la hauteur AS du Segment, & la première est la hauteur CS du Segment opposé, comme dans la Sphere, parce que le Segment de Sphere, NRA est par *Theor.* 3. égal à un Cone, dont la hauteur est la même ligne composée AQ, & la même base est la même que celle du Segment; sçavoir le cercle NPR. Ainsi en mettant ce Cone à la place du Segment NRA, on pourra faire ainsi la

## D É M O N S T R A T I O N .

Parce que le Segment LMA est au Segment NRA, comme le Cone LOMA, est au Cone NPRA, en permutant, le Segment LMA sera à son Cone inscrit LOMA, comme le Segment NRA est à son Cone inscrit NPRA, & en mettant à la place du Segment NRA, le Cone precedent, dont la hauteur est la ligne composée AQ, & la base est la même que celle du Cone NPRA, sçavoir le Cercle NPR, & qu'à la place de ces deux derniers Cones de bases égales, on mette leurs hauteurs AQ, AS, qui sont en même Raison, par 14. 12. on connoitra que le Segment LMA, est à son Cone inscrit LOMA, comme la hauteur AQ, est à la hauteur AS, & enfin si à ces deux lignes AQ, AS, considérées comme les hauteurs de deux Cones, on donne le Cercle LOM pour base commune, on connoitra par 14. 12. que le Segment LMA est au Cone LOMA, comme le Cone dont la hauteur est AQ, & la base est le Cercle LOM, au Cone LOMA, & que par conséquent le Sphéroïde LMA est égal au Cone, dont la hauteur est la ligne composée AQ, & la base est le Cercle LOM, sçavoir la même que celle du Segment. Ce qu'il falloit démontrer.

THEO.

## THEOREME VII.

*Un Conoïde Parabolique est égal à la moitié d'un Cylindre de même base & de même hauteur.*

Plan-  
che 21.  
174. Fig.

JE dis que le Conoïde Parabolique , ou le Paraboloïde ABCD, qui est produit par la circonvolution de la Parabole quarrée ABC, autour de son Axe BG, & dont la hauteur est la ligne BG, & la base le Cercle ADCH, est égal à la moitié du Cylindre AEFC D, dont la base est le même Cercle ADCH, & la hauteur la même ligne BG.

## D I M O N S T R A T I O N .

Si par tous les points de la hauteur ou Axe BG, que je suppose divisé en une infinité de parties égales, on tire par pensée des lignes droites perpendiculaires à l'Axe BG, ou parallèles à la base AC de la Parabole ABC, toutes ces parallèles infinies, qui sont des Ordonnées à l'Axe BG, décriront par la circonvolution de la Parabole ABC, autour de son Axe BG, autant de Cercles parallèles entre eux, dont les centres seront dans l'Axe BG, & dont les Diametres seront ces parallèles ou Ordonnées: & comme les Quarrez de ces Ordonnées ou Diametres des Cercles sont par la nature de la Parabole quarrée comme les parties correspondantes de l'Axe BG, & par conséquent dans une continuelle proportion arithmétique, les Cercles qui composent le Paraboloïde, seront aussi dans une Progression arithmétique. Ainsi en considérant le Paraboloïde ABCD, comme une somme de Cercles infinis en continuelle proportion arithmétique, dont le plus grand est la base ADCH, on connoît par Theor. 11. Chap. 1. Part 3. que la somme de tous ces Cercles infinis; ou le Paraboloïde ABCD, est égal à la moitié du plus grand ADCH multiplié par la ligne BG, qui exprime le nombre de leur multitude, c'est à dire à la moitié du Cylindre AEFC D. Ce qu'il falloit démontrer.

## THEOREME VIII.

Un Conoïde Hyperbolique produit par la circonvolution d'une Hyperbole autour de son Axe, est égal à l'excès d'un Cone tronqué, ayant pour base celle du Cone Asymptotique, & pour hauteur celle du Conoïde, sur le Cylindre inscrit dans le Cone Asymptotique, & de même hauteur que le Conoïde.

JE dis que si autour de l'Axe BE, de l'Hyperbole ABC, dont le centre est O, & les Asymptotes OF, OG & dont la base AC est perpendiculaire à l'Axe BE, on fait mouvoir & l'Hyperbole ABC, & le Triangle isoscèle FOG, afin de produire par cette circonvolution le Conoïde Hyperbolique ABCD, & le Cone Asymptotique OFFPG; le Conoïde ABCD est égal à l'excès du Cone tronqué HFP GK, dont la hauteur BE est la même que celle du Conoïde ABCD & la base FPG la même que celle du Cone Asymptotique OFFPG, sur le Cylindre HLMNK de même hauteur que le Conoïde ABCD.

Plan-  
che 12.  
175. Fig.

## PREPARATION.

Tirez du point A dans le Plan de la base FPG, au Diametre FG, la perpendiculaire AQ, qui touchant en A le Cercle ADC, par 32. 3. sera par Probl. 17. Chap. 2. Part. 3. le Rayon d'un Cercle égal à la Couronne FADCGP terminée par les circonferences des deux Cercles FPG, ADC, dont le centre commun est E, qui est aussi le centre du Cercle LMN, qui sert de base au Cylindre HLMNK. Tirez encore dans le Cercle HIK, au Diametre FG, le Diametre parallele HK, qui touchera l'Hyperbole ABC au sommet B,

## DEMONSTRATION.

Parce que le Quarré AQ est par 36. 3. égal au Rectangle des lignes AF, AG, c'est à dire par la nature des Asymptotes, au Quarré de la touchante BH, ces deux lignes AQ, BH seront égales entre elles, & leurs Cercles seront par conséquent égaux entre eux, c'est à dire que le Cercle HIK, ou LMN, sera égal au Cercle dont le Rayon est AQ, ou à la Couronne FADCGP: c'est pourquoy à cause de l'égalité des bases & des hauteurs, le Cylindre HLMNK sera égal à l'espace solide BKGP FH, qui entoure le Conoïde ABCD; & comme en ôtant cet espace solide du Cone tronqué HFP GK, on a le Conoïde ABCD pour excès, il faut de même qu'en ôtant le

Plan-  
che 21.  
175. Fig. le Cylindre HLMNK égal à cet espace solide BKGPFH du même Cone tronqué HFP'GK, on ait aussi le Conoïde Hyperbolique ABCD pour excès. Ce qu'il falloit démontrer.

## CHAPITRE II.

### *Des Problèmes.*

C E Chapitre est comme un Corollaire, du precedent, dont les Theorèmes nous fournissent des pratiques courtes & faciles pour mesurer toute sorte de Solides, comme vous allez voir dans les Problèmes suivans.

### PROBLEME I.


#### *Mesurer un Prisme.*

UN Prisme droit ou oblique se mesure en multipliant par sa hauteur, qui est une ligne perpendiculaire aux deux bases paralleles & opposées, l'une de ces deux bases, qu'on peut connoître par les principes de la Planimetrie, sçavoir en la mesurant comme un Triangle, si elle est triangulaire: comme un Polygone, si elle est un Polygone: comme un Cercle, si elle est circulaire, & alors le Prisme prend le nom de Cylindre: & enfin comme une Ellipse, si elle est une Ellipse, telles que sont les bases des Bassins Elliptiques de plusieurs Fontaines.


Nous avons déjà vu dans la Preface de cette quatrième Partie, la maniere de mesurer un Parallelepipede rectangle; & par consequent un Cube, c'est pourquoy nous n'en parlerons pas davantage: & nous donnerons icy premierement un exemple d'un Prisme triangulaire, comme ABCDE, dont la hauteur AB sera supposée de 24 pieds, le côté BD de sa base BC de 10 pieds, l'autre côté CD de 17, & le troisième côté BC de 21, & alors l'Aire de cette base ou Triangle BCD se trouvera de 84 pieds quarrés, qui étant multipliez par la hauteur 24, on aura 2016 pieds cubes pour la solidité du Prisme proposé ABCDE.

Plan-  
che 12.  
176. Fig. Pour mesurer le Prisme exagone ABCDE, dont la hauteur ED soit par exemple de 24 pieds, & de côté AB de sa base ABCD, que je suppose reguliere, de 8 pieds; cette base ABCD se trouvera de 166 pieds quarrés, qui étant multipliez par la hauteur 24, on aura 3984 pieds cubes pour la solidité qu'on cherche.

Pour







Pour mesurer le Cylindre AEBCD, dont la hauteur AD, Plan-  
ou BC, soit par exemple de 24 pieds, & le Diametre AB de la che. 129.  
base AEBF de 25 pieds; cette base AEBF se trouvera de 490 161. Fig.  
pieds quarréz, & d'environ 90 pouces quarréz, laquelle  
étant multipliée par la hauteur AD; ou BC, que nous avons  
supposée de 24 pieds, on aura 11775 pieds cubes pour le  
contenu du Cylindre proposé AEBCD.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à  
la base, multipliez le quarré 625 du Diametre 25 par la hau-  
teur du Cylindre 24, & multipliez le produit 15000 toujours  
par 785, pour avoir un second produit 11775000, qu'il fau-  
dra diviser toujours par 1000, & le quotient donnera com-  
me auparavant 11775 pieds cubes pour la Solidité qu'on  
cherche.

Pour mesurer le contenu du Bassin Elliptique ABCD, dont Plan-  
la longueur AC soit par exemple de 124 pieds, la largeur che. 130.  
BD de 100, & la profondeur AE de 6, l'Aire de la base 177. Fig.  
se trouvera de 9734 pieds quarréz, qui étant multipliée  
par la profondeur, que nous avons supposée de 6 pieds, on  
aura 58404 pieds cubes d'eau pour le contenu qu'on cher-  
che.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à  
la base, multipliez ensemble la longueur 124, la largeur 100,  
& la profondeur 6, pour avoir leur produit solide 74400,  
qu'il faudra multiplier toujours par 785, & diviser le pro-  
duit 58404000 toujours par 1000, & le quotient donnera  
comme auparavant, 58404 pieds cubes pour la capacité qu'on  
cherche.

# S C O L I E.

Nous avons déjà dit dans la Planimetrie, que quand il y  
a des especes différentes à multiplier ensemble, il faut reduire  
le tout à la plus basse espece, & alors après avoir trouvé la  
solidité du corps proposé dans les mesures cubiques plus bas-  
ses, on pourra par la Division les reduire aux plus hautes;  
comme vous allez voir dans les exemples suivans.

Pour trouver la solidité du Parallelepipede rectangle, ou 178. Fig.  
muraille ABCD, dont la longueur CD soit par exemple de  
8 toises, 4 pieds, ou de 52 pieds, la hauteur BC de 2 toises,  
3 pieds, ou de 15 pieds, & l'épaisseur AB de 2 pieds; multi-  
pliez les 2 pieds de l'épaisseur AB par les 15 pieds de la hau-  
teur BC, & le produit 30 par les 52 pieds de la longueur CD,  
& ce second produit donnera 1560 pieds cubiques, qui étant  
divisez par 216, parce qu'une toise cube a 216 pieds cubes,  
on aura 7 toises cubes, & 48 pieds cubes, pour la solidité de  
la muraille proposée ABCD.

Plan-  
che 22.  
478. Fig.

Si la longueur CD étoit de 6 toises, 3 pieds, 4 poudes, qui font en tout 472 poudes, la hauteur BC de 2 toises, 4 pieds, 9 poudes, qui font en tout 201 poudes, & l'épaisseur AB de 2 pieds, 8 poudes, qui font en tout 32 poudes, en multipliant ensemble ces trois lignes 472, 201, 32, on a 3035904 poudes cubes, qui étant divifez par 1728, parce qu'un pied cube a 1728 poudes cubes, on aura 1756 pieds cubes, & 1536 poudes cubes pour la solidité de la muraille proposée ABCD. Que si l'on divise encore les 1756 pieds cubes par 216, qui est le nombre des pieds cubes contenus dans une toise cube, on aura 8 toises cubes, 28 pieds cubes, & 1536 poudes cubes pour la solidité qu'on cherche.

On bien pour venir tout d'un coup aux toises, divifez les 3035904 poudes cubes trouvez, par 373248 qui est la valeur d'une toise cube en pieds cubes, & le quotient donnera 8 toises cubes, comme auparavant, & le reste de la division, sçavoir 49920 étant divise par 1728, qui est la valeur d'un pied cube en poudes cubes, on aura 28 pieds cubes, & il restera 1536 poudes cubes, comme auparavant.

Il y a dans la Stereometrie, comme dans la Planimetrie, plusieurs abrezgez, dont les Arpenteurs se servent pour faire cette multiplication, qui de la maniere que nous l'avons icy enseignée donne de la peine à ceux qui ne sont pas accoutumez à faire de grands calculs: mais comme la plupart de ces abrezgez ne font qu'approcher de la verité, & que les autres chargent beaucoup la memoire, ils ne meritent pas que nous en parlions icy davantage.

Lorsque le Prisme que l'on se propose de mesurer est droit, comme le precedent ABCD, il est évident que le côté BC en represente la hauteur, parce qu'il est perpendiculaire à sa base ABE: mais quand il sera *oblique*, c'est à dire quand ses côtés ne seront pas perpendiculaires à sa base; comme ABCDE, dont le côté AE est oblique à la base ABF, alors ce côté AE ne peut pas être pris pour la hauteur du Prisme, mais on doit prendre la ligne EF, qui est perpendiculaire au Plan de la base AEF. Cette remarque servira pour tous les autres corps qui ne seront pas droits.

179. Fig. Quand un Prisme triangulaire est appuyé sur l'une de ses faces Parallelogrammes, comme ABCD, qui s'appuye sur le Parallelogramme ABCF, lequel dans ce cas est considéré comme sa base, à l'égard de laquelle la hauteur du Prisme sera égale à la hauteur EG, du Triangle ABE, qui en represente le *Profil*, ou *Porfil*, il ne faudroit pas multiplier la base ABCF, par la hauteur EG, mais seulement par la moitié de cette hauteur, pour avoir la solidité du Prisme, parce qu'en multipliant par la hauteur entiere, on a la solidité d'un Prisme de même base & de même hauteur, qui par 40. 13. est double du

du Prisme proposé ABCDE, lequel à cause de cela nous appellerons dans la suite *Demi-prisme*, lorsque sa base sera un Parallelogramme. Plan. che 22. 189. Fig.

Supposons que la base ABCF soit un Parallelogramme rectangle, dont la longueur BC soit de 24 pieds, & sa largeur AB de 14, auquel cas l'Aire de ce Parallelogramme se trouvera de 336 pieds quarrés, comme l'on connoît en multipliant la longueur 24 par la largeur 14 : or si l'on suppose que le côté BE soit de 15 pieds, & le côté AE de 13, la perpendiculaire EG se trouvera de 12 pieds, dont la moitié 6 étant multipliée par l'Aire 336 de la base ABCF, on aura 2016 pieds cubes pour la solidité du Prisme ABCDE, que l'on aura aussi, comme nous avons déjà dit, en multipliant l'Aire du Triangle ABE, qui se trouvera de 84 pieds quarrés, par la longueur BC, que nous avons supposée de 24 pieds.

## PROBLEME II.

### Mesurer une Pyramide.

Pour connoître la solidité de la Pyramide ABCD, dont la hauteur ED soit par exemple de 36 pieds, & le côté AB ou BC de sa base que je suppose quarré, de 18 pieds ; multipliez la base ABC qui se trouvera de 324 pieds quarrés, par la hauteur 36, & divisez le produit 11664 toujours par 3, & le quotient donnera 3888 pieds cubes pour la solidité de la Pyramide proposée ABCD, parce que par cette Multiplication, l'on a le contenu d'un Prisme de même base & de même hauteur, qui est triple de la Pyramide Plan. che 19. 163. Fig.

On mesurera de la même façon la solidité d'un Cone, comme du Cone ABC, dont la hauteur CO soit par exemple de 36 pieds, & le Diametre AB, de sa base ADBE, de 30 pieds, auquel cas cette base ou Cercle ADBE se trouvera de 706 pieds quarrés & 72 pouces quarrés, laquelle étant multipliée par le tiers 12 de la hauteur 36, on aura 8478 pieds cubes pour la solidité du Cone proposé ABC. 162. Fig.

Ou bien pour éviter les fractions qui arrivent ordinairement à la base, multipliez le quarré 900 du Diametre 30 toujours par 785, & le produit 706500 par le tiers 12 de la hauteur 36, pour avoir ce second produit 8478000, lequel étant divisé toujours par 1000, le quotient donnera comme auparavant, 8478 pieds cubes pour la solidité qu'en cherche.

SCOLIE.

Les Cones qui servent dans la pratique, sont ordinairement droites, auquel cas la ligne qui en représente la hauteur, tombe au centre de leur base : & comme il arrive quelquefois que cette hauteur ne peut pas être facilement mesurée, comme quand on a ce Cone entre les mains ; dans ce cas on mesurera son côté AC, ou BC, que nous supposerons de 25 poudes, & le Demi-diametre AO, ou BO, que nous supposerons de 15 poudes, dont le quarré 225 étant ôté du quarré 625 du côté AB, la Racine quarrée du reste 400, donnera 20 pieds pour la hauteur CO, dont la démonstration est évidente par 47. 1.

PROBLEME III.

*Mesurer une Pyramide tronquée.*

Plan-  
che 20.  
171. Fig.

Pour trouver la solidité de la Pyramide tronquée ABCDEF, prolongez par pensée les côtez jusqu'en L, pour avoir la Pyramide entiere ABLF, de laquelle ôtant la Pyramide ajoûtée HCLE, le reste sera la Pyramide tronquée. Mais pour trouver les soliditez de ces deux Pyramides, qui sont icy droites, supposons que la base ABGF soit un Quarré dont le côté AB soit par exemple de 36 pieds, & que le côté CD de la petite base HCDE, qui sera aussi un Quarré, soit de 8 pieds, auquel cas cette petite base HCDE sera de 64 pieds quarréz, & la grande ABGF de 1296 pieds quarréz. Supposons encore que la hauteur IK de la Pyramide tronquée soit de 42 pieds, au moyen de laquelle & des côtez connus de chaque base, on trouvera la hauteur LI de la petite Pyramide HCLE, en faisant l'Analogie suivante, qui tire sa démonstration des deux Triangles semblables LIE, LKF, &c.

Comme la difference des côtez AB, CD.	28
Au petit côté CD	8
Ainsi la hauteur IK	42
A la hauteur LI	12

qui se trouvera de 12 pieds, à laquelle ajoûtant les 42 pieds de la hauteur IK, on aura 54 pieds pour la grande hauteur LK, que l'on peut aussi trouver immédiatement par cette Analogie,

*Comme*

Comme la différence des côtes  $AB$ ,  $CD$   
 Au grand côté  $AB$   
 Ainsi la hauteur  $IK$   
 A la grandeur  $LK$

Plan-  
 28 che 21.  
 36 171. Fig.  
 42  
 54

qui se trouvera de 54 pieds, comme auparavant.

Si l'on multiplie la grande base 1296 par le tiers 18 de la grande hauteur  $LK$ , on aura 23328 pieds cubes pour la solidité de la grande Pyramide  $ABLF$  : & si l'on multiplie la petite base 64 par le tiers 4 de la petite hauteur, on aura 256 pieds cubes pour la solidité de la petite Pyramide  $HCLE$ , laquelle étant ôtée de la solidité 23328 de la plus grande  $ABLF$ , le reste donnera 23072 pieds cubiques pour la Pyramide tronquée  $ABCDEF$ .

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver dans les hauteurs  $LI$ ,  $LK$ , ajoutez ensemble les deux bases 1296, 64, pour avoir leur somme 1360, & les multipliez ensemble, pour avoir leur produit 82944, dont la Racine quarrée 288 doit être ajoutée à la somme précédente 1360, pour avoir une seconde somme 1648, qui étant multipliée par le tiers 14 de la hauteur  $IK$ , on aura 23072 pieds cubes pour la solidité qu'on cherche, comme auparavant.

S C O L I E.

Comme cette Pyramide tronquée  $ABCDEF$  est icy droite, ce qui arrive ordinairement, on la peut encore mesurer en la réduisant en un Prisme, dont la base est le Quarré  $STVX$  égal à la petite base  $CDEH$  : en quatre Demi-prismes égaux, dont les bases sont les Rectangles égaux  $YZTS$ ,  $MNVT$ ,  $VOPX$ ,  $QRSX$ , dans chacun desquels la largeur est égale au côté 8 de la petite base  $CDHE$ , & la longueur est égale à la moitié 14 de l'excès 28 du côté 36 de la grande base  $ABCD$ , sur le côté 8 de la petite  $CDHE$  : & en quatre Pyramides égales, dont les sommets sont aux quatre points  $C$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $H$ , & dont les bases sont les quatre Quarrez égaux  $BV$ ,  $PQ$ ,  $RY$ ,  $AT$ , chacun desquels est de 196 pieds quarréz, parce que son côté est de 14 pieds, sçavoir la moitié de la différence des deux côtes  $AB$ ,  $CD$ .

Si donc on multiplie l'Aire 64 de la base  $STVX$  du Prisme, par la hauteur 42, on aura 2688 pieds cubes pour la solidité de ce Prisme. Si l'on multiplie la base  $ZTSY$ , dont l'Aire se trouvera de 112 pieds quarréz, par la moitié 21 de la hauteur 42, on aura 2352 pieds cubiques pour le Demi prisme, dont la base est  $ZTSY$ , & multipliant cette solidité trouvée 2352 par 4, on aura 9408 pieds cubiques pour les quatre Demi prismes. Enfin si l'on multiplie la base d'une des quatre

Plan- Pyramides, qui est de 196 pieds quarréz, par le tiers 14 de la  
che 21. hauteur 42, on aura 2744 pieds cubes pour une Pyramide,  
171. Fig. dont le quadruple donnera 10976 pieds cubes pour les quatre  
Pyramides. Ainsi en ajoûtant ensemble les soliditez trouvées  
2688, 9408, 10976, du Prisme, des quatre Demi-prismes,  
& des quatre Pyramides, on aura 23072 pieds cubes pour la  
solidité de la Pyramide tronquée ABCDEF, comme aupá-  
ravant.

## PROBLEME IV.

*Mesurer un Cone tronqué.*

Plan-  
che 19.  
165. Fig.

**P**OUR trouver la solidité du Cone tronqué ABCD, dont la  
hauteur IO soit par exemple de 11 pieds, le Diametre AB  
de la grande base AEBF, de 24 pieds, & le Diametre CD de  
la petite base DGCH, de 18 pieds, auquel cas la grande base  
AEBF se trouvera de 452 pieds quarréz, & la petite DGCH de  
254; on pourra comme dans le Problème precedent, prolonger  
les côtes du Cone tronqué, pour avoir un Cone entier,  
mais on aura plutôt fait de se servir du Canon precedent, que  
nous repeterons encore icy.

Ajoûtez donc ensemble les deux bases 452, 254, pour avoir  
leur somme 706, & les multipliez ensemble, pour avoir leur  
produit 114808, dont la Racine quarrée 339 étant ajoûtee à  
la somme precedente 706, on aura cette seconde somme 1045,  
laquelle étant multipliée par le tiers 5 de la hauteur IO, on  
aura 5225 pieds cubes pour la solidité du Cone tronqué ABCD.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à cha-  
que base, & même à la Racine quarrée de leur produit, suivez  
cet autre Canon, qui comme le precedent, a sa démonstra-  
tion.

Multipliez ensemble les Diametres 24, 18, pour avoir leur  
produit 432, qu'il faut ajoûter à la somme 900 des quarréz  
576, 324 des mêmes Diametres 24, 18, pour avoir cette seconde  
somme 1332, qu'il faut multiplier toujours par 157, pour avoir  
ce produit 209124, lequel étant multiplié par le tiers 5, de la  
hauteur IO, & la moitié 522810 du produit 1045620, étant  
divisée toujours par 100, on aura plus exactement qu'aupá-  
ravant, 5228 pieds cubes pour la solidité qu'on cherche.

## PROBLEME V.

*Mesurer un corps taludé.*

Pour trouver la solidité d'un Corps taludé, c'est à dire d'un Plan-  
 corps plus large d'un côté que d'autre, comme de la murail-  
 le ABCDEF, qui est plus large par le bas que par le haut, sa  
 base ABCI étant plus grande que la face supérieure DEFK, ou  
 que le Rectangle GHCI, qui est son Plan orthographique, de tout  
 le Rectangle ABHG, qui sert de base au Demi-prisme ou Ta-  
 lud ABHKF, dont le Profil est le Triangle rectangle BHK,  
 comme le Profil de la muraille est le Trapezoïde BCDK; on  
 multipliera l'Aire du Triangle rectangle BHK par la longueur  
 AB de la muraille, pour avoir la solidité du Prisme ABHKF,  
 que l'on aura aussi en multipliant la base ABHG par la moitié  
 de la hauteur HK. Pareillement on multipliera l'Aire du Rec-  
 tangle GHCI par la même hauteur HK, ou CD, pour avoir  
 la solidité du Parallelepède GHCDEF, à laquelle ajoutant  
 celle du Talud ABHKF, on aura la solidité entière de la mu-  
 raille proposée ABCDEF, que l'on trouvera plus facile-  
 ment, en multipliant l'Aire de son Profil BCDK par sa lon-  
 gueur AB.

Supposons que la longueur AB soit de 48 pieds, la largeur  
 BH du Talud de 6 pieds, la hauteur HK de 12 pieds, & l'é-  
 paisseur DK par en haut de 4 pieds; auquel cas l'épaisseur BC  
 par en bas sera de 10 pieds; la solidité du Demi-prisme ABHKF  
 se trouvera de 1728 pieds cubes, & celle du Prisme GHCD  
 de 2304 pieds cubes, & toute la muraille ABCDEF de 4032  
 pieds cubes. Ou bien l'Aire du Trapezoïde BCDK se trouve-  
 ra de 84 pieds quarrés, laquelle étant multipliée par la lon-  
 gueur AB, que nous avons supposée de 48 pieds courans, on  
 aura comme auparavant, 4032 pieds cubiques pour la solidi-  
 té qu'on cherche.

C'est de la même façon que l'on mesurera la solidité de la  
 muraille ABCDKE, qui est taludée des deux côtés, sçavoir  
 en ajoutant à la solidité du Prisme FGDKI, dont le Plan  
 orthographique est le Rectangle FGHI, la solidité du Talud  
 ABGOEF, dont la base est le Rectangle ABGF, & encore la  
 solidité de l'autre Talud IHCDKL; dont la base est le Rectan-  
 gle IHCL, & le Profil est le Triangle DHC rectangle en H.  
 Ou bien en multipliant le Profil BCDO de la muraille par sa  
 longueur AB.

Comme si la longueur AB de la muraille est de 48 pieds, la  
 largeur BG du Talud ABGOEF de 6 pieds, la largeur CH  
 de l'autre Talud IHCDKL de 5 pieds, la hauteur GO, ou HD  
 de la muraille de 12 pieds, & son épaisseur OD par en haut de 3

N 2      pieds,



Plan-  
che 22.  
181. Fig.

pieds, auquel cas son épaisseur BC par en bas sera de 14 pieds, la solidité du Talud ou Demi-prisme ABGOF se trouvera de 1728 pieds cubes, celle de l'autre Talud IHCDKL de 1440 pieds cubes, & celle du Parallelepipede rectangle FGHDKI de 1728 pieds cubes, & toute la muraille ABCDKE de 4896 pieds cubes, qu'on auroit trouvez en multipliant l'Aire du Profil BCDO, qui se trouvera de 102 pieds quarréz, par la longueur AB, que nous avons supposée de 48 pieds.

183. Fig.


Lorsque les deux Taluds se joindront, comme il arrive dans la muraille ABCDEFGH, dont les deux Taluds ABCIHK, CDEFI, se joignent au point I, on ajoutera pareillement à la solidité du Parallelepipede rectangle KCMFGH, dont la base est le Rectangle KCML, & le Profil le Rectangle CMFI, ou KLGH, ou si vous voulez le Rectangle KCIH, ou LMFG, la solidité du Talud ABCIHK, dont la base est le Rectangle ABCK, & le Profil le Triangle BCI rectangle en C, & la solidité de l'autre Talud CDEFI, dont la base est le Rectangle CDEM, & le Profil le Triangle CDL rectangle en C pour avoir la solidité de la muraille proposée ABCDEFGH.

Comme si AB, ou KC, ou LM est de 24 pieds, BC, ou AK de 6 pieds, CD, ou ME de 3 pieds, DE, ou CM, ou KL, ou GH, ou FI, de 4 pieds, & CI, ou FM, ou KH, ou LG de 12 pieds, la solidité du Parallelepipede KCMFGH sera de 1152 pieds cubiques, celle du Talud ABCIHK de 864 pieds cubiques, & la solidité de l'autre Talud CDEFI, de 120 pieds cubiques, de sorte que la somme de ces trois soliditez trouvées 1152, 864, 120, donnera 3136 pieds cubes pour la solidité entiere de la muraille proposée ABCDEFGH.

184. Fig.

Si des deux Taluds qui se joignent, l'un est à côté, & l'autre en dessus, qui dans cette situation prend le nom de *Glacis*, comme il arrive au corps ABCDEF, qui a en devant, le Talud AGHEIF, dont la base est le Rectangle FAGI, & le Profil le Triangle AGH rectangle en G : & en haut, le Glacis EHKCDL, dont la base est le Rectangle EHKL, & le Profil le Triangle HKC rectangle en K ; on ajoutera comme auparavant, à la solidité du Parallelepipede rectangle IGBKLE, dont la base est le Rectangle IGBM, les soliditez du Talud FAGHEL, & du Glacis EHKCDLE, pour avoir la solidité entiere du corps proposé ABCDEF, que l'on aura aussi en multipliant son Profil ABCH par la longueur AF.

Comme si AF est de 24 pieds, AG de 4, BG de 6, BK de 8, & KC de 5, la solidité du Parallelepipede IGBKLE se trouvera de 1152 pieds cubes, celle du Talud AGHEIF de 384 pieds cubes, & celle du Glacis EHKCDL, de 360 pieds cubes, & ces trois soliditez 1152, 384, 360, étant ajoutées ensemble, donnent 1896 pieds cubiques, pour la solidité du corps FABCDE, que l'on trouvera plus facilement, en multipliant l'Aire du Pro-





Si ABCH, qui se trouvera de 79 pieds quarréz, par la longueur AF, que nous avons supposée de 24 pieds, car on aura comme auparavant, 1896 pieds cubes pour la solidité qu'on cherche.

Si les deux Taluds qui se joignent, appartiennent à deux murailles taludées en dehors, comme il arrive aux deux murailles ABCL, AFDL, que je suppose également hautes, dont les bases sont les deux Trapezoïdes AMNB, AMGE, les Profils sont les deux Trapezoïdes ENCR, DEFG, & les deux Taluds extérieurs sont AIORQB, AIOEPF, qui ont pour bases les Trapezoïdes AIQB, AIPF, & les deux Triangles rectangles BQR, EPF pour Profils; tirez de l'angle I dans la Base de chaque Talud, les deux lignes IK, IH, perpendiculaires aux deux AB, AF, & joignez les droites OK, OH, & chaque muraille se trouvera réduite comme auparavant, en un Prisme, & en un Demi-prisme, sçavoir la muraille ABCL, au Prisme IQRCLQ, dont la Base est le Trapezoïde IQNM, & le Profil est le Rectangle QRCN, ou IOLM, & au Demi-prisme KIORQB, dont la Base est le Rectangle KIQB, & le Profil est le Triangle BQR rectangle en Q, ou le Triangle KIO rectangle en I: & pareillement la muraille AFDL, au Prisme IMLDEP, dont la Base est le Trapezoïde IMGP, & le Profil est le Rectangle PGDE, ou IMLO, & au Demi-prisme HIOEPF, dont la Base est le Rectangle HIPF, & le Profil est le Triangle FPE rectangle en P, ou le Triangle HIO rectangle en I. Si donc on ajoute ensemble les soliditez des deux Prismes, & des deux Demi-prismes, & de plus la solidité de la Pyramide AHOK, dont la Base est le Quadrilatère AHIK, & le sommet est l'angle O, qu'on appelle *Angle faillant*, parce qu'il sort en dehors, on aura la solidité des deux murailles proposées ABCL, AFDL.

Supposons que les deux murailles ABCL, AFDL, soient égales, & que la longueur AB soit de 40 pieds, IQ de 30, MN de 25, QR de 8, & BQ de 6, auquel cas AK sera de 10 pieds, & QN de 3: l'Aire du Trapezoïde IMNQ sera de 82 peds quarréz, & 72 poices quarréz, & la solidité du Prisme IQRCLQ sera de 660 pieds cubes: l'Aire du Rectangle KIQR sera de 180 pieds quarréz, & la solidité du Demi-prisme KBQROI sera de 720 pieds cubes, & la somme de ces deux soliditez trouvées 660, 720, est 1380, dont le double donne 2760 pieds cubes pour la somme des Prismes & des Demi-prismes qui se trouvent dans les deux murailles, à laquelle il faut ajouter la solidité de la Pyramide OKAH, qui se trouvera de 160 pieds cubes, parce que sa base AHIK est de 60 peds quarréz, & l'on aura en tout 2920 pieds cubiques pour la solidité des deux murailles ABCL, AFDL.


Si les deux Taluds qui se joignent, appartiennent à deux murailles taludées en dedans, comme il arrive aux deux murail-


Plan- les ABCDER, AGNFER, que je suppose également hautes, che 23- dont les Bases sont les deux Trapezoïdes ABCR, AGNR, le 285. Fig. Profil commun le Trapezoïde BCDS, parce que je suppose que les deux murailles sont également épaisses par en bas, aussi-bien que par en haut, & les deux Taluds intérieurs sont AOSQB, AOTPG, qui ont pour bases les Trapezoïdes ABQI, AGPI, & le Triangle BQS rectangle en Q pour Profil commun; Tirez de l'angle A, qu'on appelle *Angle entrant*, parce qu'il rentre en dedans, dans la Base de chaque Talud, les deux lignes AH, AK, perpendiculaires aux deux IP, IQ, & dans la face verticale de chaque Prisme, par les points H, K, les deux lignes HM, KL, perpendiculaires aux deux IP, IQ, ou bien aux deux AH, AK, & menez les droites AL, AM, qui feront deux Pyramides, dont les hauteurs seront les deux perpendiculaires AH, AK, les Bases seront les deux Rectangles IOMH, IOLK, & le sommet commun sera le point A. Ainsi les deux murailles proposées ABCDE, AGNFE, se trouveront ensemble réduites en deux Prismes QDSLK, PFTMOEL, ou en un seul, dont la Base est le Plan PNRCQIP, & la hauteur est CD, ou QS, en deux Demi-prismes, sçavoir BQSLKA, dont la base est le Rectangle AKQB, & le Profil est le Triangle BQS rectangle en Q, ou le Triangle AKL rectangle en K, & PFTMHA, dont la base est le Rectangle AGPH, & le Profil le Triangle AHM rectangle en M, & en deux Pyramides AIOLKA, AIOMHA. C'est pourquoy si l'on ajoute ensemble les soliditez de tous ces corps, on aura la solidité des deux murailles proposées ABCDE, AGNFE.

Supposons comme auparavant, que les deux murailles ABCDE, AGNFE soient égales, & que la longueur AB soit de 40 pieds, IQ de 50, RC de 55, BQ de 6, & CD de 8, auquel cas QC sera de 3 pieds, & IK de 10: le Plan PNRCQIP sera de 315 pieds quarrés, & son Prisme PIQCDEF de 2520 pieds cubes: le Demi-prisme ABQSLK se trouvera de 960 pieds cubes, & la Pyramide AIOLKA de 160 pieds cubes, dont le double 320 étant ajouté au double 1920, du précédent solide 960, & la somme 2240 étant ajoutée au premier solide 2520, on aura en tout 4760 pieds cubes pour la solidité des deux murailles ABCDE, AGNFE.

## S C O L I E.

288. Fig. Par ce qui vient d'être dit, il sera facile de mesurer deux ou plusieurs murailles jointes ensemble, & taludées en dedans & en dehors: mais quand elles auront une même hauteur, que leur Talud intérieur & extérieur seront égaux, & qu'elles seront par tout des angles égaux, on pourra trouver tout d'un coup leur solidité, en multipliant leur Profil comme ABCD, qui en représente-





(發)

fermera la Base par une ligne droite tirée par le milieu du Plan qui leur sert effectivement de Base, cette ligne droite étant considérée comme la hauteur d'un Prisme composé de toutes ces murailles. Plan-  
che 23.  
188. Fig.

Il sera aussi facile par les mêmes principes de mesurer la solidité du Rempart, & des autres parties d'une Forteresse : comme pour connoître la solidité du Rempart d'un Polygone fortifié, dont AB représente la moitié d'une Courtine, BC le Flanc du Bastion, que je suppose perpendiculaire à la Courtine, pour avoir un calcul plus aisé, & CD la Face du Bastion, terminée au point D, par la ligne capitale HM, qui termine la ligne GH du Talud intérieur, qui est parallèle à la ligne EF du Rempart, & la ligne IKLM du Talud extérieur, qui suit parallèlement la ligne du premier trait ABCD : tellement que la figure GIKLMH représente le Plan d'une Demi-courtine, & d'un Demi-bastion, où la ligne AE représente la largeur du Rempart par en haut, c'est à dire la largeur du Terre-plain, que nous supposerons de 12 toises, ou de 72 pieds : la ligne EG représente la quantité du Talud intérieur, que nous mettrons de 18 pieds : & la ligne AI représente la quantité du Talud extérieur, qui soit par exemple de 12 pieds. Pour la hauteur du Rempart, nous la supposerons de 18 pieds, comme vous voyez dans le Profil, qui montre que le Rempart est large par le pied de 102 pieds, sans nous mettre en peine pour le présent, si ces suppositions sont bien conformes aux maximes d'une bonne fortification. Plan-  
che 24.  
189. Fig.

Pour trouver la solidité de cette masse de terre, & premièrement celle du Prisme qui est compris entre les deux Taluds, & dont la base est le Plan ABCDFE, on trouvera premièrement la superficie de ce Plan, en le réduisant au Trapezoïde AEFT, par la ligne AB prolongée : au Triangle rectangle BCT, & au Triangle obliquangle CTD, par la Diagonale CT.

Si l'on multiplie la somme 720 de la ligne EF, qui se trouvera d'environ 344 pieds, & de la ligne AT de 376 pieds, par la ligne AE, que nous avons supposée de 72 pieds, la moitié du produit 51840, donnera 25920 pieds quarrés pour l'Aire du Trapezoïde AEFT. Si l'on multiplie la ligne BT, qui se trouvera d'environ 160 pieds, par la ligne BC, que nous supposerons de 120 pieds, la moitié du produit 19200, donnera 9600 pieds quarrés pour l'Aire du Triangle rectangle BCT. Et si l'on multiplie la Face CD, qui se trouvera à peu près de 270 pieds, par la perpendiculaire TV de 160 pieds, la moitié du produit 43200 donnera 21600 pieds quarrés pour l'Aire du Triangle obliquangle CTD. Que si l'on ajoute ensemble ces trois Aires trouvées 25920, 19200, 21600, on aura 66700 pieds quarrés pour le Plan ABCDFE, lequel étant multi-



Men- multiplié par la hauteur du Rempart, que nous avons supposée  
che 24. de 18 pieds, on aura 1200600 pieds cubes pour la solidité du  
189. Fig. Prisme terminé par les deux Taluds, & posé sur la base  
ABCD FE.

Pour trouver la solidité des Taluds, on les reduira en des Demi-prismes, & en des Pyramides, en tirant des angles de leurs Bases des lignes perpendiculaires entre les deux côtez paralleles, sçavoir HO, DN, CP, CQ, KR, KS: & le Talud interieur, dont la Base est le Trapezoïde GEFH, se trouvera divisé en un Prisme, dont la Base est le Rectangle GEOH, & la hauteur la même que celle du Rempart, & en une Pyramide, dont le sommet est en H, la hauteur est la perpendiculaire HO, & la Base est un Rectangle, dont la largeur est la ligne OF, & la longueur égale à la hauteur du Rempart: & le Talud exterieur se trouvera divisé en trois Demi-prismes, dont la hauteur commune est la même que celle du Rempart, & les Bases les trois Rectangles AK, CK, CN, & en trois Pyramides, entre lesquelles il y en a deux, dont les sommets sont en haut, ayant par consequent la hauteur du Rempart pour hauteur commune, & dont les Bases sont le Triangle rectangle DNM, & le Quadrilatere CPLQ; & la troisième est prise dans la pratique pour celle qui a même hauteur que le Rempart, & le Quarré KRBS pour base, parce que cette petite partie est peu considerable: mais en prenant la chose à la rigueur, au lieu de cette Pyramide on doit prendre le double d'une autre, qui a sa pointe en bas au point K, la perpendiculaire KR pour hauteur; & un Rectangle pour base, dont la largeur est la ligne BR, & la longueur est égale à la hauteur du Rempart.

Si l'on multiplie la longueur EO, ou GH, qui se trouvera d'environ 330 pieds, par la largeur EG, que nous avons supposée de 18 pieds, on aura 5940 pieds quarrés pour l'Aire du Rectangle GO, qui étant multipliée par la moitié 9 de la hauteur du Rempart, on aura 53460 pieds cubes pour la solidité du Demi-prisme, dont la Base est le Rectangle GO: & si l'on multiplie la ligne OF, qui se trouvera d'environ 14 pieds, par la hauteur du Rempart, que nous avons supposée de 18 pieds, & le produit 252 par le tiers 6 de la ligne HO, on aura 1512 pieds cubes pour la solidité de la Pyramide, dont la pointe est H, & la hauteur est HO, à laquelle ajoutant la solidité 53460 du Demi-prisme precedent, on aura 54972 pieds cubiques pour la solidité du Talud interieur.

Si l'on multiplie la somme 580 de la ligne IK, qui se trouvera d'environ 206 pieds, de la ligne KQ, de 109 pieds, & de la ligne PN de 265 pieds, par la largeur commune AI, que nous avons supposée de 12 pieds, on aura 6960 pieds quarrés pour la somme des Aires des trois Rectangles AK, CK, CN, qui

qui étant multipliée par la moitié 9 de la hauteur du Rempart, on aura 62640 pieds cubes pour la solidité des trois Demi-prismes, dont les trois Rectangles AK, CK, CN, en représentent les bases : & si l'on multiplie la somme 26 de la ligne KR de 12 pieds, de la ligne QL de 3 pieds, & de la moitié 6 de la ligne MN de 12 pieds, par la largeur commune DN de 12 pieds, on aura 312 pieds quarréz pour la somme des Bases des trois Pyramides qui se trouvent comprises dans le Talud extérieur, c'est pourquoy si l'on multiplie cette somme 312 par la troisième partie 6 de la hauteur du Rempart, qui est commune aux trois Pyramides, on aura 1872 pieds cubes pour la solidité de ces trois Pyramides, à laquelle ajoutant la solidité 62640 des trois Demi-prismes precedens, la somme donnera 64512 pieds cubiques pour la solidité du Talud extérieur.

Enfin si l'on ajoute ensemble les trois soliditez trouvées 1100600, 34972, 64512, du Prisme compris entre les deux Taluds, du Talud intérieur & extérieur, on aura 1320084 pieds cubes, qui font 6111 toises cubes, & 108 pieds cubes pour la solidité de la partie proposée du Rempart, dont la Base est le Plan IKLMHG.

C'est de la même maniere que l'on mesurera la solidité d'un Fossé, c'est à dire la quantité de la terre qu'on en aura tirée : & aussi la solidité du Parapet avec sa Banquette, & encore la solidité de l'Esplanade : mais pour ces derniers corps qui ont les lignes opposées de leurs Bases paralleles entre elles, il y a des abreges, qui quoy qu'ils ne soient pas dans la dernière précision, à cause de l'inégalité des angles, ne sont pas à negliger, qui sont de multiplier leur Profil par la quantité d'une ligne droite tirée par le milieu du Plan qui leur sert de Base, car ainsi on aura tout d'un coup leur solidité, sans que l'erreur puisse être considerable.

On se peut aussi servir tres utilement de cette methode, pour trouver par une seule operation la solidité d'un Rempart avec son Parapet & sa Banquette, lorsque les Bastions sont creux, ce que l'on est obligé de sçavoir, pour pouvoir juger à peu près de la quantité de la terre que l'on doit tirer du fossé pour la construction du Rempart & de son Parapet : & aussi pour trouver la solidité de la Maçonnerie que l'on fait pour soutenir les Terrasses, ce que l'on est aussi obligé de connoître, pour en déterminer la dépense, & pour sçavoir en combien de temps un ouvrage pourra être achevé avec un certain nombre d'hommes, ou bien pour sçavoir combien on y doit employer d'hommes, pour l'achever en un temps déterminé, &c.

## PROBLEME VI.

*Mesurer une Sphere par son Diametre connu.*

Plan-  
che 24.  
192. Fig.

**P**OUR trouver la solidité de la Sphere ABCD par son Diametre connu BD, qui soit par exemple de 18. pouces, ayant trouvé sa Surface de 1017 pouces quarréz & d'environ 49 lignes quarrées, multipliez-la par la sixième partie du Diametre 18, & le produit donnera 3052 pouces cubes, & 36 lignes cubiques pour la solidité de la Sphere proposée ABCD, comme il est évident par Theor. 1.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à la Surface de la Sphere, multipliez le Cube 5832 du Diametre 18 toujours par 157, & divisez le tiers 305208 du produit 915624 toujours par 100, & le quotient donnera 3052 pouces cubiques, & 138 lignes cubiques pour la solidité qu'on cherche, dont la démonstration est évidente par Theor. 1.

## PROBLEME VII.

*Mesurer une Sphere par sa circonference connue.*

192. Fig.

**P**OUR trouver la solidité de la Sphere ABCD par sa circonference connue, qui soit par exemple de 56 pieds, son Diametre se trouvera de 17 pieds & d'environ 10 pouces, & sa Surface se trouvera de 998 pieds quarréz, & d'environ 104 pouces quarréz, laquelle étant multipliée par le Diametre, la sixième partie du produit donnera 2968 pieds cubes, & environ 733 pouces cubes pour la solidité de la Sphere proposée ABCD.

Ou bien pour éviter les fractions qui arrivent ordinairement au Diametre & à la Surface de la Sphere, & qui empêchent que la solidité ne se trouve pas si exactement; Multipliez le cube 175616 de la circonference 56, toujours par 10000, & divisez le produit 17560000 toujours par 592175, & le Quotient donnera 2965 pieds cubes & environ 636 pouces cubes pour la solidité qu'on cherche.

## PROBLEME VIII.

*Mesurer un Secteur de Sphere.*

**P**OUR trouver la solidité du Secteur de Sphere LEKB, dont l'arc KBL soit par exemple de 100 degrez, par le Diametre BD connu, que nous supposons de 18 pouces; la Surface qui sert de base à ce Secteur de Sphere se trouvera de 181 pouces quarrés & d'environ 102 lignes quarrées, laquelle étant multipliée par la sixième partie du Diametre 18, on aura 545 pouces cubes & 216 lignes cubiques pour la solidité du Secteur proposé KBLE, dont la démonstration est évidente, par Theor. 1.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à la Base du Secteur de Sphere, Multipliez le Sinus verse 35721 de la moitié BK ou BL de l'arc KBL, par le cube 5832 du Diametre 18, & multipliez le produit 208324872 toujours par 157, pour avoir ce second produit 32707004904, dont la sixième partie 5451167484 étant divisée toujours par le centuple du Sinus Total 100000, sçavoir par 10000000, on aura 545 pouces cubes, & environ 201 lignes cubes pour la solidité qu'on cherche.

## PROBLEME IX.

*Mesurer un Segment de Sphere.*

**P**OUR trouver la solidité du Segment ou Portion de Sphere KLB, dont l'arc KBL soit par exemple de 100 degrez, par le Diametre connu BD, que nous supposons de 18 pouces, ôtez du Secteur KELB, qui au Probl. 8. a été trouvé de 545 pouces cubiques & 201 lignes cubes, le Cone KLE qui se trouvera de 287 pouces cubes, & d'environ 1402 lignes cubes, le reste donnera 257 pouces cubes, & 527 lignes cubiques pour la solidité du Segment proposé KLB.

## S C O L I E.

La hauteur EI du Cone KEL se trouvera de 5 pouces, & d'environ 9 lignes dans le Triangle KIE rectangle en I, & le Diametre KL de la Base du même Cone KEL, se trouvera de 13 pouces, & d'environ 9 lignes dans le Triangle isoscèle KEL, après quoy il sera facile de trouver la solidité du Cone KEL, par Probl. 2. Mais pour éviter les fractions qui peuvent

peuvent arriver à la hauteur EI, & au Diametre KL, suivant ce Canon qui a sa démonstration.

Plan-  
che 23.  
867-Fig.

Multipliez le carré 586172816 du Sinus 76604 de la moitié BK, ou BL, de l'arc KBL, par le Sinus 64279 du complement de cette moitié, & multipliez le produit 377200280439664 par le cube 5832 du Diametre 18, pour avoir ce second produit 2199832035524120448, qu'il faudra multiplier toujours par 157, & diviser la douzième partie 28781135798107242528 du troisième produit 345373629577266910336, toujours par le centuple du cube 1000000000000000 du Sinus Total 1000000 savoir par 100000000000000000, & le quotient donnera 287 pouces cubes, & environ 1401 lignes cubes pour la solidité du Cone KEL, qui se pourra connoître tres-commodément, par le moyen des Logarithmes, qui vous épargneront de si longues Multiplications.

Le même Segment KLB se peut connoître indépendamment du Secteur, en ajoutant à sa hauteur BI, la ligne BO quatrième proportionnelle aux trois DI, BI, BE, & en mesurant le Cone KOL, qui par Theor. 3. est égal au Segment BKL. Mais dans la pratique, il vaut mieux se servir du Canon precedent.

## PROBLEME X.

Mesurer un Sphéroïde.

Plan-  
che 24.  
290-Fig.

POUR trouver la solidité du Sphéroïde ABCD, dont l'Axe de circonvolution AC soit par exemple de 32 pouces, & l'autre Axe BD de 18 pouces; la Sphere qui a pour Diametre l'Axe de circonvolution ACI, se trouvera par Probl. 6. de 17148 pouces cubes, & d'environ 1019 lignes cubes, laquelle étant multipliée par le nombre 324, qui est le carré du Diametre BD; & le produit 5556143 pouces cubes, & 108 lignes cubes, étant divisé par le nombre 1024, qui est le carré de l'Axe de circonvolution AC, on aura 5425 pouces cubes, & environ 1591 lignes cubes pour la solidité du Sphéroïde proposé ABCD, comme il est évident par Theor. 4.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à la solidité de la Sphere: Multipliez le carré 324 de l'Axe BD, par l'Axe de circonvolution AC, que nous avons supposé de 32 pouces, & multipliez le produit 10368 toujours par 157, pour avoir ce second produit 1627776, dont le tiers 542592 étant divisé toujours par 100, on aura 5425 pouces cubes, & environ 1590 lignes cubes pour la solidité qu'on cherche, dont la démonstration est évidente par Theor. 5.

## PROBLEME XI.

*Mesurer un Segment de Sphéroïde.*

**P**our trouver la solidité du Segment de Sphéroïde AGF, Planche 24. 190. Fig. qui a pour base un Cercle; dont le Diametre FG, qui est perpendiculaire à l'Axe de circonvolution AC, que nous supposons de 36 pieds, soit par exemple de 12 pieds, & dont la hauteur AH soit de 9 pieds, auquel cas le reste CH sera de 27 pieds, ajoutez à la hauteur AH, la ligne HI de 6 pieds, sçavoir quatrième proportionnelle aux trois CH, AH, AE, & alors la ligne HI se trouvera de 15 pieds, qui sera la hauteur du Cone FIG égal au Segment AFG, *par Coroll. Theor. 6.* La Base de ce Cone qui est la même que celle du Segment, sçavoir le cercle dont le Diametre FG a été supposé de 12 pieds, se trouvera de 103 pieds quarrez, & d'environ 6 pouces quarrez, laquelle étant multipliée par le tiers 5 de la hauteur HI, on aura 565 pieds cubes, & 360 pouces cubes pour la solidité du Cone IFG, ou du Segment proposé AFG.

## S C O L I E.

Un Segment de Sphéroïde se peut encore mesurer autrement, parce que *par Theor. 6.* il est à son Cone inscrit: comme le Segment de Sphere correspondant est à son Cone inscrit: mais comme la pratique que l'on peut tirer de ce Théorème, est plus longue que la précédente, elle ne merite pas que nous en parlions davantage.

## PROBLEME XII.

*Mesurer un Conoïde Parabolique.*

**P**our trouver la solidité du Paraboloïde ARCD, dont l'Axe 191. Fig. BE soit par exemple de 8 pieds, & le Diametre AC de la Base ADCF de 12 pieds, cette Base ADCF se trouvera de 113 pieds quarrez, & d'environ 6 pouces quarrez, laquelle étant multipliée par la moitié 4 de l'Axe BE, on aura 452 pieds cubes, & 288 pouces cubes pour la solidité du Paraboloïde proposé ABCD, dont la démonstration est évidente *par Theor. 7.*

Ou bien pour éviter les fractions qui arrivent ordinairement à la Base du Paraboloïde, Multipliez le carré 144 du Diametre AC, que nous avons supposé de 12 pieds, par l'Axe

BE,

*Fin-  
che 24.  
175. Fig.* BE, qui a été supposé de 8, & multipliez le produit 1152 toujours par 785, pour avoir ce second produit 904320, dont la moitié 452160 étant divisée toujours par 1000, en aura 452 pieds cubiques, & 23-pouces cubes pour la solidité qu'on cherche.

## PROBLEME XIII.

*Mesurer un Conoïde Hyperbolique.*

*Fin-  
che 25.  
175. Fig.* Pour trouver la solidité du Conoïde Hyperbolique ABCD, dont le Cone Asymptotique est FOGP, & le Cone tronqué est FHKGP, comme vous avez vu au Theor. 8. d'où nous tirerons la maniere de trouver la solidité de ce Conoïde, qui peut néanmoins être mesuré plus facilement, comme nous dirons en après; nous supposerons le Demi-diametre traversant OB de 36 pieds, le second Diametre HK, ou LN de 48, & l'Axe BE de 9, auquel cas le Rayon AE sera de 18 pieds, l'autre Rayon FE de 30, l'Axe OE de 45, le Diametre AC de 36, & l'autre Diametre FG de 60 pieds: le Cylindre HLMNK se trouvera d'environ 16278 pieds cubes, lequel étant ôté du Cone tronqué MFPGK, qui se trouvera de 20686 pieds cubes, il restera 4408 pieds cubes pour la solidité du Conoïde proposé ABCD.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver au Cylindre & au Cone tronqué, Multipliez la somme 108 des deux Diametres AC, LN, par le plus grand AC, & multipliez le produit 6480 toujours par 157, pour avoir ce second produit 1017360, auquel il faut ôter le produit 723456 du nombre invariable 314; & du quarré 2304 du plus petit Diametre LN, & il restera 293904, qui étant multiplié par l'Axe BE, que nous avons supposé de 9 pieds, & la sixieme partie 440856 du produit 2645136, étant divisée toujours par 100, en aura comme auparavant, 4408 pieds cubes pour la solidité qu'on cherche.

Ou bien encore multipliez le Cone ABCD, qui se trouvera de 3052 pieds cubes, par la somme 117 de la ligne OE & du double de la ligne OB, & divisez le produit 357084 par la somme 81 des lignes OE, OB, & le Quotient donnera comme auparavant, 4408 pieds cubiques pour la solidité du Conoïde, ou Conicoïde proposé ABCD. Mais comme il peut aussi arriver des fractions au Cone ABCD, vous éviterez ces fractions par cet autre Canon, qui tire sa démonstration de la Prop. 27. d'Archimede; des Conoïdes & des Sphéroïdes.

Multipliez le produit 405 des deux lignes OE, BE, toujours par

par 471. , & ôtez du produit 190755, le produit 25434 du nom-  
bre invariable 314, & du carré 81 de l'Axe BE, & le  
reste 165321 étant multiplié par le carré 1296 du Diametre  
AC, & le produit 214236016 étant divisé par l'excès 42600  
de douze cent fois la ligne OE sur six cent fois la ligne BE,  
c'est à dire de 54000 sur 5400, on aura comme auparavant,  
4408 pieds cubes pour la solidité du Conicoïde Hyperbolique  
ABCD.

Plan-  
che 21.  
175. Fig.

## PROBLEME XIV.

*Mesurer un Orbe.*

Pour trouver la solidité de l'Orbe ABCDH terminé par la petite Sphere EFGH renfermée dans la grande ABCD, on ôtera de cette plus grande la plus petite, & le reste sera la solidité qu'on cherche. Comme si le Diametre AC est par exemple de 24 pieds, & le Diametre EG de 18 pieds, la Sphere EFGH se trouvera de 3052 pieds cubes & d'environ 138 pouces cubes, laquelle étant ôtée de la Sphere ABCD, qui par Probl. 6. se trouvera de 7234 pieds cubes, & d'environ 967 pouces cubes, il restera 4182 pieds cubes, & 829 pouces cubes pour la solidité de l'Orbe ABCDH.

Ou bien pour éviter les fractions qui peuvent arriver à chaque Sphere, Multipliez la difference 7992 des cubes 13824, 5832, des Diametres AC, EG toujours par 157, & divisez le tiers 4182.48 du produit 1254744 toujours par 100, le quotient donnera comme auparavant, 4182 pieds cubes, & environ 829 pouces cubes pour la solidité qu'on cherche.

## PROBLEME XV.

*Mesurer les cinq Corps reguliers.*

Nous avons dit dans la Déf. 59. que l'on ne compte que cinq Corps reguliers, sçavoir le Tetraëdre, l'Exaëdre, l'Octaëdre, le Dodecaëdre & l'Icosaëdre. Le Tetraëdre étant une espece de Pyramide, se mesure par Probl. 2. & l'Exaëdre ou cube étant une espece de Prisme se mesure par Probl. 1. On aura la solidité des trois autres en les reduisant en des Pyramides égales, ayant leur sommet commun au centre du solide regulier, & leurs Bases étant les mêmes que les Faces du Polyèdre. Ainsi comme il y a autant de Pyramides égales que le Corps regulier a de Faces, il n'y a qu'à multiplier l'Aire d'une de ces Faces par le nombre des mêmes Faces & multiplier encore le produit par le tiers de la hauteur commune des Pyramides.

Com-



Comme pour mesurer un Octaëdre, on multipliera l'Aire d'un des Triangles équilatéraux par huit, & le produit par le tiers de la perpendiculaire tirée du centre de l'Octaëdre par le centre du même Triangle équilatéral, & le produit de cette seconde Multiplication donnera la solidité de l'Octaëdre proposé.

Pour mesurer un Dodecaëdre, on multipliera l'Aire d'un des Pentagones réguliers par douze, & le produit par le tiers de la perpendiculaire tirée du centre du Dodecaëdre par le centre du Pentagone : & pareillement pour trouver la solidité de l'Icosaëdre, on multipliera l'Aire d'un des Triangles équilatéraux par vingt, & le produit par le tiers de la perpendiculaire.

## S C O L I E.

Quand on a un Polyëdre entre les mains, il n'est pas difficile de mesurer le côté d'une de ses Faces, & la hauteur d'une de ses Pyramides : mais comme ce Corps peut être conçu seulement par imagination, nous enseignerons icy la manière de connoître la hauteur commune des Pyramides qui le composent, en supposant le côté d'une de ses Faces d'une certaine grandeur, comme de 100000 parties, qui peuvent représenter des Ponces, des Lignes, & toute autre mesure qu'il vous plaira, ayant choisi ce nombre 100000 plutôt qu'un autre, parce qu'il est plus commode dans la pratique, & qu'ayant une fois connu la Solidité d'un tel Corps pour ce nombre 100000, on la pourra aisément trouver par la Regle de trois directe pour un autre nombre tel que l'on voudra, puisque 227 33. 11. les Corps semblables sont entre eux comme les cubes de leurs côtes homologues.

Premièrement pour trouver la hauteur d'une des Pyramides égales de l'Octaëdre, son côté étant supposé de 100000 parties, tel qu'est le Sinus Total dans les Tables de Sinus, à l'égard duquel la Secante de 45 degrez, sçavoir 141421 est le Diametre de l'Octaëdre, ou de la Sphere circonscrite, & la Tangente de 30 degrez, sçavoir 57735 est le Rayon du Cercle circonscrit autour de l'un des Triangles équilatéraux, qui sert de base à l'Octaëdre ; ôtez le carré 33 33330225 de ce Rayon ou Tangente 57735 de la moitié 5000000000 du carré 1000000000 du Sinus Total ou côté 100000 & la Racine quarrée du reste 1666669775 donnera 40824 pour la hauteur de la Pyramide qu'on cherche, dont la Base se connoitra en multipliant le Sinus 86602 de 60 degrez, par la moitié 50000 du Sinus Total, ou côté 100000, car le produit 4330100000 sera l'Aire de la Base de la Pyramide, qui étant multipliée par 8, & le produit 34640800000

étant

étant multiplié par le tiers 13608 de la hauteur trouvée 40824, on aura 471392006400000 pour la solidité de l'Octaëdre proposé.

Mais on aura cette solidité plus facilement & plus exactement, en multipliant le Diamètre trouvé ou la Secante de 45 degrez 141421 par le carré 10000000000 du Sinus Total ou côté 100000, car la troisième partie 471403333333333 du produit 1414210000000000 sera la solidité exacte du Polyèdre proposé. D'où il est aisé de conclure que pour trouver la solidité d'un Octaëdre, dont le côté soit un autre nombre que 100000, par exemple 80, il faut multiplier le cube 512000 de ce côté 80, toujours par 4714 & diviser le produit 2413368000 toujours par 10000, le quotient donnera 241336 pour la solidité qu'on cherche.

Secondement pour trouver la hauteur d'une des Pyramides égales du Dodecaëdre, son côté étant supposé de 100000 parties, tel qu'est le Sinus Total dans les Tables de Sinus, à l'égard duquel la moitié 85063 de la Secante 170130 d'un arc de 54 degrez, est le Rayon du Cercle circonscrit au Pentagone, qui sert de Base au Dodecaëdre, ôtez le carré 7236054225 de ce Rayon 85063 du carré du Rayon du Dodecaëdre, c'est à dire du triple 19635400812 du carré 654133604 du Sinus 80902 du même arc de 54 degrez, & la Racine quarrée du reste 12399346587 donnera 111352 pour la hauteur de l'une des douze Pyramides égales, dont le Dodecaëdre est composé, par laquelle multipliant le produit 6881900000 sous le Sinus Total ou côté 100000 & le quintuple 688190 de la Tangente 137638 du même arc de 54 degrez, on aura 7663133288000000 pour la solidité du Dodecaëdre proposé. D'où il est aisé de conclure que pour trouver la solidité d'un Dodecaëdre, dont le côté soit un autre nombre que 100000, comme 80, il faut multiplier le cube 512000 de ce côté 80, toujours par 7663, & diviser le produit 3923456000 toujours par 1000, le quotient donnera 3923456 pour la solidité qu'on cherche.

Mais sans nous arrêter davantage à parler de ces Corps réguliers, dont l'usage est fort rare, nous finirons en disant que pour trouver la solidité d'un Icosaëdre, dont le côté est connu, comme de 8 pieds, il faut multiplier le cube 512 de ce côté 8 toujours par 218, & diviser le produit 111616 toujours par 100, le quotient donnera 1116 pieds cubes, & environ 276 pouces cubes pour la solidité d'un Icosaëdre, dont le côté est de 8 pieds.)

## PROBLEME XVI.

*Mesurer un Corps irregulier.*

**L**A pratique du *Probl. 5.* & de quelques autres, fait assez connoître, que pour trouver la solidité d'un Corps irregulier, il le faut reduire, quand on le peut, en des Prismes, en des Demi-prismes, en des Pyramides, ou en d'autres Corps qui se puissent mesurer au moyen des Problèmes precedens : car les soliditez de tous ces Corps étant ajoûtées ensemble donneront la solidité du Corps proposé.

Que si le Corps à mesurer n'est pas trop grand, & qu'il soit tellement irregulier, qu'on ne puisse pas facilement le reduire en deux ou en plusieurs autres, dont les soliditez puissent être connues par les Problèmes precedens. il faut dans ce cas avoir un Vaisseau fait en Prisme, dont la Base soit exactement connuë, & le remplir en partie d'eau ; dans laquelle on plongera le Corps proposé, qui fera monter un Prisme d'eau égal à sa masse, c'est pourquoy si l'on multiplie la Base par la hauteur de l'eau qui sera montée, on aura ce Prisme d'eau, & par consequent la solidité du Corps proposé.

Ou bien on remplira entierement d'eau tout le Vaisseau dans lequel on doit mettre ensuite le Corps proposé, qui chassera une masse d'eau égale à sa solidité, c'est pourquoy après avoir ôté ce Corps de l'eau, on mesurera l'espace vuide qui restera en haut, c'est à dire qu'on multipliera la Base du Vaisseau par la hauteur du bord superieur au dessus de la Surface de l'eau, pour avoir la solidité du Prisme d'eau qui aura été chassé, & par consequent celle du Corps proposé.

## S C O L I E.

Il peut arriver que le Vaisseau ne soit pas assez grand pour pouvoir contenir le Corps proposé, dans ce cas, il faut, s'il se peut, avoir un Corps plus petit de même matiere. & en connoître la solidité, par le moyen de laquelle on pourra connoître celle du Corps proposé plus grand, en pesant bien exactement ces deux Corps, dont les pesanteurs sont comme les soliditez. parce qu'on les suppose d'une même matiere homogène, &c.

## PROBLEME XVII.

*Mesurer un Corps vuide.*

**I**L est évident que pour mesurer la solidité d'un Corps vuide ou creux, il n'y a qu'à le mesurer comme s'il étoit plein, & ôter de toute cette solidité la solidité du vuide, pour avoir au reste la solidité du Corps proposé.

## S C O L I E.

La mesure de semblables Corps sert principalement pour le toisé de plusieurs murailles jointes ensemble, c'est à dire qui font une clôture, dont nous avons déjà parlé au *Probl. 5.* & la mesure du vuide sert pour les Fossees, dont il a été aussi parlé, & encore pour les Puits & pour les Caves, mais les Arpenteurs ont des Methodes particulieres pour toiser ces sortes de Corps, & plusieurs autres, comme les Voutes, les Escaliers, &c. que nous n'expliquons point icy, pour ne pas sortir hors de nôtre sujet, parce qu'elles ne sont pas dans la précision geometrique. Je ne scaurois neanmoins m'empêcher de dire quelque chose de la mesure des Tonneaux, dont l'usage est fort frequent.

## PROBLEME XVIII.

*Mesurer un Tonneau.*

**S**I tous les Tonneaux étoient semblables entre eux, ayant connu la solidité de l'un, il seroit facile de trouver les soliditez des autres, parce que les Corps semblables sont entre eux comme les Cubes de leurs côtes homologues: mais comme ils ne sont pas tous faits d'une même façon, ni par une regle certaine, on ne peut pas aussi établir une Methode certaine pour les mesurer; quoique tous ayent leurs Fonds circulaires, & ordinairement égaux, mais les douves qui en font les côtes, sont quelquefois plates en se recourbant par le milieu, & quelquefois convexes.

Quand les Douves sont plates, le Tonneau peut être considéré comme un assemblage de deux Cones tronquez, que l'on mesurera par les preceptes du *Probl. 4.* & si les deux fonds opposés sont des Cegles égaux, ce qui arrive ordinairement, on trouvera la solidité de ce Tonneau en multipliant l'excès du quarré de la somme des deux Diametres BD, AE, sur leur

leur produit, par la longueur ou hauteur IK du Tonneau, & en multipliant le produit toujours par 157, pour avoir un second produit, dont la sixième partie doit toujours être divisée par 100.

Comme si le grand Diametre AE est de 24 pouces & le petit BD, ou HF de 18, leur produit sera 432, & leur somme sera 42, dont le carré 1764 étant diminué du produit 432, on aura 1332 pour l'excès, qui étant multiplié par la longueur IK, que nous supposons de 36 pouces, on aura ce produit 47952, lequel étant multiplié par 157, on aura ce second produit 7528464, dont la sixième partie 1254744 étant divisée par 100, on aura 12547 pouces cubes, & environ 760 lignes cubes pour la solidité du Tonneau ACEG.

Il y en a, qui pour avoir plutôt fait, multiplient la moitié de la somme des deux Cercles, dont les Diametres sont AE, BD, par la longueur IK du Tonneau : & alors pour éviter les fractions qui peuvent arriver à chaque Cercle, il faut multiplier la somme 900 des quarez 576, 324, des Diametres 24, 18, par la longueur IK, que nous avons supposée de 36 pouces, & multiplier le produit 32400 toujours par 785, pour avoir un second produit 25434000, dont la moitié 12717000 étant divisée toujours par 1000, on aura 12717 pouces cubes pour la solidité qu'on cherche, laquelle, comme vous voyez, étant ainsi trouvée, est un peu plus grande qu'il ne faut, mais dans la pratique on ne se soucie pas d'une erreur si peu considérable, pour le moins quand on jauge les Tonneaux, dont nous parlerons en après, parce qu'en cette façon les Jaugeurs y trouvent mieux leur compte.

L'erreur sera moins considérable, si au lieu de prendre un Cercle moyen, on prend un Diametre moyen entre les deux AE, BD, qui se trouvera de 21 pouces, comme étant la moitié de la somme des deux AE, BD. L'Aire du Cercle répondant à ce Diametre moyen 21 sera de 346 pouces quarez, laquelle étant multipliée par 36, qui est la longueur IK, on aura 12456 pouces cubes pour la solidité qu'on cherche, qui est moindre que la véritable 12547, mais elle n'est pas tant au dessous que la précédente 12717 est au dessus.

Quand les Douves sont convexes, comme BAH, DEF, on pourra considérer le Tonneau comme un assemblage de deux parties de Sphéroïdes, quel'on pourra mesurer par les preceptes du Probl. 11. mais cette speculation est assez inutile dans la pratique, où l'on ne cherche que grossièrement la capacité du Tonneau, que les Artisans appellent *contenance*, en des mesures usitées dans le País, comme en Bots, Pintes, Choppines, &c.

Ayant trouvé que la solidité du Tonneau ACEG, est de 12547 pouces

pouces cubes , il sera facile de connoître combien il contient de pintes par exemple de Paris , sçavoir en divisant cette solidité trouvée 12547 par 49, qui est à peu près le nombre des Pouces cubes que contient une Pinte de Paris , & le quotient donnera environ 256 pintes pour la contenance ou capacité du Tonneau propose ACEG.

Plan-  
che 24.  
194. Fig.

Mais on peut avoir cette capacité plus exactement, si l'on prend garde que dans l'usage un Muid est supposé de 8 pieds cubes, ou de 280 pintes, ou de 13824 pouces cubes, ce qui fait connoître que 280 pintes de Paris valent 13824 pouces cubes: c'est pourquoy pour sçavoir combien de pintes il y a dans 12547 pouces, qui est la capacité trouvée du Tonneau ACEG, on dira par la Regle de trois directe, si 13824 pouces cubes font 280 pintes, combien en feront 12547 pouces cubes? de sorte qu'en multipliant la solidité trouvée 12547 toujours par 280, & en divisant le produit 3513160 toujours par 13824, ou bien plus facilement, en multipliant la solidité trouvée 12547 toujours par 35, & divisant le produit 439145 toujours par 1728, le quotient donnera environ 254 pintes pour la capacité qu'on cherche.

Voilà pour la Theorie, & ce que nous allons dire dans la suite est pour la pratique ordinaire des Jaugeurs, qui jangent, c'est à dire mesurent promptement les Tonneaux par le moyen d'une Verge de fer, qui est divisée d'un côté en un certain nombre de parties égales, & de l'autre côté en parties inégales. Cette Verge de fer, qu'on appelle communément *Jauge*, est faite comme LMNO, & se divise en cette sorte.

Ayant déterminé la mesure dont on veut se servir pour jauger tous les Tonneaux qui se presenteront, comme la Pinte P, dont la figure étant irreguliere, doit être reduite en reguliere, en la remplissant d'eau, ou de quelqu'autre liqueur, & en versant cette liqueur dans quelque vase regulier, comme dans le Cylindre concave QRST, & supposant que cette liqueur occupe le Prisme cylindrique QVXT, dont la base est un Cercle, qui a pour Diametre une ligne égale au Diametre interieur RS du Cylindre concave, porrez la hauteur QV, ou TX de ce Prisme cylindrique sur la Jauge, en l'une de ses faces, depuis le point Y, qui repond au point O, vers L, autant de fois qu'elle y pourra entrer, & y marquez des points, où vous écrirez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, &c. & cette face ainsi divisée également sera appelée le côté des parties égales.

Il faut marquer ensuite sur l'autre face opposée de la même Jauge, que je suppose quarrée, & longue d'environ quatre ou cinq pieds, les Diametres d'une Balé double, triple, quadruple, &c. de celle du Prisme cylindrique QVXT, ce que l'on fera en cette sorte.

Ayant tiré à part au Diametre RS, la perpendiculaire indiquée

Plan-  
che 24.  
194. Fig.

définie S9, prenez sur cette ligne S9 la partie S1 égale à RS, & la partie S2, qui par 47. 1. sera le Diametre d'une Base double, égale à R1, & de même la partie S3, qui sera le Diametre d'une Base triple égale à R2, & ainsi ensuite: & transportez les Divisions inégales de la ligne S9 sur la Jauge depuis L vers M, par des points auxquels vous ajouterez les mêmes chiffres 1, 2, 3, 4, &c. & cette face ainsi divisée inégalement sera appelée le côté des parties inégales, que l'on peut encore diviser en cette sorte.


Divisez le Diametre RS, en un certain nombre de parties égales bien petites, comme en 100; dont le carré 10000 doit être doublé, triplé, quadruplé, &c. & l'on aura 20000, 30000, 40000, &c. dont les Racines quarrées donneront 141, 173, 200, &c. pour la quantité des Diametres des Bases, doubles, triples, quadruples, &c. Ayant donc fait comme auparavant, la ligne L1 égale à RS, ou de 100 parties, faites la ligne S2 de 141 parties, la ligne S3 de 173 parties, la ligne S4 de 200 parties, & ainsi ensuite, & la division se trouvera faite.

La Jauge étant ainsi divisée, voici la maniere de s'en servir. Appliquez la Jauge le long du Tonneau à mesurer, en sorte que le point O du crochet NO touche l'un des fonds, pour connoître sur le côté des parties égales la distance intérieure IK des deux fonds, en rabataut à peu près l'épaisseur des deux fonds: nous supposons cette distance IK de 14 parties égales ou hauteurs. Après cela, si le Tonneau est vuide, faites entrer l'extrémité L de la Jauge par le Bondon, pour connoître sur le côté des parties inégales la quantité du grand Diametre AE, que nous supposons de 24 parties inégales, ou Diametres: & mesurez pareillement la quantité du petit Diametre BD, ou HF, qui soit par exemple de 16 parties inégales. Enfin ajoutez ensemble ces deux Diametres trouvez 24, 16, & multipliez leur somme 40 par la longueur IK, que nous avons supposée de 14 parties égales, & la moitié du produit 560, donnera 280 pintes pour la capacité du Tonneau proposé ACEG.


Cela suppose que les deux petits Diametres BD, HF, sont égaux, & s'ils sont inégaux, on prendra la moitié de leur somme pour l'un de ces deux Diametres, comme s'ils étoient égaux, après quoy l'on travaillera comme il vient d'être enseigné.

La Jauge se peut faire autrement & plus facilement en cette sorte. Parce qu'un Cylindre cube qui a pour hauteur 3 pieds, 3 pouces, & 6 lignes, & autant par conséquent pour le Diametre de sa Base, contient mille pintes mesure de Paris, on fera la Jauge LM longue de 3 pieds, 3 pouces, & 6 lignes, & la divisez premièrement en dix parties égales dont


chacune



15  
tube Plan-  
che 24.  
194. Fig.







# Table des Matières

Secteur de	14
circonférence.	14
du secteur de	15
de.	18
de reflexion.	77
de incidence.	77
de réflexion.	197
de réflexion.	198
de réflexion.	7
de réflexion.	21
de réflexion.	21
de réflexion.	1. & 21
de réflexion.	21
d'une Hyper-	11
ligne courbe.	4
d'une Ellipse.	10
petit	

## DES MATIERES.

<i>petit. Axe d'une Ellipse.</i>	10	<i>Base d'un Cone.</i>	16
<i>Axe déterminé.</i>	11	<i>Base d'un Cone asymptotique.</i>	17
<i>Axe d'un Sphéroïde.</i>	15	<i>Bases d'un Cone tronqué.</i>	16
<i>Axe d'un Paraboloïde.</i>	15	<i>Bases d'un Cylindre.</i>	17
<i>Axe d'un Conoïde Hyperbolique.</i>	15	<i>Base d'une Pyramide.</i>	18
<i>Axe d'un Cylindre.</i>	17	<i>Bases d'une Pyramide tronquée.</i>	19
<i>Axe d'un Cone.</i>	16	<i>grande Base d'une Pyramide tronquée.</i>	19
<i>Axe d'un Cone tronqué.</i>	17	<i>petite Base d'une Pyramide tronquée.</i>	19
<i>Axe d'une Pyramide.</i>	18		

### B

<i>B Arlong.</i>	8	<i>Base d'un Corps.</i>	2
<i>Base d'une ligne courbe.</i>	6	<i>Bâton d'Arpenteur.</i>	75
		<i>Boule.</i>	13

### C

<i>Base d'un secteur de Cercle.</i>	7	<i>Capacité.</i>	212
<i>Base d'un Triangle.</i>	8	<i>Centre d'un Cercle.</i>	6
<i>Base d'un Parallélogramme.</i>	9	<i>Centre d'un Polygone.</i>	9
<i>Base d'un Hémisphère.</i>	14	<i>Centre d'un Quarré.</i>	10
<i>Base d'une section de Sphère.</i>	14	<i>Centre d'une Ligne courbe.</i>	10
<i>Base d'un segment de Cercle.</i>	14	<i>Centre d'une Ellipse.</i>	10
<i>Base d'un secteur de Sphère.</i>	14	<i>Centre d'une Hyperbole.</i>	11
<i>Base d'un Paraboloïde.</i>	15	<i>Centre d'une Sphere.</i>	13
<i>Base d'un Conoïde hyperbolique.</i>	15	<i>Centre d'un Sphéroïde.</i>	15
		<i>Centre d'un Polyèdre.</i>	19
		<i>Cercle.</i>	6
			demi-

# T A B L E

<i>demie-Cercle.</i>	6	<i>Costez d'une Figure.</i>	2
<i>Cercle generateur.</i>	12	<i>Costez d'un Rectiligne.</i>	7
<i>Cercles concentriques.</i>	13	<i>Costé d'un Cone.</i>	16
<i>Cercle de la Sphere.</i>	14	<i>Costé d'un Cone tronqué.</i>	17
<i>petit Cercle.</i>	14		
<i>grand Cercle.</i>	14	<i>Costé d'un Cylindre.</i>	17
<i>Cercle de premiere Revo-</i>		<i>Costez d'une Pyramide.</i>	18
<i>lution.</i>	177		
<i>Circonference d'un Cercle.</i>	6	<i>Couronne.</i>	13
		<i>Cube.</i>	19
<i>Circonference d'une Ellip-</i>		<i>Cultellation.</i>	83
<i>se.</i>	10	<i>Cycloïde.</i>	12
<i>Colonne.</i>	17	<i>Cylindre.</i>	17
<i>Complement parabolique.</i>	103	<i>Cylindre droit.</i>	17
		<i>Cylindre oblique.</i>	17
<i>Cone.</i>	16	<i>Cylindres semblablement</i>	
<i>Cone asymptotique.</i>	15	<i>inclinez.</i>	17
<i>Cone droit.</i>	16	<i>Cylindres semblables.</i>	17
<i>Cone isoscèle.</i>	16	<i>Cylindre cube.</i>	18
<i>Cone oblique.</i>	16		
<i>Cone scaléne.</i>	16		
<i>Cones semblablement in-</i>			
<i>clinez.</i>	16		
<i>Cones semblables.</i>	16		
<i>Cone tronqué.</i>	16		
<i>Conicoïde.</i>	206		
<i>Conoïde.</i>	16		
<i>Conoïde Elliptique.</i>	16		
<i>Conoïde Parabolique.</i>	16		
<i>Conoïde Hyperbolique.</i>	15		
<i>Conoïde circulaire.</i>	16		
<i>Continence.</i>	212		
<i>Corde d'un arc.</i>	7		
<i>Corps.</i>	2		
<i>Corps taludé.</i>	125		
<i>Corps regulier.</i>	2		

## D

<i>Decagone.</i>	9
<i>Degré.</i>	7
<i>Demi-cercle.</i>	65
<i>Diagonale.</i>	10
<i>Diametre d'un Cercle.</i>	6
<i>demi-Diametre d'un Cer-</i>	
<i>cle.</i>	6
<i>Diametre d'une Ligne</i>	
<i>courbe.</i>	4
<i>Diametre d'un Paralle-</i>	
<i>logramme.</i>	10
<i>Diametre déterminé d'u-</i>	
<i>ne Hyperbole.</i>	11
<i>Diametre traversant d'u-</i>	
<i>ne Hyperbole.</i>	11
<i>Dia-</i>	

# DES MATIERES.

*Diametre d'une Sphere.* *Globe.* 13  
*Demi - Diametre d'une Sphere.* 13  
*Diametre d'un Spheroides.* 15  
*Divisjon des Champs.* 23  
*Dodecaëdre.* 20  
*Dodecagone.* 9

*Graphometre.* 65

## H

*Hauteur d'un Corps.* 3

*Hauteur d'une Ligne courbe.* 6

*Hauteur d'un Triangle* 8

*Hauteur d'un Parallelogramme.* 9

*Helice.* 12

*Hemisphere.* 13

*Hyperbole.* 11

*Hyperbole opposée.* 11

*Hypotenuse.* 8

## E

*Ellipse.* 10  
*Endecagone.* 9

*Enneagone.* 9

*Epaisseur d'un Corps.* 2

*Eptagone.* 9

*Espace Parabolique.* 102

*Exaëdre.* 19

*Exagone.* 9

## F

*Faces d'un Polyëdre.* 19

*Figure.* 2

*Flèche d'un arc.* 164

## G

*Geodesie.* 1. & 23  
*Geometrie.* 1

*Geometrie speculative.* 1

*Geometrie pratique.* 1

*Glacis.* 196

## I

*Ingenieur.* 213

*Ingenieur.* 213

*Icosädre.* 20

*Instrument universel.* 66

## L

*Largeur d'un Corps.* 2

*Largeur d'une Surface.* 2

*Lieu.* 21

*grande Lieu de France.* 21

*Lieu moyenne de France.* 22

*Lieu commune de France.* 22

*Lieu.* 22

*petite Lieu de France.* 22

*Ligne*

# T A B L E

<i>Ligne.</i>	2		
<i>Ligne droite.</i>	3	<i>M</i>	
<i>Ligne courbe.</i>	3		
<i>Lignes paralleles.</i>	4	<i>M</i>	<i>Mesure.</i> 20
<i>Lignes perpendiculaires.</i>	4		<i>Mesure d'un angle.</i>
<i>Lignes qui se coupent à an-</i>			7
<i>gles droits.</i>	3	<i>Mesure</i>	<i>quarrée.</i> 20
<i>Lignes obliques.</i>	5		<i>Mesure cubique.</i> 20
<i>Ligne Parabolique.</i>	10		<i>Mesure itineraire.</i> 21
<i>Ligne Hyperbolique.</i>	11		<i>Mesurer une quantité con-</i>
<i>Ligne Conique.</i>	16		<i>tinée.</i> 20
<i>Ligne de long.</i>	21		<i>Mille d'Italie.</i> 22
<i>Ligne courante.</i>	21		<i>Minute.</i> 7
<i>Ligne quarrée.</i>	21		
<i>Ligne cubique.</i>	21	<i>N</i>	
<i>Ligne accessible.</i>	65		
<i>Ligne inaccessible.</i>	65	<i>N</i>	<i>Ombre</i>
<i>Ligne horizontale.</i>	65		<i>pairement</i>
<i>Ligne verticale.</i>	65		<i>pair.</i> 36
<i>Ligne inclinée.</i>	65		
<i>Ligne de foy.</i>	65	<i>O</i>	
<i>Ligne de conduite.</i>	66		
<i>Ligne de Pouce quarré.</i>	89	<i>O</i>	<i>Octaëdre.</i> 20
<i>Ligne de toise quarrée.</i>	89		<i>Octogone.</i> 9
<i>Ligne d'évolution.</i>	126		<i>Orbe.</i> 18
<i>Ligne fondamentale.</i>	150		<i>Orbes excentriques.</i> 18
<i>Ligne de premiere revolu-</i>			<i>Ordonnée.</i> 4
<i>tion.</i>	177		<i>Ovale Mathématique.</i> 10
<i>Ligne de Pouce cube.</i>	179	<i>P</i>	
<i>Ligne de Toise cube.</i>	179		
<i>Longimetric.</i>	1. & 65	<i>P</i>	<i>Parabole.</i> 10
<i>Longueur.</i>	2. & 20		<i>Parabole quarrée.</i> 11
<i>Longueur d'une ligne.</i>	20		<i>Parabole cubique.</i> 11
<i>Longueur d'un Corps.</i>	2		<i>Parabole quarré-quar-</i>
<i>Longueur d'une Surface.</i>	2		<i>rée.</i> 11
	8		<i>Paraboloïde</i> 15
<i>Lozange.</i>	8		<i>paral-</i>

# DES MATIERES.

<i>Parallelogramme.</i>	9	<i>Point d'un angle.</i>	5
<i>Parallelogramme genera-</i>		<i>Polyèdre.</i>	19
<i>teur.</i>	17	<i>Polyèdre inscriptible dans</i>	
<i>Parallelogramme rectan-</i>		<i>une Sphère.</i>	19
<i>gle.</i>	9	<i>Polyèdre regulier.</i>	19
<i>Parallelogramme obli-</i>		<i>Polyèdre irregulier.</i>	19
<i>quangle.</i>	144	<i>Polygone.</i>	8. & 9
<i>Parallelepède.</i>	19	<i>Polygone regulier.</i>	9
<i>Parallelepède rectangle.</i>	19	<i>Polygone irregulier.</i>	9
		<i>Polygone pair.</i>	59
<i>Parametre d'une Para-</i>		<i>Polygone impair.</i>	59
<i>bole.</i>	11. & 169	<i>Porfil.</i>	190
<i>Pas geometrique.</i>	22	<i>Portion de Sphère.</i>	13
<i>Pas commun.</i>	22	<i>Pouce de long.</i>	21
<i>Pentagone.</i>	9	<i>Pouce courant.</i>	21
<i>Perche de long.</i>	21	<i>Pouce quarré.</i>	21
<i>Perche courante.</i>	21	<i>Pouce cubique.</i>	21
<i>Perche quarrée.</i>	21	<i>Pouce de Pied quarré.</i>	89
<i>Perche cubique.</i>	21	<i>Pouce de Toise quarrée.</i>	89
<i>Perpendiculaire d'une Li-</i>			
<i>gne courbe.</i>	4	<i>Pouce de Pied cube.</i>	179
<i>Pied.</i>	20	<i>Pouce de Toise cube.</i>	179
<i>Pied de Roy.</i>	20	<i>Prisme.</i>	19
<i>Pied de Ville.</i>	20	<i>Prisme triangulaire.</i>	19
<i>Pied courant.</i>	20	<i>Prisme oblique.</i>	190
<i>Pied de long.</i>	20	<i>Prisme.</i>	191
<i>Pied quarré.</i>	20	<i>Profil.</i>	190
<i>Pied cube.</i>	20	<i>Profondeur d'un Corps.</i>	2
<i>Pied de Toise quarrée.</i>	89	<i>Proportion arithmetique.</i>	
<i>Pied de toise cube.</i>	178		
<i>Pinnle.</i>	66	<i>Pyramide.</i>	18
<i>Plan.</i>	6	<i>Pyramide droite.</i>	18
<i>Plan Orthographique.</i>	195	<i>Pyramide oblique.</i>	18
<i>Planimetrie.</i>	1. & 88	<i>Pyramide tronquée.</i>	19
<i>Point.</i>	3	<i>Pyramide triangulaire.</i>	18
<i>Ponte de station.</i>	67		

Qua.

# TABLE

Q

<b>Q</b> uadrangle.	8
<b>Q</b> uadratrice geometrique.	III
<b>Q</b> uadrature du Cercle.	III
<b>Q</b> uadrilatere.	8
<b>Q</b> uantité continue.	I
<b>Q</b> uantité continue permanente.	I
<b>Q</b> uantité continue successive.	I
<b>Q</b> uarré.	8
<b>Q</b> uarré-long.	8
<b>Q</b> uart de Cercle.	6

R

<b>R</b> ayon d'un Cercle.	6
<b>R</b> ayon d'une Sphere.	13
<b>R</b> ayon de reflexion.	77
<b>R</b> ectangle.	9
<b>R</b> ectiligne.	7
<b>R</b> hombe.	8
<b>R</b> hombe solide.	19
<b>R</b> homboide.	8
<b>R</b> ouleste.	12

S

<b>S</b> econde.	7
<b>S</b> ecteur de Cercle.	7
<b>S</b> ecteur de Sphere.	14

<b>S</b> ecteur d'Ellipse.	125
<b>S</b> ection de Sphere.	13
<b>S</b> ection conique.	16
<b>S</b> egment de Cercle.	7
<b>S</b> egment de Sphere.	13
<b>S</b> egment Parabolique.	102
<b>S</b> egment de Spherode.	15
<b>S</b> egment d'Ellipse.	125
<b>S</b> olide.	2
<b>S</b> olidité d'un Corps.	20
<b>S</b> ommet d'une Ligne courbe.	4
<b>S</b> ommet d'un angle.	5
<b>S</b> ommet d'un Cone.	16
<b>S</b> ommet d'une Pyramide.	18
<b>S</b> ommet d'un Cone asymptotique.	15
<b>S</b> phere.	13
<b>S</b> pheres excentriques.	18
<b>S</b> pherode.	15
<b>S</b> pherode long.	15
<b>S</b> pherode plat.	15
<b>S</b> pherodes semblables.	15
<b>S</b> pirale.	12
<b>S</b> pirale premiere.	12
<b>S</b> pirale seconde.	12
<b>S</b> inde.	22
<b>S</b> tereometrie. I. &	178
<b>S</b> uperficie.	2
<b>S</b> uperficie Spherique. 6. &	12
<b>S</b> uperficie Conique.	16
<b>S</b> uperficie Cylindrique.	17
<b>S</b> urface.	2
<b>S</b> urface plane.	6
<b>S</b> urfa-	

[illegible][illegible]